

根こぶ病防除薬剤一覧

薬剤	成分系	成分	キャベツ	はくさい	だいこん	ブロッコリ	使用時期	使用方法	本剤使用回数
カルマト55	-	石灰窒素	○	○			播種又は植付前	散布後土壌混和	1回
石灰窒素50	-	石灰窒素	○	○			播種又は植付前	散布後土壌混和	1回
石灰窒素55	-	石灰窒素	○	○			播種又は植付前	散布後土壌混和	1回
粒状石灰窒素40	-	石灰窒素		○			播種又は植付前	散布後土壌混和	1回
粒状石灰窒素55	-	石灰窒素	○	○			播種又は植付前	散布後土壌混和	1回
オファル粉剤	シアノミダゾール系	アミスルプロム		○			播種又は定植前	全面土壌混和	1回
				○		○	定植前	全面土壌混和	1回
				○			播種前(苗床)	全面土壌混和	2回以内 (苗床では1回以内、本圃では1回以内)
				○	○		定植前	作条土壌混和	1回
オファル顆粒水和剤	シアノミダゾール系	アミスルプロム	○	○		○	定植前まで	灌注	1回
			○	○		○	定植前	全面散布後土壌混和	1回
ザ・つまごい	土壌殺菌(フルスルフアミド)	フルスルフアミド	○	○			播種又は定植前	全面土壌混和	2回以内
ダコソイル	有機塩素系	TPN	○	○			播種又は定植前	作条及び全面施用土壌混和	1回
				○			播種又は定植前	全面施用土壌混和	1回
				○			播種又は定植前	植穴処理土壌混和	1回
				○			播種又は定植前	作条施用土壌混和	1回
ダコニール1000	有機塩素系	TPN			○	定植時	土壌灌注	1回	
ネビシンSC	土壌殺菌(フルスルフアミド)	フルスルフアミド	○	○			播種又は定植前	全面散布後土壌混和	2回以内
ネビシン粉剤	土壌殺菌(フルスルフアミド)	フルスルフアミド		○			播種又は定植前	全面散布後土壌混和	1回
				○		○	播種又は定植前	全面土壌混和	1回
				○			播種又は定植前	全面土壌混和	2回以内
				○	○		播種又は定植前	作条土壌混和	2回以内
ネビシン顆粒水和剤	土壌殺菌(フルスルフアミド)	フルスルフアミド	○	○		○	播種又は定植前	全面土壌混和	1回
ネビモン粉剤	土壌殺菌(フルスルフアミド)	フルスルフアミド	○	○			播種又は定植前	全面散布後土壌混和	2回以内
ネビリュウ	土壌殺菌(フルスルフアミド)	フルスルフアミド	○	○		○	定植前	全面土壌混和	1回
ファイトキーパー水和剤	天敵微生物	ハリオホ・フラックス・パットクス	○	○			播種直後及び定植前日～当日	灌注	2回
			○	○			播種直後	灌注	1回
				○			播種直後及び定植前日～当日	灌注	2回
フロンサイトSC	保護剤(フルアジナム)	フルアジナム		○		○	定植前	全面散布後土壌混和	1回
				○			播種又は定植前	全面散布後土壌混和	2回以内 (苗床では1回以内、本圃では1回以内)
フロンサイト粉剤	保護剤(フルアジナム)	フルアジナム		○		○	播種又は定植前	作条土壌混和	1回
				○		○	播種又は定植前	全面土壌混和	1回
				○			播種又は定植前	全面土壌混和	2回以内 (苗床では1回以内、本圃では1回以内)
				○			播種又は定植前	作条土壌混和	2回以内 (苗床では1回以内、本圃では1回以内)
ランマンプロアブル	シアノミダゾール系	シアゾフアミド	○	○		○	定植前日～当日	灌注	1回
				○			定植時	灌注	1回

※登録内容の概要を示したもので、実際の使用に当たっては農薬ラベルを十分に確認した上で、正しくご使用願いたい。