

主なオオタバコガ防除薬剤一覧

薬剤	成分系	成分	キ ャ ベ ツ	は く さい	レ タ ス	ブ ロ ッ コ リ	使用時期	使用方法	本剤 使用回数
アクセルキングフロアブル	その他 その他	トルフェンピラト メタフルミゾン	○				収穫14日前まで	散布	2回以内
アクセルフロアブル	その他	メタフルミゾン	○				収穫前日まで	散布	3回以内
アニキ乳剤	その他	レピメクチン	○	○	○		収穫3日前まで	散布	3回以内
アフームエクセラ顆粒水和剤	その他 IGR	エマメクチン安息香酸塩 ルフェヌロン		○	○		収穫7日前まで	散布	3回以内
アフーム乳剤	その他	エマメクチン安息香酸塩			○	○	収穫3日前まで	散布	3回以内
オルトラン水和剤	有機リン系	アセフェート			○		収穫14日前まで	散布	3回以内
ガードナーフロアブル	ネオニコチノイド系 その他	イミダクロプリト スピノサト			○		定植当日	灌注	1回
カスケード乳剤	IGR	フルフェノクスロン			○		収穫3日前まで	散布	3回以内
キックオフ顆粒水和剤	ジアミド系 ネオニコチノイド系	クロラントラニリフロール ジノテフラン			○		定植前日～定植時	灌注	1回
コテツフロアブル	その他	クロルフェナヒル	○		○		収穫前日まで	散布	2回以内
ジェイエース水溶剤	有機リン系	アセフェート			○		収穫14日前まで	散布	3回以内
ジュリホフロアブル	ジアミド系 ネオニコチノイド系	クロラントラニリフロール チアメキサム			○		育苗期後半～定植当日	灌注	1回
スピノース顆粒水和剤	その他	スピノサト			○		収穫3日前まで	散布	3回以内
スミフェート水溶剤	有機リン系	アセフェート			○		収穫14日前まで	散布	3回以内
セルオーフロアブル	ネオニコチノイド系 ジアミド系	イミダクロプリト フルベンジアミド			○		定植3日前～定植時	灌注	1回
ディアナSC	その他	スピネトラム	○		○		収穫前日まで	散布	2回以内
トルネードエースDF	その他	インドキサカルブ			○		収穫7日前まで	散布	2回以内
トルネードフロアブル	その他	インドキサカルブMP			○		収穫7日前まで	散布	2回以内
ハクサップ水和剤	ピレスロイド系 有機リン系	フェンパレレート マラソン			○		収穫3日前まで	散布	2回以内
ハクサップ水和剤	ピレスロイド系 有機リン系	フェンパレレート マラソン	○	○			収穫前日まで	散布	5回以内
ファルコンエースフロアブル	その他 IGR	スピノサト メキシフェニト			○		収穫3日前まで	散布	2回以内
ファルコンフロアブル	IGR	メキシフェニト	○		○		収穫3日前まで	散布	2回以内
フェニックス顆粒水和剤	ジアミド系	フルベンジアミド	○	○	○		収穫前日まで	散布	2回以内
ブリロツ粒剤	ジアミド系	シアントラニリフロール			○		育苗期後半～定植時	株元散布	1回
ブリンスフロアブル	その他	フィプロニル	○	○			収穫14日前まで	散布	2回以内
ブリンスフロアブル	その他	フィプロニル		○			収穫21日前まで	散布	2回以内
ブレオフロアブル	その他	ピリダリル	○	○	○		収穫7日前まで	散布	2回以内
ブレバソフロアブル5	ジアミド系	クロラントラニリフロール	○		○		収穫前日まで	散布	3回以内
ブレバソ粒剤	ジアミド系	クロラントラニリフロール			○		育苗期後半～定植時	株元散布	1回
ベネビアOD	ジアミド系	シアントラニリフロール	○		○		収穫前日まで	散布	3回以内
ハリマークSC	ジアミド系	シアントラニリフロール			○		育苗期後半～定植時	灌注	1回
ホタニガードES	天敵微生物	ホーベリア ハシアーナ			○		発生初期	散布	-
ホリアムガンダム顆粒水和剤	その他 ジアミド系	エマメクチン安息香酸塩 クロラントラニリフロール			○		収穫3日前まで	散布	3回以内
マッチ乳剤	IGR	ルフェヌロン			○		収穫3日前まで	散布	3回以内
マトリックフロアブル	IGR	クロマフェニト			○		収穫7日前まで	散布	3回以内
モスピラン粒剤	ネオニコチノイド系	アセタミプリト			○		定植前日～定植当日	株元散布	1回
ラービフロアブル	カーバメート系	チオジカルブ			○		収穫14日前まで	散布	2回以内
ランネット45DF	カーバメート系	メソミル			○		収穫7日前まで	散布	2回以内

※登録内容の概要を示したので、実際の使用に当たっては農薬ラベルを十分に確認した上で、正しくご使用願いたい。