

主な根こぶ病防除薬剤一覧

薬剤	成分系	成分	キャベツ	はくさい	だいこん	フロッコリー	使用時期	使用方法	本剤使用回数
カルメート55	-	石灰窒素	○	○			播種前又は植付前	散布後土壌混和	1回
石灰窒素50	-	石灰窒素	○	○			播種前又は植付前	散布後土壌混和	1回
石灰窒素55	-	石灰窒素	○	○			播種前又は植付前	散布後土壌混和	1回
粒状石灰窒素40	-	石灰窒素		○			播種前又は植付前	散布後土壌混和	1回
粒状石灰窒素55	-	石灰窒素	○	○			播種前又は植付前	散布後土壌混和	1回
オラクル粉剤	シアノミダゾール系	アミスルプロム		○			播種前又は定植前	全面土壌混和	1回
						○	定植前	全面土壌混和	1回
				○			播種前(苗床)	全面土壌混和	2回以内 (苗床では1回以内、本圃では1回以内)
				○	○		定植前	作条土壌混和	1回
オラクル顆粒水和剤	シアノミダゾール系	アミスルプロム	○	○		○	定植前まで	灌注	1回
			○	○		○	定植前	全面散布後土壌混和	1回
ザ・つまごい	土壌殺菌(フルスルファミド)	フルスルファミド	○				播種又は定植前	全面土壌混和	2回以内
ダコソイル	有機塩素系	TPN	○				播種又は定植前	作条及び全面施用土壌混和	1回
				○			播種又は定植前	全面施用土壌混和	1回
			○	○			播種又は定植前	植穴処理土壌混和	1回
				○			播種又は定植前	作条施用土壌混和	1回
ダコニール1000	有機塩素系	TPN			○	定植時	土壌灌注	1回	
ネビジンSC	土壌殺菌(フルスルファミド)	フルスルファミド	○				播種又は定植前	全面散布後土壌混和	2回以内
				○			播種又は定植前	全面散布後土壌混和	1回
ネビジン粉剤	土壌殺菌(フルスルファミド)	フルスルファミド		○		○	播種又は定植前	全面土壌混和	1回
			○				播種又は定植前	全面土壌混和	2回以内
					○		播種又は定植前	作条土壌混和	2回以内
					○		播種前	全面土壌混和	1回
ネビジン顆粒水和剤	土壌殺菌(フルスルファミド)	フルスルファミド	○	○			播種又は定植前	作条土壌混和	1回
ネビモン粉剤	土壌殺菌(フルスルファミド)	フルスルファミド	○	○			播種又は定植前	全面散布後土壌混和	2回以内
ネビモン粉剤	ペンシアンリド系	フルトラニル	○				定植前	全面土壌混和	2回以内
ネビリュウ	土壌殺菌(フルスルファミド)	フルスルファミド	○	○		○	定植前	全面土壌混和	1回
フィールドキーパー水和剤	天敵微生物	ハリオボラックス パラドクス	○	○			播種直後及び定植前日～当日	灌注	2回
			○	○			播種直後	灌注	1回
				○			播種直後及び定植前日～当日	灌注	2回
				○		○	定植前	全面散布後土壌混和	1回
フロンサイトSC	保護剤(フルアジナム)	フルアジナム	○				播種又は定植前	全面散布後土壌混和	2回以内 (苗床では1回以内、本圃では1回以内)
				○		○	播種又は定植前	作条土壌混和	1回
フロンサイト粉剤	保護剤(フルアジナム)	フルアジナム		○		○	播種又は定植前	全面土壌混和	1回
				○		○	播種又は定植前	全面土壌混和	2回以内 (苗床では1回以内、本圃では1回以内)
			○				播種又は定植前	全面土壌混和	2回以内 (苗床では1回以内、本圃では1回以内)
			○				播種又は定植前	作条土壌混和	2回以内 (苗床では1回以内、本圃では1回以内)
ランマンフロアブル	シアノミダゾール系	シアゾファミド	○	○		○	定植前日～当日	灌注	1回
				○			定植時	灌注	1回

※登録内容の概要を示したので、実際の使用に当たっては農薬ラベルを十分に確認した上で、正しくご使用願いたい。