

登録番号	農薬の種類	農薬の名称	申請者	用途	適用作物	適用病害虫・雑草	希釈倍率や使用量	使用時期	使用回数	使用方法
23422	ヨーロッパトビチビアメバチ剤	ヨーロッパトビチビアメバチ	日本養蜂協会	殺虫剤	れんげ	アルファルファタコゾウムシ	放飼地点1カ所あたり400～2000頭	着蕾期	—	放飼
23423	フルチアニル水和剤	ガッテンフロアブル2	大塚アグリテクノ	殺菌剤	キュウリ、ナス、スイカ、メロン、イチゴ	うどんこ病	2000倍 10aあたり100～300リットル	収穫前日まで	2回以内	散布
23424	イソチアニル水和剤	ルーチンFS	バイエル クロップサイエンス	殺菌剤	稲(育苗箱)	いもち病	乾燥種もみ1kg当り 原液15～30mL	は種前(浸種後)	1回	塗沫処理
23425	ピラクロニル・フルセトスルフロロン・メソトリオン粒剤	フルパワーMX1キロ粒剤	石原バイオサイエンス	除草剤	移植水稻	水田一年生雑草、マツバ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	10aあたり1kg	移植後5日からノビエ3.5葉期まで ただし移植後30日まで	1回	湛水散布
23426	MCPB乳剤	兼商マデック	アグロ カネショウ	植物成長調整剤	柑橘、リンゴ、ナシ	冬期落葉・へた落ち・後期落果・収穫前落果防止、着色促進	2000～6000倍 10aあたり200～600リットル	(作物によって異なる)	1回(2回)	立木全面散布
23427	MCPB乳剤	兼商マデックEW	アグロ カネショウ	植物成長調整剤	柑橘	冬期落葉・へた落ち・後期落果・収穫前落果防止	2000～3000倍 10aあたり300～400リットル	11月～1月ただし収穫10日前まで、など	1回	立木全面散布