

登録番号	農薬の種類	農薬の名称	申請者	用途	適用作物	適用病害虫・雑草	希釈倍率や 使用量	使用時期	使用回数	使用方法
23460	メタアルデヒド粒剤	ジャンボたにしくん	ロンザジャ パン	殺虫剤	稲	スクミリンゴガイ	10アールあたり1～ 2kg	移植後但し、 収穫90日前 まで	2回以内	散布
23461		スクミノンメイト	サンケイ化 学							
23462	アメクトラジン水和剤	ザンプロターフ	BASF	殺菌剤	西洋芝	赤焼病、ピシウム病	1000倍 1㎡あたり0.5リットル	発病初期	3回以内	散布
23463	フェントラザミド・プロモブチ ド・ベンスルフロンメチル粒 剤	イノーバトリオ1キ口粒 剤75	バイエル	除草剤	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオ モダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、 オモダカ、ヒルムシロ、セリ、シズイ、エノサヤ ヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離 など(※剤によって異なる)	10アールあたり1kg	移植時など	1回	田植同時散 布、湛水散 布
23464		イノーバトリオフロアブル					10アールあたり500ml			田植同時散 布、原液湛 水散布
23465		イノーバトリオジャンボ					10アールあたり10パッ ク			パックのま ま投入
23466		イノーバトリオフロアブル					10アールあたり500ml			田植同時散 布、原液湛 水散布
23467		イノーバトリオLジャンボ					10アールあたり10パッ ク			パックのま ま投入
23468	トリフルミゾール乳剤	協友トリフミン乳剤	協友アグリ	殺菌剤	稲、小麦、キュウリ、 ナス、トマト、きく、こ んにゃく、チューリップ	ばか苗病、ごま葉枯病、いもち病、赤かび 病、うどんこ病、すすかび病、葉かび病、白さ び病、乾腐病、球根腐敗病	5～2000倍	種子浸種前な ど	1回	種子浸種、 吹き付けな ど