

| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者 | 用途 | 適用作物 | 適用病害虫・雑草 | 希釈倍率や 使用量 | 使用時期 | 使用回数 | 使用方法 |
|-------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------------|---|--------|------|--------------------|
| 23481 | イマザピル液剤 | アーセナルパワー | BASF | 除草剤 | 樹木など | 一年生及び多年生雑草 | 10アールあたり800 ～1400ml(100～150 リットル) | 雑草生育期 | 2回以内 | 散布 |
| 23482 | ピリベンカルブ・メパニピ リム水和剤 | オルパ顆粒水和剤 | クミアイ化学 | 殺菌剤 | キュウリ、ミニトマ ト、トマト、イチゴ | うどんこ病、灰色かび病 | 2000倍 10アールあたり100 ～300リットル | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 |
| 23483 | | 日曹オルパ顆粒水和 剤 | 日本曹達 | | | | | | | |
| 23484 | 1-メチルシクロプロペン くん蒸剤 | スマートフレッシュ タ ブ | ローム& ハース | 植物成長 調整剤 | リンゴ、ナシ、カキ | (倉庫等施設内での収穫果実 の熟期抑制) | 3.5～7㎡あたり1錠 | 収穫直後 | 1回 | 水を入れた 容器に入れ、くん蒸 |