L	番号	長来の性規	辰栄の石が	中胡石	用巫	週用IF例	週用例音式 椎甲	使用量	使用时期	使用凹数	使用力法
		イミダクロプリド・スピ ノサド・チアジニル粒 剤	ブイゲットアドマイ ヤースピノ箱粒剤	日本農薬	殺虫殺 菌剤	延(络杏芷)	いもち病、イネミズゾウムシ、イネドロオイム シ、ツマグロヨコバイ、ウンカ類、ニカメイ チュウ、コブノメイガ、イネヒメハモグリバエ、 フタオビコヤガ、白葉枯病		移植2日前~移植当 日	1回	育苗箱の上から均一に散布する。
		シメトリン・モリネー ト・MCPB粒剤	マメットSMジャン ボ	協友アグリ	除草剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、アオミドロ・藻類による表層はく離		移植後20日〜ルゴ 3.5葉期、但し、移植後 30日まで		小包装のまま 投げ入れ
	23582	イマゾスルフロン・ダ イムロン・ペントキサ ゾン粒剤	テマエース1キロ粒 剤	科研製薬	除草剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	10aあたり1kg	移植直後〜ル*ェ1.5 葉期 ただし、移植後 30日まで 移植時	10	原液湛水散布 田植同時散布
	23583	イマゾスルフロン・ダ イムロン・ペントキサ ゾン水和剤	テマエースフロアブ ル	科研製薬	除草剤	移植水稲	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、クログワイ、オモダカ、シズイ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	10aあたり 500mL	移植直後〜ル [*] ェ1.5 葉期 ただし、移植後 30日まで 移植時	1回	原液湛水散布 または水口施 用 田植同時散布