

登録番号	農薬の種類	農薬の名称	申請者	用途	適用作物	適用病害虫・雑草	希釈倍率や使用量	使用時期	使用回数	使用方法
23509	テフリルトリオン・ピラクロニル・メタゾスルフロン水和剤	コメットフロアブル	日産化学	除草剤	移殖水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ	10aあたり500ml	移植後5日～ノビE2.5葉期 ただし、移植後30日まで	1回	原液湛水散布
23510	ピラゾレート・ベンゾピシクロン・メタゾスルフロン粒剤	アールタイプ1キロ粒剤	三井化学アグロ	除草剤	移殖水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ	10aあたり1kg	移植後3日～ノビE2.5葉期 ただし、移植後30日まで	1回	湛水散布
23511	クロチアニジン・スピネトラム・イソチアニル粒剤	箱王子粒剤	住化グリーン	殺虫殺菌剤	稲(箱育苗)	いもち病、白葉枯病、もみ枯細菌病、内穎褐変病、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、ニカメイチュウ、フタオビコヤガ、コブノメイガ、苗腐敗症(もみ枯細菌病菌)	育苗箱1箱当たり50g	播種前	1回	育苗箱に均一に散布
23512	イプフェンカルバゾン・テフリルトリオン・ベンスルフロンメチル水和剤	カチボシLフロアブル	北興化学	除草剤	移殖水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、クログワイ、ミズガヤツリ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	10aあたり500ml	移植時、移植直後～ノビE2.5葉期但し、移植後30日まで	1回	田植同時散布 原液湛水散布
23513		カチボシフロアブル								
23514		カチボシ1キロ粒剤51								
23515		カチボシ1キロ粒剤75								
23516		カチボシLジャンボ								
23517		カチボシジャンボ								
							10aあたり小包装(パック)10個(300g)			パックのまま 投げ入れ

23518	クロチアニジン・フェンプロパトリンエアゾル	カイガラムシエアゾール	住化園芸	殺虫剤	バラ、樹木類	バラシロカイガラムシ、カイガラムシ類	—	—	4回以内	約30cm離れた所から噴射
23519	イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・プロモブチド水和剤	バッチリLXフロアブル	協友アグリ	除草剤	移殖水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ	10aあたり500ml	移植時、移植直後～ ¹ ノビE2.5葉期但し、移植後30日まで	1回	田植同時散布 原液湛水散布
23520		バッチリLXジャンボ					10aあたり小包装(パック)10個(400g)			パックのまま 投げ入れ
23521		バッチリLX1キロ粒剤					10aあたり1kg			田植同時散布 湛水散布
23522	有機銅水和剤	キノンドー顆粒水和剤	アグロカネショウ	殺菌剤	リンゴ、ナシ、カキ、ブドウ、ミカン、キャベツ、レタス	斑点落葉病、黒星病、輪紋病、褐斑病、すす斑病、炭疽病、黒斑病、落葉病、うどんこ病、枝膨病、黒とう病、べと病、そうか病、黒点病、灰色かび病、黒腐病、腐敗病、軟腐病、斑点細菌病	1000倍 10aあたり100～700リットル	収穫3日前～45日前まで	4～9回以内	散布
23523	マシン油乳剤	協友機械油乳剤95	協友アグリ	殺虫剤	カンキツ類、落葉果樹、桑、モモ	ヤノネカイガラムシ、その他のカイガラムシ、サビダニ、ハダニ類の越冬卵、ハダニ類、カイガラムシ類、アブラムシ類	(作物によって異なる)	—	—	散布
23524	プロクロラズ乳剤	協友スポルタック乳剤	協友アグリ	殺菌剤	稲、小麦、ラッキョウ、チューリップ、アイリス	いもち病、ばか苗病、ごま葉枯病、眼紋病、乾腐病、球根腐敗病、青かび病	(作物によって異なる)	浸種前、植付前	1回 (小麦は2回以内)	種子浸漬 吹付処理