

主なハスモンヨトウ防除薬剤一覧

薬剤	成分系	成分	キヤベツ	はくさい	だいこん	レタス	フロッコリ	使用時期	使用方法	本剤使用回数
アクセルキングフロアブル	その他	トルフェニトド チアゾリジン	○					収穫14日前まで	散布	2回以内
アクセルフロアブル	その他	チアゾリジン	○	○				収穫前日まで	散布	3回以内
アクセルベイト	その他	チアゾリジン	○	○				収穫7日前まで	株元散布	3回以内
アグロスリン水和剤	ピレスロイド系	シメクトリン		○				収穫前日まで	散布	5回以内
アタブロン乳剤	IGR	チアゾリジン	○	○	○	○		収穫14日前まで	散布	3回以内
アニキ乳剤	その他	ピレトリン	○	○	○	○		収穫3日前まで	散布	3回以内
アフームエクスラ顆粒水和剤	IGR	エマクチン安息香酸塩 チアゾリジン	○	○	○	○		収穫7日前まで	散布	3回以内
アフーム乳剤	その他	エマクチン安息香酸塩	○		○			収穫3日前まで	散布	3回以内
アベイル	チアゾリジン系	イタクトリン チアゾリジン	○					育苗後半～定植当日	株元散布	1回
アルバリン顆粒水溶剤	チアゾリジン系	シメクトリン			○			定植前日～定植時	灌注	1回
エルサン乳剤	有機リン系	PAP	○	○	○	○		収穫21日前まで	散布	2回以内
オルトラン水和剤	有機リン系	アセフェート	○					収穫7日前まで	散布	3回以内
ガードナーフロアブル	チアゾリジン系 その他	イタクトリン ピレトリン	○					定植当日	灌注	1回
カウンター乳剤	IGR	バルロン	○				○	収穫7日前まで	散布	3回以内
カスケード乳剤	IGR	フルフェナクスロン	○				○	収穫14日前まで	散布	2回以内
ガンバ水和剤	その他	ジフエンチクロン	○					収穫3日前まで	散布	3回以内
ギャクオフ顆粒水和剤	ジアジ系 チアゾリジン系	チアゾリジン シメクトリン	○	○	○	○		定植前日～定植時	灌注	1回
コテツフロアブル	その他	チアゾリジン				○		収穫7日前まで	散布	2回以内
ジェイエース水溶剤	有機リン系	アセフェート		○	○			収穫14日前まで	散布	3回以内
ジャックポット顆粒水和剤	BT	BT菌の生芽胞・結晶毒素	○					発生初期 但し、収穫前日まで	散布	-
ジュリボフロアブル	ジアジ系 チアゾリジン系	チアゾリジン シメクトリン	○	○	○	○		育苗後半～定植当日	灌注	1回
スタークル顆粒水溶剤	チアゾリジン系	シメクトリン			○			定植前日～定植時	灌注	1回
スミフェート水溶剤	有機リン系	アセフェート		○	○			収穫14日前まで	散布	3回以内
セルオーフロアブル	チアゾリジン系 ジアジ系	イタクトリン チアゾリジン	○	○	○	○		定植3日前～定植時	灌注	1回
チーフメイト乳剤	ピレスロイド系 有機リン系	シメクトリン PAP	○					収穫14日前まで	散布	2回以内
チューレックス顆粒水和剤	BT	BT菌の生芽胞・結晶毒素	○					発生初期 但し、収穫前日まで	散布	-
ディアナSC	その他	スピノサラム	○		○			収穫前日まで	散布	2回以内
デナボン5%ベイト	カーバメート系	NAC	○					収穫14日前まで	株元散布	3回以内
トクチオン乳剤	有機リン系	プロチオキサス	○					収穫21日前まで	散布	2回以内
トルネードエースDF	その他	イタクトリン	○		○			収穫7日前まで	散布	2回以内
トルネードフロアブル	その他	イタクトリンMP	○		○			収穫7日前まで	散布	2回以内
ノーモルト乳剤	IGR	フルフェナクスロン	○				○	収穫7日前まで	散布	2回以内
ハクザップ水和剤	ピレスロイド系 有機リン系	シメクトリン マラソン			○			収穫35日前まで	散布	3回以内
ハスモン天敵	微生物	ハスモンヨトウ核多角体病ウイルス	○		○			発生初期	散布	-
ファルコンエースフロアブル	その他 IGR	スピノサラム ネキチフェンゾリジン	○					収穫7日前まで	散布	2回以内
ファルコンフロアブル	IGR	ネキチフェンゾリジン				○		収穫3日前まで	散布	2回以内
フェニックス顆粒水和剤	ジアジ系	チアゾリジン		○		○		収穫前日まで	散布	2回以内
フレオフロアブル	その他	ピレトリン	○		○	○		収穫7日前まで	散布	2回以内
プレバソフロアブル5	ジアジ系	チアゾリジン	○	○	○			育苗後半～定植当日	灌注	1回
ベネビアOD	ジアジ系	チアゾリジン	○	○	○			収穫前日まで	散布	3回以内
ベリマークSC	ジアジ系	チアゾリジン		○				育苗後半～定植当日	灌注	1回
ボリアムガンダム顆粒水和剤	その他 ジアジ系	エマクチン安息香酸塩 チアゾリジン	○					収穫7日前まで	散布	3回以内
マッチ乳剤	IGR	チアゾリジン	○			○		収穫7日前まで	散布	3回以内
マトリックフロアブル	IGR	チアゾリジン			○			収穫7日前まで	散布	3回以内
マブリック水和剤20	ピレスロイド系	フルフェナクスロン	○	○	○			収穫14日前まで	散布	2回以内
ミクロデナボン水和剤85	カーバメート系	NAC	○	○				収穫14日前まで	散布	3回以内
モスピラン粒剤	チアゾリジン系	イタクトリン	○					定植前日～定植当日	株元散布	1回
ラービフロアブル	カーバメート系	チアゾリジン		○		○		収穫14日前まで	散布	2回以内
ラービン水和剤75	カーバメート系	チアゾリジン	○					収穫7日前まで	散布	4回以内
ランネット45DF	カーバメート系	チアゾリジン	○					収穫7日前まで	散布	2回以内
ランネット微粒剤F	カーバメート系	チアゾリジン	○	○				収穫3日前まで	散布	3回以内
レルダン乳剤25	有機リン系	チアゾリジン	○					収穫7日前まで	散布	4回以内
ロムダンフロアブル	IGR	チアゾリジン	○					収穫前日まで	散布	2回以内

※登録内容の概要を示したもので、実際の使用に当たっては農業ラベルを十分に確認した上で、正しくご使用願います。