

主なオオタバコガ防除薬剤一覧

薬剤	成分系	成分	キ ャ ベ ツ	は く さい	レ タ ス	フ ロ ッ コ リ	使用時期	使用方法	本剤 使用回数
アクセルキングフロアブル	その他 その他	トルフェンピラト メタフルミゾン	○				収穫14日前まで	散布	2回以内
アクセルフロアブル	その他	メタフルミゾン	○				収穫前日まで	散布	3回以内
アニキ乳剤	その他	レピメクチン	○	○	○		収穫3日前まで	散布	3回以内
アフームエクセラ顆粒水和剤	その他 IGR	エマメクチン安息香酸塩 ルフェスロン		○	○		収穫7日前まで	散布	3回以内
アフーム乳剤	その他	エマメクチン安息香酸塩			○	○	収穫3日前まで	散布	3回以内
オルトラン水和剤	有機リン系	アセフェート			○		収穫14日前まで	散布	3回以内
ガードナーフロアブル	ネオニコチノイド系 その他	イダクロプリド スピノサド				○	定植当日	灌注	1回
カスケード乳剤	IGR	フルフェノクスロン				○	収穫3日前まで	散布	3回以内
キックオフ顆粒水和剤	ジアミド系 ネオニコチノイド系	クロラントリニプロール ジノテフラン				○	定植前日～定植時	灌注	1回
コテツフロアブル	その他	クロルフェナビル	○		○		収穫前日まで	散布	2回以内
ジェイエース水溶剤	有機リン系	アセフェート				○	収穫14日前まで	散布	3回以内
ジュリボフロアブル	ジアミド系 ネオニコチノイド系	クロラントリニプロール チアトキサム				○	育苗期後半～定植当日	灌注	1回
スピノエース顆粒水和剤	その他	スピノサド				○	収穫3日前まで	散布	3回以内
スミフェート水溶剤	有機リン系	アセフェート				○	収穫14日前まで	散布	3回以内
セルオーフロアブル	ネオニコチノイド系 ジアミド系	イダクロプリド フルベンジアミド				○	定植3日前～定植時	灌注	1回
ディアナSC	その他	スピネトラム	○		○		収穫前日まで	散布	2回以内
トルネードエースDF	その他	インドキサカルブ				○	収穫7日前まで	散布	2回以内
トルネードフロアブル	その他	インドキサカルブMP				○	収穫7日前まで	散布	2回以内
ハクサップ水和剤	ピレスロイド系 有機リン系	フェンハレレート マラソン				○	収穫3日前まで	散布	2回以内
			○	○			収穫前日まで	散布	5回以内
ファルコンエースフロアブル	その他 IGR	スピノサド メキシフェジド				○	収穫3日前まで	散布	2回以内
ファルコンフロアブル	IGR	メキシフェジド	○		○		収穫3日前まで	散布	2回以内
フェニックス顆粒水和剤	ジアミド系	フルベンジアミド	○	○	○		収穫前日まで	散布	2回以内
ブリロッソ粒剤	ジアミド系	シアントラニプロール				○	育苗期後半～定植時	株元散布	1回
プリンスフロアブル	その他	フィプロニル	○	○			収穫14日前まで	散布	2回以内
				○			収穫21日前まで	散布	2回以内
プレオフロアブル	その他	ピリダリル	○	○	○		収穫7日前まで	散布	2回以内
プレバソソフロアブル5	ジアミド系	クロラントリニプロール	○		○		収穫前日まで	散布	3回以内
プレバソソ粒剤	ジアミド系	クロラントリニプロール				○	育苗期後半～定植時	株元散布	1回
ベネピアOD	ジアミド系	シアントラニプロール	○		○		収穫前日まで	散布	3回以内
ベリマークSC	ジアミド系	シアントラニプロール				○	育苗期後半～定植時	灌注	1回
ボタニガードES	天敵微生物	ホーベリア バンサーナ				○	発生初期	散布	-
ボリアムガンダム顆粒水和剤	その他 ジアミド系	エマメクチン安息香酸塩 クロラントリニプロール				○	収穫3日前まで	散布	3回以内
マッチ乳剤	IGR	ルフェスロン				○	収穫3日前まで	散布	3回以内
マトリックフロアブル	IGR	クロマフェジド				○	収穫7日前まで	散布	3回以内
モスピラン粒剤	ネオニコチノイド系	アセタミプリド				○	定植前日～定植当日	株元散布	1回
ラービソフロアブル	カーバメート系	チオジカルブ				○	収穫14日前まで	散布	2回以内
ランネット45DF	カーバメート系	メソミル				○	収穫7日前まで	散布	2回以内

※登録内容の概要を示したので、実際の使用に当たっては農薬ラベルを十分に確認した上で、正しくご使用願いたい。