

表2 水稻仕上げ防除殺菌剤の一覧

分類	薬剤系列	薬剤名	有効成分名	防除適期		予防	治療	その他適用病害					
				葉いもち	穂いもち			紋枯病	稻こうじ病	もみ枯細菌病	白葉枯病	穂枯れ	変色米
本田粒剤		オリブライト1キロ粒剤	オミノストロビン	初発10日前～10日後	－	○	○	○			○	○	
	ストロビルリン系＋E B I	イモチミン粒剤	オミノストロビン	初発前	出穂2～4週間前	○	○	○	○			○	
	メラニン合成阻害（MBI-R）	コラトップ粒剤	ピロキロン	初発10日前～初発時	出穂5日前～30日前	○				○			
	メラニン合成阻害（MBI-P）＋D	ガッツスター粒剤、ゴウケツモンスター粒剤	トルプロカルブ＋シメコナゾール	初発前	出穂5日前まで	○	○	○	○	○		○	
	抵抗性誘導剤	オリゼメート粒剤	プロパナゾール	初発10日前～初発時	出穂3～4週間前	○				○	○	○	
		ブイゲット粒剤	チアシニル	初発7～20日前	－	○						○	
本田散布剤	メラニン合成阻害（MBI-R）	ラブサイド	フサライド	発生前		○							
		ビーム	トリシクラゾール	発生前～初発時		○						○	
	有機リン系	フジワン	イソプロチオラン	発生前～初発時		○	○						
	ストロビルリン系（Qol）	アミスター	アゾキシストロビン	発生前～初発時		○	○	○	○				○
	カスミン＋ビーム	ダブルカット	カスガマイシン＋トリシクラゾール	発生前～初発時		○	○			○		○	
	ラブサイド＋フェリムゾン	ブラシン	フェリムゾン＋フサライド	発生前～初発時		○	○		○			○	○
	ビーム＋フェリムゾン	ノンブラス	フェリムゾン＋トリシクラゾール	発生前～初発時		○	○					○	○
	カスミン＋ラブサイド	カスラブサイド	カスガマイシン＋フサライド	発生前～初発時		○	○			○			