主なバーティシリウム病防除剤一覧

薬剤名	種類名	病害虫草名	希釈倍数	いちご	オクラ	かぶ	きく	キャベツ	きゅうり	だいこん	とうがらし	トマト	なす	はくさい	ピーマン	ふき	ふきのとう	ほうれんそ	ミニトマト	メロン	もりあざみ	レタス	食用ぎく	非結球レタ
NCS	カーバム剤	バーティシリウム萎凋病	原液30L/10a(3倍希釈液全面混和被覆)					○																
NCS	カーバム剤	バーティシリウム萎凋病	原液30L/10a(3倍希釈液全面混和被覆)					○																
NCS	カーバム剤	黄化病	原液30L/10a(3倍希釈液全面混和被覆)											○										
ガスタード微粒剤	ダゾメット粉粒剤	バーティシリウム萎凋病	20～30kg/10a					○																
ガスタード微粒剤	ダゾメット粉粒剤	バーティシリウム黒点病	20～30kg/10a			○				○														
ガスタード微粒剤	ダゾメット粉粒剤	萎凋病	20～30kg/10a	○																				
ガスタード微粒剤	ダゾメット粉粒剤	黄化病	20～30kg/10a											○										
ガスタード微粒剤	ダゾメット粉粒剤	半身萎凋病	20～30kg/10a						○			○	○						○	○			○	
ガスタード微粒剤	ダゾメット粉粒剤	半身萎凋病	30kg/10a												○	○					○			
キルパー	カーバムナトリウム塩液剤	バーティシリウム萎凋病	原液60L/10a全面混和被覆					○																
キルパー	カーバムナトリウム塩液剤	バーティシリウム黒点病	原液40～60L/10a土壌注入被覆							○														
キルパー	カーバムナトリウム塩液剤	バーティシリウム黒点病	原液40～60L/10a土壌混和被覆							○														
キルパー	カーバムナトリウム塩液剤	黄化病	原液40～60L/10a土壌注入被覆											○										
キルパー	カーバムナトリウム塩液剤	黄化病	原液40～60L/10a土壌混和被覆											○										
キルパー	カーバムナトリウム塩液剤	半身萎凋病	原液40～60L/10a土壌注入被覆									○	○						○					
キルパー	カーバムナトリウム塩液剤	半身萎凋病	原液40～60L/10a土壌混和被覆									○							○					
キルパー	カーバムナトリウム塩液剤	半身萎凋病	原液60L/10a土壌注入被覆								○				○									
キルパー	カーバムナトリウム塩液剤	半身萎凋病	原液60L/10a土壌混和被覆										○											
クロールピクリン	クロルピクリンくん蒸剤	黄化病	<床土・堆肥>3～5ml／穴 <圃場>2～3ml／穴											○										
クロールピクリン	クロルピクリンくん蒸剤	半身萎凋病	<床土・堆肥>3～5ml／穴 <圃場>2～3ml／穴									○	○						○					
クロールピクリン	クロルピクリンくん蒸剤	半身萎凋病	<圃場>1穴当り3ml		○											○								
クロピク80	クロルピクリンくん蒸剤	黄化病	<床土・堆肥>3～5ml／穴 <圃場>2～3ml／穴											○										
クロピク80	クロルピクリンくん蒸剤	半身萎凋病	<床土・堆肥>3～5ml／穴 <圃場>2～3ml／穴									○	○						○					
クロピク80	クロルピクリンくん蒸剤	半身萎凋病	<圃場>3ml／穴													○	○							
クロピクテープ	クロルピクリンくん蒸剤	半身萎凋病	<圃場>110m埋設/100㎡				○						○											
クロルピクリン錠剤	クロルピクリンくん蒸剤	黄化病	1錠／穴(30cm×30cm)											○										
クロルピクリン錠剤	クロルピクリンくん蒸剤	半身萎凋病	1錠／穴(30cm×30cm)				○						○											
クロルピクリン錠剤	クロルピクリンくん蒸剤	半身萎凋病	10錠／㎡										○											
ソイリーン	クロルピクリン・D－DくんD蒸剤	バーティシリウム黒点病	30L/10a(3ml／穴)							○														
ソイリーン	クロルピクリン・D－DくんD蒸剤	黄化病	30L/10a(3ml／穴)											○										
ソイリーン	クロルピクリン・D－DくんD蒸剤	半身萎凋病	30L/10a(3ml／穴)				○																	
タチガレン液剤	ヒドロキシノキサゾール液剤	バーティシリウム萎凋病	1000倍株元灌注																			○		
ダブルストッパー	クロルピクリン・D－DくんD蒸剤	半身萎凋病	30L/10a(3ml／穴)				○						○											
ディ・トラペックス油剤	メチルイソチオシアネート・D－D油剤	バーティシリウム萎凋病	30L/10a																			○		○
ディ・トラペックス油剤	メチルイソチオシアネート・D－D油剤	バーティシリウム萎凋病	30L/10a															○						
ディ・トラペックス油剤	メチルイソチオシアネート・D－D油剤	バーティシリウム萎凋病	40L/10a					○																
ディ・トラペックス油剤	メチルイソチオシアネート・D－D油剤	バーティシリウム黒点病	30L/10a			○				○														
ディ・トラペックス油剤	メチルイソチオシアネート・D－D油剤	萎凋病	30L/10a	○																				
ディ・トラペックス油剤	メチルイソチオシアネート・D－D油剤	黄化病	30L/10a											○										
ディ・トラペックス油剤	メチルイソチオシアネート・D－D油剤	半身萎凋病	30～40L/10a				○																	
ディ・トラペックス油剤	メチルイソチオシアネート・D－D油剤	半身萎凋病	30L/10a									○	○			○			○					
ドジョウピクリン	クロルピクリン燻蒸剤	黄化病	<床土・堆肥>3～6ml／穴 <圃場>2～3ml／穴											○										
ドジョウピクリン	クロルピクリン燻蒸剤	黄化病	<床土・堆肥>3～6ml／穴 <圃場>2～3ml／穴											○										
ドジョウピクリン	クロルピクリン燻蒸剤	半身萎凋病	<床土・堆肥>3～6ml／穴 <圃場>2～3ml／穴									○	○						○					
ドジョウピクリン	クロルピクリン燻蒸剤	半身萎凋病	<圃場>3ml／穴													○	○							
トラベックサイド油剤	メチルイソチオシアネート油剤	半身萎凋病	30～40L/10a(3～4ml／穴)										○			○								
ドロクロール	クロルピクリンくん蒸剤	黄化病	<床土・堆肥>3～6ml／穴 <圃場>2～3ml／穴											○										
ドロクロール	クロルピクリンくん蒸剤	半身萎凋病	<床土・堆肥>3～6ml／穴 <圃場>2～3ml／穴									○	○						○					
ドロクロール	クロルピクリンくん蒸剤	半身萎凋病	<圃場>3ml／穴													○	○							
バスアミド微粒剤	ダゾメット粉粒剤	バーティシリウム萎凋病	20～30kg/10a					○																
バスアミド微粒剤	ダゾメット粉粒剤	バーティシリウム黒点病	20～30kg/10a			○				○														
バスアミド微粒剤	ダゾメット粉粒剤	萎凋病	20～30kg/10a	○																				
バスアミド微粒剤	ダゾメット粉粒剤	黄化病	20～30kg/10a											○										
バスアミド微粒剤	ダゾメット粉粒剤	半身萎凋病	20～30kg/10a						○			○	○						○	○			○	
バスアミド微粒剤	ダゾメット粉粒剤	半身萎凋病	30kg/10a												○	○					○			
フロンサイド粉剤	フルアジナム粉剤	黄化病	30～40kg/10a											○										
ベンレート水和剤	ベノミル水和剤	半身萎凋病	1000倍土壌灌注										○											
ベンレート水和剤	ベノミル水和剤	半身萎凋病	500倍土壌灌注										○											