野菜のダニ別作物別登録農薬一覧

病害虫草	薬剤	種類名	使用方法	あしたば	あずき	アスパラガス	いちご	いも類	いんげんまめ	うど	えだまめ	エンサイ	えんどうまめ	オクラ	カーネーション	かぼちゃ	カリフラワー	かんしょ	キャベツ	きゅうり	こまつな	リアンダー（葉	さといも	さやいんげん	さやえんどう	ししとう	しそ	しゅんぎく	しろうり	ずいいか	ずいずんじな	セルリー	だいず	たらのき	つわぶき	とうがし類	とうがらし	トマト	なす	なばな類	にがうり	にら	にんにく	ねぎ	はつかだいこん	ばら	ピーマン	ふき	ブロッコリー	ほうれんそう	みかん	みつば	ミニトマト	メロン	モロヘイヤ	やまのいも	ヤングコーン	らっかせい	らっきょう	実えんどう
カンザワハダニ	カネマイトフロアブル	アセキノシル水和剤	1500倍散布																									○																																		
カンザワハダニ	コテツフロアブル	クロルフェナピル水和剤	2000倍散布																				○																																			○				
カンザワハダニ	ピラニカEW	テブフェンピラド乳剤	2000倍散布																				○																																								
シソサビダニ	アニキ乳剤	レピメクチン乳剤	2000倍散布																									○																																			
シソサビダニ	アファーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩乳剤	2000倍散布																									○																																			
シソサビダニ	サンマイトフロアブル	ピリダベン水和剤	2000倍散布																									○																																			
シソサビダニ	ボタニガードES	ボーベリア　バシアーナ乳剤	1000倍散布																									○																																			
シソサビダニ	マッチ乳剤	ルフェヌロン乳剤	2000倍散布																									○																																			
シソサビダニ	モレスタン水和剤	キノキサリン系水和剤	3000倍散布																									○																																			
チャホコリダニ	アーリーセーフ	脂肪酸グリセリド乳剤	300～600倍散布																																			○																									
チャホコリダニ	アニキ乳剤	レピメクチン乳剤	2000倍散布																																	○		○							○																	
チャホコリダニ	アニキ乳剤	レピメクチン乳剤	4000倍散布																																																	○											
チャホコリダニ	アファーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩乳剤	2000倍散布																																			○																									
チャホコリダニ	アプロードイオウフロアブル	硫黄・プロフェジン水和剤	250倍散布																																																○												
チャホコリダニ	アプロードエースフロアブル	フェンピロキシメート・プロフェジン水和剤	1000倍散布																																			○																									
チャホコリダニ	アプロードエースフロアブル	フェンピロキシメート・プロフェジン水和剤	2000倍散布																																																○												
チャホコリダニ	カネマイトフロアブル	アセキノシル水和剤	1000倍散布																																			○							○																	
チャホコリダニ	クリアオール水和剤	アクリナトリン・スピロメシフェン水和剤	2000倍散布																																			○							○																	
チャホコリダニ	グレーシア乳剤	フルキサメタミド乳剤	2000倍散布																																			○							○																	
チャホコリダニ	コテツフロアブル	クロルフェナピル水和剤	2000倍散布																																			○																									
チャホコリダニ	コロマイト乳剤	ミルベメクチン乳剤	1000～1500倍散布																																											○																	
チャホコリダニ	コロマイト乳剤	ミルベメクチン乳剤	1500倍散布																																			○																									
チャホコリダニ	コロマイト乳剤	ミルベメクチン乳剤	2000倍散布																									○																																			
チャホコリダニ	サフオイル乳剤	調合油乳剤	300倍散布				○																															○																		○								
チャホコリダニ	サンクリスタル乳剤	脂肪酸グリセリド乳剤	300～600倍散布																																			○																									
チャホコリダニ	サンマイトフロアブル	ピリダベン水和剤	1000～1500倍散布				○																																																									
チャホコリダニ	スターマイトフロアブル	シエノピラフェン水和剤	2000倍散布																								○	○										○								○																		
チャホコリダニ	ダニトロンフロアブル	フェンピロキシメート水和剤	1000倍散布				○																																																									
チャホコリダニ	ダブルフェースフロアブル	ビフルブミド・フェンピロキシメート水和剤	2000倍散布																																			○																									
チャホコリダニ	ハチハチフロアブル	トルフェンピラド水和剤	1000倍散布				○																																																									
チャホコリダニ	ハチハチ乳剤	トルフェンピラド乳剤	1000倍散布																																											○																	
チャホコリダニ	バルミノ	キノキサリン系水和剤	2000倍散布																																			○								○																	
チャホコリダニ	ピラニカEW	テブフェンピラド乳剤	2000倍散布																																			○																									
チャホコリダニ	ピラニカ水和剤	テブフェンピラド水和剤	2000倍散布																																																○												
チャホコリダニ	ボタニガードES	ボーベリア　バシアーナ乳剤	1000倍散布																									○																																			
チャホコリダニ	メビウスフロアブル	アバメクチン・エトキサゾール水和剤	2000～3000倍散布																																											○																	
チャホコリダニ	モベントフロアブル	スピロテトラマト水和剤	2000倍散布																																○		○							○																			
チャホコリダニ	モベントフロアブル	スピロテトラマト水和剤	500倍灌注																																○		○							○																			
チャホコリダニ	モレスタン水和剤	キノキサリン系水和剤	1000～2000倍散布																																																○												
チャホコリダニ	モレスタン水和剤	キノキサリン系水和剤	2000～3000倍散布																																											○																	
チャホコリダニ	モレスタン水和剤	キノキサリン系水和剤	2000倍散布																																			○																									
チャホコリダニ	プロポニック	プロピレングリコール	1000倍散布																																			○																									
チャホコリダニ幼虫	アプロード水和剤	プロフェジン水和剤	1000倍散布																																			○																									
トマトサビダニ	アーリーセーフ	脂肪酸グリセリド乳剤	300～600倍散布																																			○																									
トマトサビダニ	アグリメック	アバメクチン乳剤	500～1000倍散布																																			○																									
トマトサビダニ	アニキ乳剤	レピメクチン乳剤	2000倍散布																																			○																									
トマトサビダニ	アファーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩乳剤	2000倍散布																																			○																									
トマトサビダニ	アプロードエースフロアブル	フェンピロキシメート・プロフェジン水和剤	1000倍散布																																			○																									
トマトサビダニ	イオウフロアブル	水和硫黄剤	400倍散布																																			○																									
トマトサビダニ	イデクリーン水和剤	硫黄・銅水和剤	500倍散布																																			○																									
トマトサビダニ	ガードホープ液剤	ホスチアゼート液剤	4000倍土壌灌注																																			○																									
トマトサビダニ	カスケード乳剤	フルフェノクスロン乳剤	4000倍散布																																			○																									
トマトサビダニ	クリアオール水和剤	アクリナトリン・スピロメシフェン水和剤	2000倍散布																																			○																									
トマトサビダニ	クリアザールフロアブル	スピロメシフェン水和剤	2000倍散布																																			○																									
トマトサビダニ	グレーシア乳剤	フルキサメタミド乳剤	2000倍散布																																			○																									
トマトサビダニ	コテツフロアブル	クロルフェナピル水和剤	2000倍散布																																			○																									
トマトサビダニ	コロマイト乳剤	ミルベメクチン乳剤	1500倍散布																																			○																									
トマトサビダニ	サフオイル乳剤	調合油乳剤	300倍散布																																			○																									
トマトサビダニ	サンクリスタル乳剤	脂肪酸グリセリド乳剤	300～600倍散布																																			○																									
トマトサビダニ	ダニトロンフロアブル	フェンピロキシメート水和剤	1000倍散布																																			○																									
トマトサビダニ	ダニ太郎	ビフェナゼート水和剤	1000倍散布																																			○																									
トマトサビダニ	デュアルサイド水和剤	プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル・ポリオキシシンK水和剤	2000倍散布																																			○																									
トマトサビダニ	トランスフォームフロアブル	スルホキサフロル水和剤	1000～2000倍散布																																			○																									
トマトサビダニ	バルミノ	キノキサリン系水和剤	2000倍散布																																			○																									
トマトサビダニ	ファインセーブフロアブル	フロメトキン水和剤	1000～4000倍散布																																			○																									
トマトサビダニ	マイトコーネフロアブル	ビフェナゼート水和剤	1000倍散布																																			○																									
トマトサビダニ	マッチ乳剤	ルフェヌロン乳剤	2000倍散布																																			○																									
トマトサビダニ	モベントフロアブル	スピロテトラマト水和剤	2000倍散布																																			○																									
トマトサビダニ	モレスタン水和剤	キノキサリン系水和剤	1500～2000倍散布																																			○																									
トマトサビダニ	園芸ボルドー	硫黄・銅水和剤	500倍散布																																			○																									
ナミハダニ	エキカ炭酸ガス	二酸化炭素くん蒸剤	くん蒸中ガス濃度40～80%を維持するに必要な量くん蒸24時間、25～30℃、倉庫等の下部から気化器を用いて投入する				○																																																										
ナミハダニ	エキカ炭酸ガス	二酸化炭素くん蒸剤	くん蒸中ガス濃度60%を維持するに必要な量くん蒸7時間、40℃、倉庫等の下部から気化器を用いて投入する				○																																																										
ナミハダニ	くん蒸用炭酸ガス	二酸化炭素くん蒸剤	くん蒸中のガス濃度50%程度を維持するに必要な量24時間、20～30℃、倉庫等の下部から気化器を用いて投入する				○																																																										
ナミハダニ	コテツフロアブル	クロルフェナピル水和剤	2000倍散布																																			○																									
ナミハダニ成幼虫	カダンA	アレスリンエアゾル	噴霧液が害虫に付着するように30cm以上離れた所から数回断続して噴射する。																																									○																					
ニセナミハダニ	NCS	カーバム剤	原液1ml/㎥(ハウス内くん蒸)所定量をハウス内通路に均一に滴下し、処理後4～6日間密閉する。												○																																																		
ニセナミハダニ	カダンP	ペルメトリン・TPNエアゾル	噴霧液が均一に付着するように30cm以上離れた所から数回断続して噴射する。												○																																																		
ニセナミハダニ成幼虫	カダンA	アレスリンエアゾル	噴霧液が害虫に付着するように30cm以上離れた所から数回断続して噴射する。																																									○																					
ネダニ	ジメトエート粒剤	ジメトエート粒剤	6kg/10a作条施用																																																													
ネダニ	ネマトリンエース粒剤	ホスチアゼート粒剤	15kg/10a植溝土壌混和																																																													
ネダニ類	DC油剤	D－D剤	20L/10a(1穴当り2ml)全面処理　耕起整地後、畝横30cm千鳥状に注入し、直ちに覆土鎮圧する。																																											○																		
ネダニ類	D－D	D－D剤	20L/10a(1穴当り2ml)全面処理　耕起整地後、畝横30cm千鳥状に注入し、直ちに覆土鎮圧する。																																											○																		
ネダニ類	アプロードフロアブル	プロフェジン水和剤	250倍30分間種球浸漬																																																													
ネダニ類	アプロードフロアブル	プロフェジン水和剤	500～1000倍株元灌注																																												○																	
ネダニ類	アプロードフロアブル	プロフェジン水和剤	500倍株元灌注																																																													
ネダニ類	スプラサイド乳剤40	DMTP乳剤	2000倍30分間種球浸漬																																																													
ネダニ類	スプラサイド乳剤40	DMTP乳剤	2000倍株元灌注																																																													
ネダニ類	スミチオン乳剤	MEP乳剤	1000～2000倍30分間種球浸漬																																																													
ネダニ類	ダイアジノン粒剤5	ダイアジノン粒剤	6kg/10a散布																																																													
ネダニ類	ダントツ粒剤	クロチアニジン粒剤	6kg/10a株元散布																																											

| | | |

| | | |