

主なピシウム病防除剤一覧

薬剤名	種類名	病害虫草名	使用方法	キャベツ	しょうが	はくさい	ほうれんそう	みつば	みょうが(花穂)	みょうが(茎葉)	野菜類(ほうれんそうを除く)	葉しょうが
エイプロン31	メタラキシルM液剤	ピシウム菌による病害(苗立枯病等)	乾燥種子1kg当り1.78ml原液塗抹処理				○				○	
オーソサイド水和剤80	キャプタン水和剤	根茎腐敗病	塊茎重量の2%塊茎粉衣	○								
オーソサイド水和剤80	キャプタン水和剤	根茎腐敗病	400倍	○								
オラクル粉剤	アミスルプロム粉剤	ピシウム腐敗病	30kg/10a 土壌混和		○							
オラクル顆粒水和剤	アミスルプロム水和剤	根茎腐敗病	2000倍	○					○	○		○
オラクル顆粒水和剤	アミスルプロム水和剤	根茎腐敗病	3000倍	○								
ガスタード微粒剤	ダゾメット粉粒剤	根茎腐敗病	30~60kg/10a 土壌混和	○								
ガスタード微粒剤	ダゾメット粉粒剤	根茎腐敗病	30kg/10a 土壌混和									○
キルパー	カーバムナトリウム塩液剤	根茎腐敗病	原液として60L/10a土壌表面混和・鎮圧	○					○	○		
キルパー	カーバムナトリウム塩液剤	根茎腐敗病	原液として60L/10a 灌漑水で希釈して土壌表面散布	○					○	○		
クロールピクリン	クロールピクリンくん蒸剤	根茎腐敗病	床土・堆肥:3~5ml/穴, 圃場:2~3ml/穴 土壌くん蒸	○								
クロールピクリン	クロールピクリンくん蒸剤	根茎腐敗病	圃場:3ml/穴						○	○		
クロピク80	クロールピクリンくん蒸剤	根茎腐敗病	床土・堆肥:3~6ml/穴, 圃場:2~3ml/穴 土壌くん蒸	○								
クロピク80	クロールピクリンくん蒸剤	根茎腐敗病	床土・堆肥:3ml/穴, 圃場:2~3ml/穴 土壌くん蒸									○
クロピクテープ	クロールピクリンくん蒸剤	根茎腐敗病	圃場:110m/100㎡ 土壌くん蒸	○								
クロピクフロー	クロールピクリンくん蒸剤	根茎腐敗病	20~30L/10a 灌漑水に混入しチューブ経由注入	○					○	○		○
クロールピクリン錠剤	クロールピクリンくん蒸剤	根茎腐敗病	床土・堆肥:30×30cm毎に1錠/穴 圃場:30×30cm毎に1錠/1穴	○								
クロールピクリン錠剤	クロールピクリンくん蒸剤	根茎腐敗病	10錠/㎡ 植溝8cm間隔点状に配置	○								
クロールピクリン錠剤	クロールピクリンくん蒸剤	根茎腐敗病	10錠/㎡ 植溝8cm間隔点状に配置	○					○	○		○
ソイリーン	クロールピクリン・D-Dくん蒸剤	根茎腐敗病	30L/10a(3ml/穴)30cmチドリ注入被覆	○								
タチガレファイト液剤	ヒドロキシイソキサゾール複合肥料	ピシウム腐敗病	1000倍	○								
タチガレン液剤	ヒドロキシイソキサゾール液剤	根腐病	2000倍散布					○				
タチガレン液剤	ヒドロキシイソキサゾール液剤	ピシウム腐敗病	1000倍	○								
ダブルストッパー	クロールピクリン・D-Dくん蒸剤	根茎腐敗病	30L/10a(3ml/穴)30cmチドリ注入被覆	○								
ディトラベックス油剤	メチルイソチオシアネート・D-D油剤	根茎腐敗病	30~40L/10a 土壌くん蒸	○								
ドジョウピクリン	クロールピクリン燻蒸剤	根茎腐敗病	床土・堆肥:3~6ml/穴, 圃場:2~3ml/穴 土壌くん蒸	○								
ドジョウピクリン	クロールピクリン燻蒸剤	根茎腐敗病	床土・堆肥:3ml/穴, 圃場:2~3ml/穴 土壌くん蒸									○
ドロクロール	クロールピクリンくん蒸剤	根茎腐敗病	床土・堆肥:3~6ml/穴, 圃場:2~3ml/穴 土壌くん蒸	○								
ドロクロール	クロールピクリンくん蒸剤	根茎腐敗病	床土・堆肥:3ml/穴, 圃場:2~3ml/穴 土壌くん蒸									○
バスアミド微粒剤	ダゾメット粉粒剤	根茎腐敗病	30~60kg/10a 土壌混和	○								
バスアミド微粒剤	ダゾメット粉粒剤	根茎腐敗病	30kg/10a 土壌混和									○
ピシロック顆粒水和剤	ピカルブトラゾクス水和剤	根茎腐敗病	1000~2000倍土壌灌注		○				○	○		
フオリオゴールド	メタラキシルM・TPN水和剤	ピシウム腐敗病	1000倍散布	○	○							
プレビクールN液剤	プロパモカルブ塩酸塩液剤	根茎腐敗病	400~600倍土壌灌注		○							
ユニフォーム粒剤	アゾキシストロビン・メタラキシルM粒剤	根茎腐敗病	18kg/10a作条混和・生育期土壌表面散布		○							
ユニフォーム粒剤	アゾキシストロビン・メタラキシルM粒剤	根茎腐敗病	18kg/10a生育期土壌表面散布						○	○		○
ランマンフロアブル	シアゾファミド水和剤	ピシウム腐敗病	2000倍散布			○						
ランマンフロアブル	シアゾファミド水和剤	根茎腐敗病	500倍土壌灌注		○				○	○		
ランマンフロアブル	シアゾファミド水和剤	根茎腐敗病	200倍30分間種根茎浸漬						○	○		
ランマンフロアブル	シアゾファミド水和剤	根茎腐敗病	500~1000倍土壌灌注		○							○
リドミルゴールドMZ	マンゼブ・メタラキシルM水和剤	ピシウム腐敗病	1000倍			○						
リドミル粒剤2	メタラキシル粒剤	根茎腐敗病	10~20kg/10a 作条混和・生育期土壌表面散布		○							○
リドミル粒剤2	メタラキシル粒剤	根茎腐敗病	10~20kg/10a 土壌表面散布						○	○		