

クロロニトニルの農薬登録がある主要病原菌一覧（1）

| 作物 | 病害名 | 病原菌区分 | 菌分類 | 病原菌名 | 有効成分名 |
|----------------------|--------|-------|-----------|-------------------------------------|-------|
| あしたば | 黒枯病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Phoma</i> sp. | T P N |
| アスパラガス | 疫病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Phytophthora</i> sp. | T P N |
| | 褐斑病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Cercospora asparagi</i> | T P N |
| | 茎枯病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Phomopsis asparagi</i> | T P N |
| | 斑点病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Stemphylium botryosum</i> | T P N |
| いちじく | さび病 | 糸状菌 | 担子菌類 | <i>Phakopsora nishidana</i> | T P N |
| | 疫病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Phytophthora palmivora</i> | T P N |
| | 黒かび病 | 糸状菌 | 接合菌類 | <i>Rhizopus nigricans</i> | T P N |
| | 黒葉枯病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Fusicoccum</i> | T P N |
| うど | 黒斑病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Alternaria</i> sp. | T P N |
| うり類（漬物用、ただし、ゆうがおを除く） | うどんこ病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Sphaerotheca cucurbitae</i> | T P N |
| | つる枯病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Didymella bryoniae</i> | T P N |
| | べと病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Pseudoperonospora cubensis</i> | T P N |
| | 炭疽病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Colletotrichum orbiculare</i> | T P N |
| オクラ | 葉すす病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Pseudocercospora abelmoschi</i> | T P N |
| カーネーション | 斑点病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Alternaria dianthi</i> | T P N |
| かき | うどんこ病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Phyllactinia kakucola</i> | T P N |
| | 炭疽病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Gloeosporium kaki</i> | T P N |
| | 落葉病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Mycosphaerella nawae</i> | T P N |
| かぶ | 根くびれ病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Aphanomyces raphani</i> | T P N |
| | 根こぶ病 | 糸状菌 | 変形菌類 | <i>Plasmodiophora brassicae</i> | T P N |
| かぼちゃ | うどんこ病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Sphaerotheca cucurbitae</i> | T P N |
| | つる枯病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Didymella bryoniae</i> | T P N |
| | べと病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Pseudoperonospora cubensis</i> | T P N |
| | 黒斑病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Alternaria cucumerina</i> | T P N |
| | 白斑病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Plectosporium tabacinum</i> | T P N |
| カリフラワー | べと病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Peronospora parasitica</i> | T P N |
| かりん | ごま色斑点病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Entomosporium mespili</i> | T P N |
| | 黒点病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Mycosphaerella pomi</i> | T P N |
| | 白かび斑点病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Mycosphaerella chaenomelis</i> | T P N |
| キウイフルーツ | すす斑病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Gloeodes pomigena</i> | T P N |
| | 果実軟腐病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Botryosphaeria</i> sp. | T P N |
| きく | うどんこ病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Erysiphe cichoracearum</i> | T P N |
| | 褐斑病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Septoria obesa</i> | T P N |
| | 黒斑病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Septoria chrysanthemella</i> | T P N |
| | 白さび病 | 糸状菌 | 担子菌類 | <i>Puccinia horiana</i> | T P N |
| | 斑点病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Cylindrosporium chrysanthemi</i> | T P N |
| キャベツ | べと病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Peronospora parasitica</i> | T P N |
| | 根こぶ病 | 糸状菌 | 変形菌類 | <i>Plasmodiophora brassicae</i> | T P N |
| | 根朽病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Phoma lingam</i> | T P N |

クロロニトニルの農薬登録がある主要病原菌一覧（2）

| 作物 | 病害名 | 病原菌区分 | 菌分類 | 病原菌名 | 有効成分名 |
|---------------|-------|-------|-----------|------------------------------------|----------------------------|
| きゅうり | うどんこ病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Sphaerotheca cucurbitae</i> | T P N |
| | べと病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Pseudoperonospora cubensis</i> | T P N |
| | 灰色かび病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Botrytis cinerea</i> | T P N |
| | 褐斑病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Corynespora cassiicola</i> | T P N |
| | 黒星病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Cladosporium cucumerinum</i> | T P N |
| | 炭疽病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Colletotrichum orbiculare</i> | T P N |
| | ごぼう | うどんこ病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Podosphaera xanthii</i> |
| しきみ | 炭疽病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Gloeosporium illicii</i> | T P N |
| しゃくやく (薬用) | うどんこ病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Erysiphe paeoniae</i> | T P N |
| しょうが | 白星病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Phyllosticta zingiberis</i> | T P N |
| | 紋枯病 | 糸状菌 | 担子菌類 | <i>Rhizoctonia solani</i> | T P N |
| すいか | つる枯病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Didymella bryoniae</i> | T P N |
| | 炭疽病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Colletotrichum nymphaeae</i> | T P N |
| ズッキーニ | うどんこ病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Sphaerotheca cucurbitae</i> | T P N |
| | 灰色かび病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Botrytis cinerea</i> | T P N |
| セルリー | 萎縮炭疽病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Colletotrichum nymphaeae</i> | T P N |
| | 斑点病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Cercospora apii</i> | T P N |
| せんきゅう | べと病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Plasmopara nivea</i> | T P N |
| せんぶり | さび病 | 糸状菌 | 担子菌類 | <i>Uredo sp.</i> | T P N |
| だいこん | 炭疽病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Colletotrichum higginsianum</i> | T P N |
| | 白さび病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Albugo macrospora</i> | T P N |
| | 白斑病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Pseudocercospora capsellae</i> | T P N |
| たばこ | うどんこ病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Erysiphe cichoracearum</i> | T P N |
| たまねぎ | べと病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Peronospora destructor</i> | T P N |
| | 黄斑病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Cladosporium allii-cepae</i> | T P N |
| | 灰色かび病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Botrytis cinerea</i> | T P N |
| | 灰色腐敗病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Botrytis allii</i> | T P N |
| | 白色疫病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Phytophthora porri</i> | T P N |
| チューリップ | 褐色斑点病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Botrytis tulipae</i> | T P N |
| つつじ類 | 褐斑病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Septoria azaleae</i> | T P N |
| てんさい | 褐斑病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Cercospora beticola</i> | T P N |
| | 葉腐病 | 糸状菌 | 担子菌類 | <i>Thanatephorus cucumeris</i> | T P N |
| トマト | うどんこ病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Oidium violae</i> | T P N |
| | すすかび病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Pseudocercospora fuligena</i> | T P N |
| | 疫病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Phytophthora infestans</i> | T P N |
| | 灰色かび病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Botrytis cinerea</i> | T P N |
| | 褐色輪紋病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Corynespora cassiicola</i> | T P N |
| | 炭疽病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Colletotrichum acutatum</i> | T P N |
| | 斑点病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Stemphylium lycopersici</i> | T P N |
| | 葉かび病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Fulvia fulva</i> | T P N |
| | 輪紋病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Alternaria solani</i> | T P N |

クロロニトニルの農薬登録がある主要病原菌一覧（3）

| 作物 | 病害名 | 病原菌区分 | 菌分類 | 病原菌名 | 有効成分名 |
|------------------|--------|-------|-----------|--------------------------------------|-------|
| トルコギキョウ | 斑点病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Pseudocercospora eustomatis</i> | TPN |
| なし | 黒星病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Venturia nashicola</i> | TPN |
| | 黒斑病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Alternaria kikuchiana</i> | TPN |
| なし（西洋なしを除く） | 黒星病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Venturia nashicola</i> | TPN |
| なす | うどんこ病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Oidium sp.</i> | TPN |
| | すすかび病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Mycovellosiella nattrassii</i> | TPN |
| | 灰色かび病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Botrytis cinerea</i> | TPN |
| | 黒枯病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Corynespora melongenae</i> | TPN |
| なばな | べと病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Peronospora parasitica</i> | TPN |
| | 黒斑病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Alternaria brassicae</i> | TPN |
| | 白さび病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Albugo macrospora</i> | TPN |
| | 白斑病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Pseudocercosporella capsellae</i> | TPN |
| なばな類 | べと病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Peronospora parasitica</i> | TPN |
| なばな類 (なばなを除く) | べと病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Peronospora parasitica</i> | TPN |
| | 黒斑病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Alternaria brassicae</i> | TPN |
| | 白さび病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Albugo macrospora</i> | TPN |
| | 白斑病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Pseudocercosporella capsellae</i> | TPN |
| にがうり | うどんこ病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Oidium cirulli</i> | TPN |
| | つる枯病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Didymella bryoniae</i> | TPN |
| | べと病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Pseudoperonospora cubensis</i> | TPN |
| | 炭疽病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Colletotrichum orbiculare</i> | TPN |
| | 斑点病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Cercospora cirullina</i> | TPN |
| にんじん | 黒斑病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Alternaria radicina</i> | TPN |
| | 黒葉枯病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Alternaria dauci</i> | TPN |
| にんにく | さび病 | 糸状菌 | 担子菌類 | <i>Puccinia allii</i> | TPN |
| | 黄斑病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Heterosporium allii</i> | TPN |
| | 白斑葉枯病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Botrytis squamosa</i> | TPN |
| | 葉枯病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Pleospora herbarum</i> | TPN |
| ねぎ | さび病 | 糸状菌 | 担子菌類 | <i>Puccinia allii</i> | TPN |
| | べと病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Peronospora destructor</i> | TPN |
| | 黒斑病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Alternaria porri</i> | TPN |
| | 小核核腐敗病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Botrytis squamosa</i> | TPN |
| | 葉枯病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Pleospora herbarum</i> | TPN |
| ネクタリン | 灰星病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Monilinia fructicola</i> | TPN |
| | 黒星病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Cladosporium carpophilum</i> | TPN |
| バーベナ | うどんこ病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Oidium sp.</i> | TPN |
| はくさい | べと病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Peronospora parasitica</i> | TPN |
| | 黒斑病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Alternaria brassicae</i> | TPN |
| | 根くびれ病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Aphanomyces raphani</i> | TPN |
| | 根こぶ病 | 糸状菌 | 変形菌類 | <i>Plasmodiophora brassicae</i> | TPN |
| | 白さび病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Albugo macrospora</i> | TPN |
| | 白斑病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Pseudocercosporella capsellae</i> | TPN |

クロロニトニルの農薬登録がある主要病原菌一覧（4）

| 作物 | 病害名 | 病原菌区分 | 菌分類 | 病原菌名 | 有効成分名 |
|--------------|--------|-------|-----------|------------------------------------|-------|
| パッションフルーツ | 疫病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Phytophthora nicotianae</i> | TPN |
| | 円斑病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Septoria pastinacina</i> | TPN |
| パパイヤ | 炭疽病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Glomerella cingulata</i> | TPN |
| ばら | うどんこ病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Oidium sp.</i> | TPN |
| | 黒星病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Dhilocarpon rosae</i> | TPN |
| | 斑点病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Mycosphaerella rosicola</i> | TPN |
| ばれいしょ | 疫病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Phytophthora infestans</i> | TPN |
| | 夏疫病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Alternaria solani</i> | TPN |
| ピーマン | うどんこ病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Oidiopsis sicula</i> | TPN |
| | 黒枯病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Corynespora cassiicola</i> | TPN |
| | 炭疽病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Colletotrichum aenigma</i> | TPN |
| | 斑点病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Cercospora capsici</i> | TPN |
| ふき | 灰色かび病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Botrytis cinerea</i> | TPN |
| ぶどう | 黒とう病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Elsinoe ampelina</i> | TPN |
| | 晩腐病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Glomerella cingulata</i> | TPN |
| ブロッコリー | べと病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Peronospora parasitica</i> | TPN |
| | 根こぶ病 | 糸状菌 | 変形菌類 | <i>Plasmiodiphora brassicae</i> | TPN |
| マルメロ | ごま色斑点病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Entomosporium mespili</i> | TPN |
| みしまさいこ | 炭疽病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Colletotrichum chrysanthemi</i> | TPN |
| みずな | 立枯病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Pythium sp.</i> | TPN |
| みつば | べと病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Plasmopara nivea</i> | TPN |
| ミニトマト | うどんこ病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Oidium violae</i> | TPN |
| | すすかび病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Pseudocercospora fuligena</i> | TPN |
| | 疫病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Phytophthora infestans</i> | TPN |
| | 灰色かび病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Botrytis cinerea</i> | TPN |
| | 褐色輪紋病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Corynespora cassiicola</i> | TPN |
| | 炭疽病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Colletotrichum acutatum</i> | TPN |
| | 斑点病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Stemphylium lycopersici</i> | TPN |
| | 葉かび病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Fulvia fulva</i> | TPN |
| | 輪紋病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Alternaria solani</i> | TPN |
| みょうが (花穂) | 紋枯病 | 糸状菌 | 担子菌類 | <i>Rhizoctonia solani</i> | TPN |
| | 葉枯病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Mycosphaerella zingiberis</i> | TPN |
| みょうが (茎葉) | 紋枯病 | 糸状菌 | 担子菌類 | <i>Rhizoctonia solani</i> | TPN |
| | 葉枯病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Mycosphaerella zingiberis</i> | TPN |
| メロン | うどんこ病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Sphaerotheca fuliginea</i> | TPN |
| | つる枯病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Didymella bryoniae</i> | TPN |
| | べと病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Pseudoperonospora cubensis</i> | TPN |
| もも | 果実赤点病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Ellisembia sp.</i> | TPN |
| | 灰星病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Monilinia fructicola</i> | TPN |
| | 黒星病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Cladosporium carpophilum</i> | TPN |

クロロニトニルの農薬登録がある主要病原菌一覧（5）

| 作物 | 病害名 | 病原菌区分 | 菌分類 | 病原菌名 | 有効成分名 |
|---|---------|-------|-----------|---------------------------------------|-------|
| やまのいも | つる枯病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Didymella bryoniae</i> | TPN |
| | 炭疽病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> | TPN |
| | 葉渋病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Cylindrosporium dioscoreae</i> | TPN |
| やまのいも (むかご) | つる枯病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Didymella bryoniae</i> | TPN |
| | 炭疽病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> | TPN |
| | 葉渋病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Cylindrosporium dioscoreae</i> | TPN |
| ゆうがお | うどんこ病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Podosphaera xanthii</i> | TPN |
| | べと病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Pseudoperonospora cubensis</i> | TPN |
| | 炭疽病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Colletotrichum orbiculare</i> | TPN |
| ゆり | 斑点病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Phyllosticta cruenta</i> | TPN |
| | 葉枯病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Botrytis elliptica</i> | TPN |
| らっかせい | 褐斑病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Mycosphaerella arachidis</i> | TPN |
| らっきょう | 灰色かび病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Botrytis cinerea</i> | TPN |
| りんご | すす点病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Zygophiala jamaicensis</i> | TPN |
| | すす斑病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Gloeodes pomigena</i> | TPN |
| | モニリア病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Monilia mali</i> | TPN |
| | 褐斑病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Diplocarpon mali</i> | TPN |
| | 黒星病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Venturia inaequalis</i> | TPN |
| | 黒点病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Mycosphaerella pomi</i> | TPN |
| | 炭疽病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Colletotrichum aenigma</i> | TPN |
| | 斑点落葉病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Alternaria mari</i> | TPN |
| | 輪紋病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Botryosphaeria berengeriana</i> | TPN |
| りんどう | 褐斑病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Mycochaetophora gentianae</i> | TPN |
| | 葉枯病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Septoria gentianae</i> | TPN |
| レタス | すそ枯病 | 糸状菌 | 担子菌類 | <i>Rhizoctonia solani</i> | TPN |
| | ビッグベイン病 | 糸状菌 | ねこかび類 | <i>Olpidium brassicae</i> 媒介 LBVV | TPN |
| | べと病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Bremia lactucae</i> | TPN |
| | 灰色かび病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Botrytis cinerea</i> | TPN |
| わけぎ | さび病 | 糸状菌 | 担子菌類 | <i>Puccinia allii</i> | TPN |
| | べと病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Peronospora destructor</i> | TPN |
| | 黒斑病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Alternaria porri</i> | TPN |
| | 小核核腐敗病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Botrytis squamosa</i> | TPN |
| | 葉枯病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Botrytis elliptica</i> | TPN |
| 花き類・観葉植物（ばら、きく、チュー リップ、ゆり、りんどう を除く） | うどんこ病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Erysiphe cichoracearum</i> | TPN |
| | 斑点病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Alternaria tagetica</i> | TPN |
| 小麦 | 縞萎縮病 | ウイルス | バイモウイルス | wheat yellow mosaic virus | TPN |
| 食用ぎく | 褐斑病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Septoria obesa</i> | TPN |
| 食用ゆり | 葉枯病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Botrytis elliptica</i> | TPN |
| 西洋なし | ごま色斑点病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Entomosporium mespili</i> | TPN |
| | 褐色斑点病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Pyrus communis</i> | TPN |
| | 黒星病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Venturia pirina</i> | TPN |

クロロニトニルの農薬登録がある主要病原菌一覧（6）

| 作物 | 病害名 | 病原菌区分 | 菌分類 | 病原菌名 | 有効成分名 |
|----------------|-----------------------|-------|-----------|--|-------|
| 西洋芝（パーミューダグラス） | ヘルミント スボリウム 葉枯病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Cochliobolus</i> sp. (<i>Helminthosporium</i>) | T P N |
| 西洋芝（ペントグラス） | ヘルミント スボリウム 葉枯病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Cochliobolus</i> sp. (<i>Helminthosporium</i>) | T P N |
| | 炭疽病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Colletotrichum zoysiae</i> | T P N |
| 茶 | もち病 | 糸状菌 | 担子菌類 | <i>Exobasidium vexans</i> | T P N |
| | 灰色かび病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Botrytis cinerea</i> | T P N |
| | 褐色円星病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Pseudocercospora ocellata</i> | T P N |
| | 黒葉腐病 | 糸状菌 | 担子菌類 | <i>Ceratobasidium</i> sp | T P N |
| | 炭疽病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Discula theae-sinensis</i> | T P N |
| | 網もち病 | 糸状菌 | 担子菌類 | <i>Exobasidium reticulatum</i> | T P N |
| | 輪斑病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Neopestalotiopsis</i> spp. | T P N |
| 日本芝 | ヘルミント スボリウム 葉枯病 | 糸状菌 | 子のう菌類 | <i>Cochliobolus</i> sp. (<i>Helminthosporium</i>) | T P N |
| 麦類 (秋播栽培) | 縞萎縮病 | ウイルス | バイモウイルス | wheat yellow mosaic virus | T P N |
| 非結球はくさい | 白斑病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Pseudocercosporella capsellae</i> | T P N |
| 非結球レタス | すそ枯病 | 糸状菌 | 担子菌類 | <i>Rhizoctonia solani</i> | T P N |
| | べと病 | 糸状菌 | 卵菌類（べん毛菌） | <i>Bremia lactucae</i> | T P N |
| | 灰色かび病 | 糸状菌 | 不完全菌 | <i>Botrytis cinerea</i> | T P N |