

# コナガ防除剤一覧

薬剤	成分系	毒性	かぶ	キャベツ	だいこん	はくさい	ブロッコリー	あぶらな科野菜	非結球あぶらな科野菜	使用時期(使用方法)	本剤 使用回数
アクセルキングフロアブル	トルフェンピラト・ メタフルミゾン水和剤	劇		○	○					収穫14日前まで(散布)	2回以内
アクセルフロアブル	メタフルミゾン	普		○	○	○				収穫前日まで(散布)	3回以内
アクタラ粒剤5	ネオニコチノイド系	普		○	○	○				育苗期後半(株元散布)	1回
				○	○				播種前(培土混和)	1回	
アクテリック乳剤	有機リン系	普		○						収穫7日前まで(散布)	4回以内
アグロスリン水和剤	ピレスロイド系	劇		○	○					収穫7日前まで(散布)	5回以内
						○			収穫前日まで(散布)	5回以内	
アタロン乳剤	IGR	普		○	○					収穫7日前まで(散布)	4回以内
					○				収穫14日前まで(散布)	3回以内	
						○			収穫21日前まで(散布)	2回以内	
アティオン乳剤	ピレスロイド系	普		○		○				収穫3日前まで(散布)	5回以内
						○			収穫7日前まで(散布)	5回以内	
					○				収穫30日前まで(散布)	4回以内	
アニキ乳剤	レピメクチン	普		○	○	○	○		収穫3日前まで(散布)	3回以内	
アフームエクセラ顆粒水和剤	エマメクチン安息香酸塩 IGR	普		○	○	○			収穫7日前まで(散布)	3回以内	
アフームエクセラ顆粒水和剤	エマメクチン安息香酸塩 IGR	普			○				収穫14日前まで(散布)	3回以内	
アフーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩乳剤	普	○			○				収穫3日前まで	2回以内
		普		○						収穫前日まで	3回以内
		普			○	○		○		収穫7日前まで	3回以内
アベール粒剤	ネオニコチノイド系 ジアミド系	普		○					育苗期後半～定植当日(株元散布)	1回	
アルパリン粒剤	ネオニコチノイド系	普		○	○	○			定植時(植穴土壌混和)	1回	
アルパリン顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	普		○		○			定植前日～定植時(育苗トレイ等へ灌注)	1回	
エチモン粒剤6	有機リン系 有機リン系	劇			○				播種時(土壌混和)	1回	
エビセクト水和剤	ネライストキン	劇		○	○					収穫7日前まで(散布)	3回以内
		劇			○					収穫14日前まで(散布)	2回以内
エルサン水和剤40	有機リン系	劇		○						収穫14日前まで(散布)	2回以内
						○			収穫21日前まで(散布)	3回以内	
				○	○	○			収穫30日前まで(散布)	2回以内	
エルサン乳剤	有機リン系	劇		○						収穫14日前まで(散布)	2回以内
						○			収穫21日前まで(散布)	3回以内	
				○	○	○			収穫30日前まで(散布)	2回以内	
エルサン粉剤2	有機リン系	普		○						収穫14日前まで(散布)	2回以内
						○			収穫21日前まで(散布)	3回以内	

			○	○	○			収穫30日前まで(散布)	2回以内
オルトラン水和剤	有機リン系	普	○					収穫21日前まで(散布)	1回
			○					収穫7日前まで(散布)	3回以内
				○	○			収穫14日前まで(散布)	2回以内
オルトラン粒剤	有機リン系	普	○	○			定植時(土壌混和)及び収穫21日前まで(株元散布)	3回以内	
オルトラン粒剤	有機リン系	普		○			播種前(作条散布)	1回	
オンコルマイクロナブセル	カーバメート系	劇	○	○	○			定植時(育苗トレイ等へ灌注)	1回
オンコル粒剤1	カーバメート系	普	○	○				定植時(植穴土壌混和)	1回
オンコル粒剤5	カーバメート系	普	○	○				播種時(全面土壌混和), 定植時(植穴土壌混和又は株元散布), 育苗期後半(株元散布)	1回
オンダイアエース粒剤	有機リン系 カーバメート系	普	○	○	○			定植時(植穴土壌混和又は株元散布), 育苗期後半(株元散布ただし収穫30日前まで)	1回
ガーテンホスピタル粒剤	カーバメート系	普	○	○				育苗期後半(株元散布), 定植時(植穴土壌混和又は株元散布)	1回
ガードナーフロアブル	ネオニコチノイド系 スピノサト	劇	○	○	○			定植当日(育苗トレイ等へ灌注)	1回
カウンターフロアブル	IGR	普			○			収穫7日前まで(散布)	3回以内
カウンター乳剤	IGR	普	○					収穫7日前まで(散布)	3回以内
カスケード乳剤	IGR	普	○	○				収穫7日前まで(散布)	2回以内
				○				収穫14日前まで(散布)	3回以内
ガゼット粒剤	カーバメート系	劇	○					生育初期 但し収穫45日前まで(株元散布)	2回以内
			○	○	○			定植時(株元散布又は土壌混和), 育苗期後半(株元散布)	2回以内
				○				播種覆土後(作条土壌散布)	1回
ガリソンエース粉剤DL	インドキサカルブ	普	○	○				収穫7日前まで(散布)	2回以内
				○				収穫21日前まで(散布)	2回以内
カルホス乳剤	有機リン系	劇	○					収穫21日前まで(散布)	1回
ガンバ水和剤	IGR	劇	○					収穫21日前まで(散布)	2回以内
キックオフ顆粒水和剤	シアミト系 ネオニコチノイド系	普	○	○	○			定植前日~定植時(育苗トレイ等へ灌注)	1回
グラントオンコル粒剤	カーバメート系	劇	○					定植時	1回
コテツフロアブル	クロルフェナピル	劇	○	○	○	○		収穫前日まで(散布)	2回以内
				○				収穫14日前まで(散布)	2回以内
							○	収穫3日前まで(散布)	1回
サイアノックス乳剤	有機リン系	普	○					収穫21日前まで(散布)	2回以内
				○	○			収穫14日前まで(散布)	2回以内
サイアノックス粉剤	有機リン系	普	○	○				収穫21日前まで(散布)	2回以内
				○	○			収穫14日前まで	2回以内
サイハロン水和剤	ピレスロイド系	劇	○					収穫7日前まで	3回以内
				○				収穫21日前まで	3回以内
				○				収穫14日前まで	3回以内
サイハロン乳剤	ピレスロイド系	劇	○					収穫7日前まで	3回以内
				○				収穫21日前まで	3回以内
				○				収穫14日前まで	3回以内
サブリーナフロアブル	B.T	普			○		発生初期収穫前日まで	-	
			○					収穫21日前まで	1回

ジェイエース水溶剤	有機リン系	普	○				収穫7日前まで	3回以内	
				○	○			収穫14日前まで	2回以内
ジェイエース粒剤	有機リン系	普	○		○		定植時(植穴散布)及び生育期(株元散布) 但し、収穫21日前まで	3回以内	
				○				播種前(作条散布)	1回
ジュロフフロアブル	ジアミド系 ネオニコチノイド系	普	○				播種時(土壌灌注)	1回	
			○		○	○		育苗期後半～定植当日(育苗トレイ等へ灌注)	1回
スカウトフロアブル	ピレスロイド系	劇	○		○		収穫前日まで(散布)	5回以内	
スカウト乳剤	ピレスロイド系	劇	○		○		収穫前日まで(散布)	5回以内	
スターガード粒剤	ネオニコチノイド系	普	○		○	○	定植時(植穴土壌混和)	1回	
スタークル粒剤	ネオニコチノイド系	普	○		○	○	定植時(植穴土壌混和)	1回	
スタークル顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	普	○			○	定植前日～定植時(育苗トレイ等へ灌注)	1回	
スピノエース顆粒水和剤	スピノサト	普	○		○	○	収穫3日前まで(散布)	3回以内	
				○			○	収穫7日前まで	3回以内
スミフェート水溶剤	有機リン系	普	○				○ 収穫14日前まで	2回以内	
				○				収穫21日前まで	1回
				○				収穫7日前まで	3回以内
スミフェート粒剤	有機リン系	普		○	○		収穫14日前まで	2回以内	
				○				定植時(植穴散布)及び生育期(株元散布) 但し、収穫21日前まで	3回以内
セルオーフロアブル	ネオニコチノイド系 ジアミド系	普		○			播種前(作条散布)	1回	
				○	○	○		定植3日前～定植時(育苗トレイ等へ灌注)	1回
ゼンターリ顆粒水和剤	B.T	普				○	発生初期(散布)但し、収穫前日まで	-	
ダイアジノン水和剤34	有機リン系	劇	○			○	収穫30日前まで(散布)	2回以内	
ダイアジノン乳剤40	有機リン系	劇	○			○	収穫30日前まで(散布)	2回以内	
ダントツ水溶剤	ネオニコチノイド系	普	○			○	収穫3日前まで(散布)	2回以内	
ダントツ粒剤	ネオニコチノイド系	普	○			○	定植時(植穴土壌混和)、育苗期後半(株元散布)	1回	
チュリサイト水和剤	B.T	普					○ 発生初期ただし、収穫7日前まで(散布)	-	
ディアナSC	スピネトラム	普	○	○	○	○	収穫前日まで(散布)	2回以内	
テルスター水和剤	ピレスロイド系	普	○		○		収穫21日前まで(散布)	4回以内	
トクチオン乳剤	有機リン系	普	○				収穫21日前まで(散布)	2回以内	
トルネードエースDF	インドキサカルブ	普	○		○		収穫7日前まで(散布)	2回以内	
					○			収穫21日前まで(散布)	2回以内
						○		収穫14日前まで(散布)	2回以内
トルネードフロアブル	インドキサカルブ	普	○		○		収穫7日前まで(散布)	2回以内	
					○			収穫21日前まで(散布)	2回以内
						○		収穫14日前まで(散布)	2回以内
トレホン乳剤	ピレスロイド系	普	○				収穫3日前まで(散布)	3回以内	
					○			収穫21日前まで(散布)	3回以内
						○		収穫7日前まで(散布)	3回以内
ノーマル乳剤	IGR	普	○		○	○	収穫7日前まで(散布)	2回以内	
			○					収穫7日前まで(無人ヘリ散布)	2回以内

										収穫21日前まで(散布)	2回以内
										収穫21日前まで(無人ヘリ散布)	2回以内
ハイスロイド乳剤	ピレスロイド系	劇		○		○				収穫7日前まで(散布)	4回以内
						○				収穫3日前まで(散布)	4回以内
ハイベニカ	ピレスロイド系	普		○						収穫7日前まで(散布)	5回以内
ハイベニカ乳剤	ピレスロイド系	普		○						収穫7日前まで(散布)	5回以内
ハクサップ水和剤	ピレスロイド系 有機リン系	劇		○		○				収穫前日まで(散布)	5回以内
		劇				○				収穫35日前まで(散布)	3回以内
ハクサップ乳剤	ピレスロイド系 有機リン系	劇		○		○				収穫前日まで(散布)	5回以内
パダンSG水溶剤	ネライストキン	劇		○						収穫14日前まで(散布)	4回以内
						○	○	○		収穫7日前まで(散布)	3回以内
パダントレホン粉剤DL	ピレスロイド系 ネライストキン	普		○						収穫14日前まで(散布)	3回以内
パダン水溶剤	ネライストキン	劇		○						収穫14日前まで(散布)	4回以内
		劇				○	○			収穫7日前まで(散布)	3回以内
パダン粉剤	ネライストキン	普		○						収穫14日前まで(散布)	4回以内
ハチハチフロアブル	トルフェンピラト	劇		○		○				収穫14日前まで(散布)	2回以内
				○						収穫7日前まで(散布)	2回以内
ハチハチ乳剤	トルフェンピラト	劇		○	○	○				収穫14日前まで(散布)	2回以内
								○		収穫3日前まで	2回以内
ファルコンエースフロアブル	スピノサト IGR	普		○	○					収穫7日前まで	2回以内
						○	○			収穫3日前まで	2回以内
ファルコンフロアブル	IGR	普		○						収穫7日前まで	2回以内
フェニックス顆粒水和剤	ジアミド系	普	○	○		○	○			収穫前日まで	2回以内
						○				収穫7日前まで	2回以内
プリロツ粒剤	ジアミド系	普		○	○	○	○			育苗期後半～定植当日(株元散布)	1回
				○						定植前まで(育苗トレイ等へ灌注), 収穫14日前まで(散布)	1回
プリンスフロアブル	フィプロニル	劇				○				定植前まで(育苗トレイ等へ灌注), 収穫21日前まで(散布)	2回以内
							○			収穫30日前まで(散布)	2回以内
プリンス粒剤	フィプロニル	普		○						播種時～定植前(育苗トレイ等へ散布)	1回
プレオフロアブル	ピリダリル	普		○		○	○		○	収穫7日前まで(散布)	2回以内
プレオフロアブル	ピリダリル	普				○				収穫14日前まで(散布)	2回以内
プレバソフロアブル5	ジアミド系	普	○	○	○	○	○			収穫前日まで(散布)	3回以内
プレバソフロアブル5	ジアミド系	普		○		○	○			育苗期後半～定植当日(育苗トレイ等へ灌注)	1回
プレバソ粒剤	ジアミド系	普		○		○	○			育苗期後半～定植当日(育苗トレイ等へ灌注), 育苗期後半～定植時(株元散布)	1回
ペイオFME液剤	ピレスロイド系	劇		○						収穫7日前まで(散布)	4回以内
ベジホン乳剤	有機リン系 ピレスロイド系	劇		○						収穫7日前まで(散布)	3回以内
ベジホン乳剤	有機リン系 ピレスロイド系	劇				○				収穫35日前まで(散布)	3回以内
ベジホン乳剤	有機リン系 ピレスロイド系	劇				○				収穫14日前まで(散布)	3回以内
ベニカS乳剤	ピレスロイド系	普		○			○			収穫3日前まで(散布)	5回以内
ベニカS乳剤	ピレスロイド系	普				○				収穫30日前まで(散布)	4回以内

ベニカS乳剤	ピレスロイド系	普			○			収穫7日前まで(散布)	5回以内
ベニカ液剤	ネオニコチノイド系	普	○					収穫3日前まで(散布)	2回以内
ベニカ水溶剤	ネオニコチノイド系	普	○		○			収穫3日前まで(散布)	2回以内
ベニカ粒剤	ネオニコチノイド系	普	○		○			定植時(植穴土壌混和), 育苗期後半(株元散布)	1回
ベネビアOD	ジアミド系	普	○	○	○			収穫前日まで(散布)	3回以内
ベリマークSC	ジアミド系	普	○	○	○			育苗期後半～定植当日(株元散布)	1回
ホームガーデン粒剤	カーバメート系	普	○	○				定植時(植穴土壌混和)	1回
ホリアムガンダム顆粒水和剤	エマメクチン安息香酸 ジアミド系	普	○	○	○			収穫7日前まで(散布)	3回以内
マイクレーン	ピリミジフェン	普	○	○				収穫7日前まで(散布)	4回以内
マツチ乳剤	IGR	普	○	○				収穫7日前まで(散布)	3回以内
				○				収穫14日前まで(散布)	3回以内
マプリック水和剤20	ピレスロイド系	劇	○	○				収穫14日前まで(散布)	3回以内
					○			収穫21日前まで(散布)	2回以内
モスピランSL液剤	ネオニコチノイド系	劇	○					収穫7日前まで(散布)	5回以内
				○	○	○		収穫14日前まで(散布)	1回
モスピラン水溶剤	ネオニコチノイド系	劇	○					収穫7日前まで(散布)	5回以内
				○	○	○		収穫14日前まで(散布)	1回
モスピラン粒剤	ネオニコチノイド系	普	○	○	○			定植前日～定植当日(株元散布), 定植時(植穴土壌混和)	1回
				○			○	播種時(播種溝土壌混和)	1回
					○	○		定植時(植穴土壌混和)	1回
モスピラン顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	劇	○					収穫7日前まで(散布)	5回以内
				○	○	○		収穫14日前まで(散布)	1回
ランネット45DF	カーバメート系	劇	○					収穫3日前まで(散布)	3回以内
				○				収穫14日前まで(散布)	2回以内
					○			収穫前日まで(散布)	2回以内
ランネット微粒剤F	カーバメート系	劇	○					収穫7日前まで(散布)	3回以内
				○				収穫14日前まで(散布)	2回以内
リーフガード顆粒水和剤	ネライストキン	劇	○	○	○			収穫7日前まで(散布)	3回以内
				○				収穫14日前まで(散布)	2回以内
ルーバン水和剤	ネライストキン	普	○	○				収穫7日前まで(散布)	3回以内
				○				収穫14日前まで(散布)	3回以内
レルダン乳剤25	有機リン系	普	○					収穫7日前まで(散布)	4回以内

※登録内容の概要を示したので、実際の使用に当たっては農業ラベルを十分に確認した上で、正しくご使用願いたい。