

オオタバコガ防除薬剤一覧

薬剤	成分系	成分	キヤベツ	はくさい	レタス	ブロッコリー	使用時期	使用方法	本剤使用回数
アケルキンゴフロアブル	その他 その他	トルフェンピラト メタフルミゾン	○				収穫14日前まで	散布	2回以内
アケルフロアブル	その他	メタフルミゾン	○				収穫前日まで	散布	3回以内
アキ乳剤	その他	レピメクチン	○	○	○		収穫3日前まで	散布	3回以内
アフームエケセ7顆粒水和剤	その他 IGR	エマメクチン安息香酸塩 ルフェスロン		○	○		収穫7日前まで	散布	3回以内
アフーム乳剤	その他	エマメクチン安息香酸塩			○	○	収穫3日前まで	散布	3回以内
オルトラン水和剤	有機リン系	アセフェート			○		収穫14日前まで	散布	3回以内
カートナーフロアブル	ネオニコチノイド系 その他	イミダクロプリド スピノサド			○		定植当日	灌注	1回
カスケード乳剤	IGR	フルフェノクスロン			○		収穫3日前まで	散布	3回以内
キックオフ顆粒水和剤	ジアミド系 ネオニコチノイド系	クロラントラニプリブロール ジメトフラン			○		定植前日～定植時	灌注	1回
コテツフロアブル	その他	コルフェナピル	○		○		収穫前日まで	散布	2回以内
ジエイエス水溶剤	有機リン系	アセフェート			○		収穫14日前まで	散布	3回以内
ジュリボフロアブル	ジアミド系 ネオニコチノイド系	クロラントラニプリブロール チアトキサム			○		育苗期後半～定植当日	灌注	1回
スピノエス顆粒水和剤	その他	スピノサド			○		収穫3日前まで	散布	3回以内
スミエート水溶剤	有機リン系	アセフェート			○		収穫14日前まで	散布	3回以内
セルオーフロアブル	ネオニコチノイド系 ジアミド系	イミダクロプリド フルベンジアミド			○		定植3日前～定植時	灌注	1回
ティアナSC	その他	スピノトラム	○		○		収穫前日まで	散布	2回以内
トルネードエースDF	その他	インドキサカルブ			○		収穫7日前まで	散布	2回以内
トルネードフロアブル	その他	インドキサカルブMP			○		収穫7日前まで	散布	2回以内
ハクサップ水和剤	ヒレスロイド系 有機リン系	フェンハレレート マラソン			○		収穫3日前まで	散布	2回以内
ハクサップ水和剤	ヒレスロイド系 有機リン系	フェンハレレート マラソン	○	○			収穫前日まで	散布	5回以内
ファルコンエースフロアブル	その他 IGR	スピノサド メキシフェニジト			○		収穫3日前まで	散布	2回以内
ファルコンフロアブル	IGR	メキシフェニジト	○		○		収穫3日前まで	散布	2回以内
フェニックス顆粒水和剤	ジアミド系	フルベンジアミド	○	○	○		収穫前日まで	散布	2回以内
フレロッソ粒剤	ジアミド系	シアントラニプリブロール			○		育苗期後半～定植時	株元散布	1回
フレンスフロアブル	その他	フィプロニル	○	○			収穫14日前まで	散布	2回以内
フレンスフロアブル	その他	フィプロニル		○			収穫21日前まで	散布	2回以内
フレオフロアブル	その他	ピリタリル	○	○	○		収穫7日前まで	散布	2回以内
フレバソフロアブル5	ジアミド系	クロラントラニプリブロール	○		○		収穫前日まで	散布	3回以内
フレバソ粒剤	ジアミド系	クロラントラニプリブロール			○		育苗期後半～定植時	株元散布	1回
ベネビオOD	ジアミド系	シアントラニプリブロール	○		○		収穫前日まで	散布	3回以内
ベリマークSC	ジアミド系	シアントラニプリブロール			○		育苗期後半～定植時	灌注	1回
ボタニガードES	天敵微生物	ボデーリアバシアーナ			○		発生初期	散布	-
ボリアムカクタム顆粒水和剤	その他 ジアミド系	エマメクチン安息香酸塩 クロラントラニプリブロール			○		収穫3日前まで	散布	3回以内
マッチ乳剤	IGR	ルフェスロン			○		収穫3日前まで	散布	3回以内
マトリックフロアブル	IGR	クロマフェニジト			○		収穫7日前まで	散布	3回以内
モスビラン粒剤	ネオニコチノイド系	アセタミプリド			○		定植前日～定植当日	株元散布	1回
ラービソフロアブル	カーバメート系	チオシカルブ			○		収穫14日前まで	散布	2回以内
ランネット45DF	カーバメート系	メソミル			○		収穫7日前まで	散布	2回以内

※登録内容の概要を示したので、実際の使用に当たっては農薬ラベルを十分に確認した上で、正しくご使用願いたい。