

コナガ防除剤一覧

薬剤	成分系	毒性	かぶ	キヤベツ	だいこん	はくさい	ブロッコリー	あぶらな科野菜	非結球あぶらな科野菜	使用時期（使用方法）	本剤 使用回数
アクセルキングフロアブル	トルフェンピラト・ メタフルミゾン水和剤	劇		○		○				収穫14日前まで（散布）	2回以内
アクセルフロアブル	メタフルミゾン	普		○		○	○			収穫前日まで（散布）	3回以内
アクトラ粒剤5	ネニコチノイト [®] 系	普		○		○	○			育苗期後半（株元散布）	1回
				○		○			播種前（培土混和）	1回	
アクトリック乳剤	有機リン系	普		○						収穫7日前まで（散布）	4回以内
アクロスリン水和剤	ピレスロイト [®] 系	劇		○	○					収穫7日前まで（散布）	5回以内
						○			収穫前日まで（散布）	5回以内	
アクアロン乳剤	IGR	普		○		○				収穫7日前まで（散布）	4回以内
					○				収穫14日前まで（散布）	3回以内	
							○			収穫21日前まで（散布）	2回以内
アクティオン乳剤	ピレスロイト [®] 系	普		○			○			収穫3日前まで（散布）	5回以内
						○			収穫7日前まで（散布）	5回以内	
					○				収穫30日前まで（散布）	4回以内	
アキ乳剤	ピレメクチン	普		○	○	○	○		収穫3日前まで（散布）	3回以内	
アフームエクスラ顆粒水和剤	エマメクチン安息香酸塩 IGR	普		○		○	○		収穫7日前まで（散布）	3回以内	
アフームエクスラ顆粒水和剤	エマメクチン安息香酸塩 IGR	普			○				収穫14日前まで（散布）	3回以内	
アフーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩乳剤	普	○				○			収穫3日前まで	2回以内
		普		○						収穫前日まで	3回以内
		普			○	○			○	収穫7日前まで	3回以内
アパイル粒剤	ネニコチノイト [®] 系 ジアミト [®] 系	普		○					育苗期後半～定植当日（株元散	1回	
アルパリン粒剤	ネニコチノイト [®] 系	普		○		○	○		定植時（植穴土壌混和）	1回	
アルパリン顆粒水溶剤	ネニコチノイト [®] 系	普		○			○		定植前日～定植時（育苗トレイ等	1回	
エチモン粒剤6	有機リン系 有機リン系	劇			○				播種時（土壌混和）	1回	
エビセクト水和剤	トリスチキン	劇		○		○				収穫7日前まで（散布）	3回以内
		劇			○					収穫14日前まで（散布）	2回以内
エルサン水和剤40	有機リン系	劇		○						収穫14日前まで（散布）	2回以内
						○				収穫21日前まで（散布）	3回以内

			○		○		○			収穫30日前まで（散布）	2回以内	
エルサン乳剤	有機リン系	劇		○						収穫14日前まで（散布）	2回以内	
						○				収穫21日前まで（散布）	3回以内	
			○		○		○			収穫30日前まで（散布）	2回以内	
エルサン粉剤2	有機リン系	普		○						収穫14日前まで（散布）	2回以内	
						○				収穫21日前まで（散布）	3回以内	
			○		○		○			収穫30日前まで（散布）	2回以内	
オトルン水和剤	有機リン系	普	○							収穫21日前まで（散布）	1回	
				○							収穫7日前まで（散布）	3回以内
					○	○					収穫14日前まで（散布）	2回以内
オトルン粒剤	有機リン系	普	○		○				定植時（土壌混和）及び収穫21日前まで（株元散布）	3回以内		
オトルン粒剤	有機リン系	普		○					播種前（作条散布）	1回		
オンコルマイクロカプセル	カーバメート系	劇	○		○	○			定植時（育苗トレイ等へ灌注）	1回		
オンコル粒剤1	カーバメート系	普	○		○				定植時（植穴土壌混和）	1回		
オンコル粒剤5	カーバメート系	普	○		○				播種時（全面土壌混和）、定植時（植穴土壌混和又は株元散布）、育苗期後半（株元散布）、収穫期後半（株元散布）	1回		
オンタ イアース粒剤	有機リン系 カーバメート系	普	○		○	○			定植時（植穴土壌混和又は株元散布）、育苗期後半（株元散布）、収穫期後半（株元散布）	1回		
ガードンホスピタル粒剤	カーバメート系	普	○		○				播種時（植穴土壌混和又は株元散布）	1回		
ガードナーフロアブル	ネニコチノイド系 スピノサド	劇	○		○	○			定植当日（育苗トレイ等へ灌注）	1回		
カウンターフロアブル	IGR	普			○				収穫7日前まで（散布）	3回以内		
カウンター乳剤	IGR	普	○						収穫7日前まで（散布）	3回以内		
カスケード乳剤	IGR	普		○		○				収穫7日前まで（散布）	2回以内	
					○					収穫14日前まで（散布）	3回以内	
ガゼット粒剤	カーバメート系	劇		○						生育初期 但し収穫45日前まで	2回以内	
				○		○	○				定植時（株元散布又は土壌混和）、育苗期後半（株元散布）	2回以内
					○						播種覆土後（作条土壌散布）	1回
ガリソエース粉剤DL	イントキサカルブ	普		○		○				収穫7日前まで（散布）	2回以内	
					○						収穫21日前まで（散布）	2回以内
カルホス乳剤	有機リン系	劇	○						収穫21日前まで（散布）	1回		
ガンバ水和剤	IGR	劇	○						収穫21日前まで（散布）	2回以内		
キックオフ顆粒水和剤	ジアミド系 ネニコチノイド系	普	○		○	○			定植前日～定植時（育苗トレイ等へ）	1回		
グランドオンコル粒剤	カーバメート系	劇	○						定植時	1回		
コテツフロアブル	クロルフェナピル	劇	○	○		○	○			収穫前日まで（散布）	2回以内	
					○						収穫14日前まで（散布）	2回以内

									○	収穫3日前まで（散布）	1回	
サイアノックス乳剤	有機リン系	普		○						収穫21日前まで（散布）	2回以内	
					○	○					収穫14日前まで（散布）	2回以内
サイアノックス粉剤	有機リン系	普	○	○						収穫21日前まで（散布）	2回以内	
					○	○					収穫14日前まで	2回以内
サイハロン水和剤	ピレスロイド系	劇		○						収穫7日前まで	3回以内	
					○						収穫21日前まで	3回以内
						○					収穫14日前まで	3回以内
サイハロン乳剤	ピレスロイド系	劇		○						収穫7日前まで	3回以内	
					○						収穫21日前まで	3回以内
						○					収穫14日前まで	3回以内
サブリンフロアブル	B.T	普					○		発生初期収穫前日まで	-		
ジェイエース水溶剤	有機リン系	普	○							収穫21日前まで	1回	
				○							収穫7日前まで	3回以内
					○	○					収穫14日前まで	2回以内
ジェイエース粒剤	有機リン系	普		○		○				定植時（植穴散布）及び生育期（株元散布） 但し、収穫21日前まで	3回以内	
					○						播種前（作条散布）	1回
ジュリボフロアブル	ジアミド系 ネオニコチノイド系	普		○						播種時（土壌灌注）	1回	
				○		○	○				育苗期後半～定植当日（育苗トレイ等）	1回
スカウトフロアブル	ピレスロイド系	劇		○		○				収穫前日まで（散布）	5回以内	
スカウト乳剤	ピレスロイド系	劇		○		○				収穫前日まで（散布）	5回以内	
スターガード粒剤	ネオニコチノイド系	普		○		○	○			定植時（植穴土壌混和）	1回	
スタークル粒剤	ネオニコチノイド系	普		○		○	○			定植時（植穴土壌混和）	1回	
スタークル顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	普		○			○			定植前日～定植時（育苗トレイ等）	1回	
スピノース顆粒水和剤	スピノサト	普		○		○	○			収穫3日前まで（散布）	3回以内	
					○						収穫7日前まで	3回以内
									○		収穫14日前まで	2回以内
スミフェイト水溶剤	有機リン系	普	○							収穫21日前まで	1回	
				○							収穫7日前まで	3回以内
					○	○					収穫14日前まで	2回以内
スミフェイト粒剤	有機リン系	普		○		○				定植時（植穴散布）及び生育期（株元散布） 但し、収穫21日前まで	3回以内	
					○						播種前（作条散布）	1回
セルオーフロアブル	ネオニコチノイド系 ジアミド系	普		○		○	○			定植3日前～定植時（育苗トレイ等）	1回	

ゼンタリ顆粒水和剤	B. T	普				○				発生初期（散布） 但し、収穫前	-
ダミアン水和剤34	有機リン系	劇	○			○				収穫30日前まで（散布）	2回以内
ダミアン乳剤40	有機リン系	劇	○			○				収穫30日前まで（散布）	2回以内
ダントツ水溶剤	ネオチノイト系	普	○			○				収穫3日前まで（散布）	2回以内
ダントツ粒剤	ネオチノイト系	普	○			○				定植時（植穴土壌混和），育苗	1回
チュールサイト水和剤	B. T	普							○	発生初期ただし、収穫7日前まで	-
ディアナSC	スピネラム	普	○	○	○	○				収穫前日まで（散布）	2回以内
テルスター水和剤	ピレスロイト系	普	○			○				収穫21日前まで（散布）	4回以内
トクチオン乳剤	有機リン系	普	○							収穫21日前まで（散布）	2回以内
トルネードエースDF	イントキサカルブ	普	○			○				収穫7日前まで（散布）	2回以内
				○						収穫21日前まで（散布）	2回以内
						○				収穫14日前まで（散布）	2回以内
トルネードフロアブル	イントキサカルブ	普	○			○				収穫7日前まで（散布）	2回以内
				○						収穫21日前まで（散布）	2回以内
						○				収穫14日前まで（散布）	2回以内
トレボン乳剤	ピレスロイト系	普	○							収穫3日前まで（散布）	3回以内
				○						収穫21日前まで（散布）	3回以内
						○				収穫7日前まで（散布）	3回以内
ノーマルト乳剤	IGR	普	○			○	○			収穫7日前まで（散布）	2回以内
			○							収穫7日前まで（無人ヘリ散布）	2回以内
				○						収穫21日前まで（散布）	2回以内
				○						収穫21日前まで（無人ヘリ散布）	2回以内
ハイロイト乳剤	ピレスロイト系	劇	○			○				収穫7日前まで（散布）	4回以内
				○						収穫3日前まで（散布）	4回以内
ハイニカ	ピレスロイト系	普	○							収穫7日前まで（散布）	5回以内
ハイニカ乳剤	ピレスロイト系	普	○							収穫7日前まで（散布）	5回以内
ハクサップ水和剤	ピレスロイト系 有機リン系	劇	○			○				収穫前日まで（散布）	5回以内
		劇		○						収穫35日前まで（散布）	3回以内
ハクサップ乳剤	ピレスロイト系 有機リン系	劇	○			○				収穫前日まで（散布）	5回以内
ハダソンSG水溶剤	ネライストキン	劇	○							収穫14日前まで（散布）	4回以内
				○	○	○				収穫7日前まで（散布）	3回以内
ハダントレボン粉剤DL	ピレスロイト系 ネライストキン	普	○							収穫14日前まで（散布）	3回以内
ハダソニック水溶剤	ネライストキン	劇	○							収穫14日前まで（散布）	4回以内

ハチハチフロアブル	トルフェンピラト	劇				○	○			収穫7日前まで（散布）	3回以内	
バダシ粉剤	ネリスチン	普		○						収穫14日前まで（散布）	4回以内	
ハチハチフロアブル	トルフェンピラト	劇		○		○				収穫14日前まで（散布）	2回以内	
ハチハチ乳剤	トルフェンピラト	劇	○							収穫7日前まで（散布）	2回以内	
				○	○	○					収穫14日前まで（散布）	2回以内
								○			収穫3日前まで	2回以内
ファルコンエースフロアブル	スピノサト IGR	普		○	○					収穫7日前まで	2回以内	
							○	○			収穫3日前まで	2回以内
ファルコンフロアブル	IGR	普		○						収穫7日前まで	2回以内	
フェニックス顆粒水和剤	ジアミト系	普	○	○		○	○			収穫前日まで	2回以内	
					○						収穫7日前まで	2回以内
プロロッソ粒剤	ジアミト系	普		○	○	○	○			育苗期後半～定植当日（株元散	1回	
プロリンフロアブル	フィプロニル	劇		○						定植前まで（育苗トレイ等へ灌 注），収穫14日前まで（散 布）	1回	
						○					定植前まで（育苗トレイ等へ灌 注），収穫21日前まで（散 布）	2回以内
								○			収穫30日前まで（散布）	2回以内
プロリン粒剤	フィプロニル	普		○					播種時～定植前（育苗トレイ等へ散	1回		
プロレオフロアブル	ピリタリル	普		○		○	○	○		収穫7日前まで（散布）	2回以内	
プロレオフロアブル	ピリタリル	普			○					収穫14日前まで（散布）	2回以内	
プロレバソフロアブル5	ジアミト系	普	○	○	○	○	○			収穫前日まで（散布）	3回以内	
プロレバソフロアブル5	ジアミト系	普		○		○	○			育苗期後半～定植当日（育苗トレイ等へ灌注）	1回	
プロレバソ粒剤	ジアミト系	普		○		○	○			育苗期後半～定植時（株元散布）	1回	
ベイトME液剤	ピレスロイド系	劇		○						収穫7日前まで（散布）	4回以内	
ベシホ乳剤	有機リン系 ピレスロイド系	劇		○						収穫7日前まで（散布）	3回以内	
ベシホ乳剤	有機リン系 ピレスロイド系	劇			○					収穫35日前まで（散布）	3回以内	
ベシホ乳剤	有機リン系 ピレスロイド系	劇				○				収穫14日前まで（散布）	3回以内	
ベニカS乳剤	ピレスロイド系	普		○			○			収穫3日前まで（散布）	5回以内	
ベニカS乳剤	ピレスロイド系	普			○					収穫30日前まで（散布）	4回以内	
ベニカS乳剤	ピレスロイド系	普				○				収穫7日前まで（散布）	5回以内	
ベニカ液剤	ネニコチノイド系	普		○						収穫3日前まで（散布）	2回以内	
ベニカ水溶剤	ネニコチノイド系	普		○			○			収穫3日前まで（散布）	2回以内	
ベニカ粒剤	ネニコチノイド系	普		○			○			定植時（植穴土壌混和），育苗	1回	
ベネアOD	ジアミト系	普		○		○	○			収穫前日まで（散布）	3回以内	
ベリマークSC	ジアミト系	普		○		○	○			育苗期後半～定植当日（株元散	1回	

ホームガードン粒剤	カーハート系	普	○	○					定植時（植穴土壌混和）	1回	
ホリアムカントム顆粒水和剤	エマクチン安息香酸ジアミド系	普	○	○	○				収穫7日前まで（散布）	3回以内	
マイトクレーン	ピリジフェン	普	○	○					収穫7日前まで（散布）	4回以内	
マッチ乳剤	IGR	普	○	○					収穫7日前まで（散布）	3回以内	
				○						収穫14日前まで（散布）	3回以内
マブリック水和剤20	ピレスロイド系	劇	○	○					収穫14日前まで（散布）	3回以内	
					○					収穫21日前まで（散布）	2回以内
モスビランSL液剤	ネオコチノイド系	劇	○						収穫7日前まで（散布）	5回以内	
				○	○	○				収穫14日前まで（散布）	1回
モスビラン水溶剤	ネオコチノイド系	劇	○						収穫7日前まで（散布）	5回以内	
				○	○	○				収穫14日前まで（散布）	1回
モスビラン粒剤	ネオコチノイド系	普	○	○	○				定植前日～定植当日（株元散布）、定植時（植穴土壌混和）	1回	
				○			○			播種時（播種溝土壌混和）	1回
					○	○				定植時（植穴土壌混和）	1回
モスビラン顆粒水溶剤	ネオコチノイド系	劇	○						収穫7日前まで（散布）	5回以内	
				○	○	○				収穫14日前まで（散布）	1回
ランネット45DF	カーハート系	劇	○						収穫3日前まで（散布）	3回以内	
				○						収穫14日前まで（散布）	2回以内
					○					収穫前日まで（散布）	2回以内
ランネット微粒剤F	カーハート系	劇	○						収穫7日前まで（散布）	3回以内	
				○						収穫14日前まで（散布）	2回以内
リーフガード顆粒水和剤	トリスチキン	劇	○	○	○				収穫7日前まで（散布）	3回以内	
				○						収穫14日前まで（散布）	2回以内
ルーバン水和剤	トリスチキン	普	○	○					収穫7日前まで（散布）	3回以内	
				○						収穫14日前まで（散布）	3回以内
レルダン乳剤25	有機リン系	普	○					収穫7日前まで（散布）	4回以内		

※登録内容の概要を示したので、実際の使用に当たっては農薬ラベルを十分に確認した上で、正しくご使用願いたい。