

ハスモンヨトウ防除薬剤一覧

薬剤	成分系	成分	キヤベツ	はくさい	だいこん	レタス	ブロッコリー	使用時期	使用方法	本剤使用回数	
アケルキンクフロアブル	その他 その他	トルフェンビラト メタフルミゾン	○					収穫14日前まで	散布	2回以内	
アケルフロアブル	その他	メタフルミゾン	○	○				収穫前日まで	散布	3回以内	
アケルハイト	その他	メタフルミゾン	○	○				収穫7日前まで	株元散布	3回以内	
アグロソリン水和剤	ヒレスロイト系	シベルメトリン		○				収穫前日まで	散布	5回以内	
アタブロン乳剤	IGR	クロルフルアズロン	○	○	○	○		収穫14日前まで	散布	3回以内	
アネキ乳剤	その他	レピメチン	○	○		○	○	収穫3日前まで	散布	3回以内	
アファムエクセラ顆粒水和剤	その他 IGR	エマクチン安息香酸塩 ルフェスロン	○	○			○	収穫7日前まで	散布	3回以内	
アファム乳剤	その他	エマクチン安息香酸塩	○			○		収穫3日前まで	散布	3回以内	
アバール	ネオニコチノイド系 ジアミド系	イミダクロプリド クワランテニリアロール	○					育苗期後半～定植当日	株元散布	1回	
アルパリン顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	ジメテフラン					○	定植前日～定植時	灌注	1回	
エルサン乳剤	有機リン系	PAP	○	○	○	○	○	収穫21日前まで	散布	2回以内	
オルトラン水和剤	有機リン系	アセフェート	○					収穫7日前まで	散布	3回以内	
ガードナーフロアブル	ネオニコチノイド系 その他	イミダクロプリド スピノサト	○					定植当日	灌注	1回	
カウンター乳剤	IGR	パルメロン	○					収穫7日前まで	散布	3回以内	
カスケード乳剤	IGR	フルフェクスロン	○				○	収穫7日前まで	散布	2回以内	
カンパ水和剤	その他	ジメテフラン	○					収穫3日前まで	散布	3回以内	
キックオフ顆粒水和剤	ジアミド系 ネオニコチノイド系	クワランテニリアロール ジメテフラン	○			○	○	定植前日～定植時	灌注	1回	
コテツフロアブル	その他	クロルフェニル					○	収穫7日前まで	散布	2回以内	
ジェイエース水溶剤	有機リン系	アセフェート		○			○	収穫14日前まで	散布	3回以内	
ジャックポット顆粒水和剤	B.T	バチルス チュリンゲンシス菌の生芽胞及	○					発生初期 但し、収穫前日まで	散布	-	
ジュピロフロアブル	ジアミド系 ネオニコチノイド系	クワランテニリアロール チアトキサム	○	○			○	○	育苗期後半～定植当日	灌注	1回
スターク顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	ジメテフラン					○	定植前日～定植時	灌注	1回	
スミフェート水溶剤	有機リン系	アセフェート	○	○			○	収穫14日前まで	散布	3回以内	
セルオーフロアブル	ネオニコチノイド系 ジアミド系	イミダクロプリド フルベンジジアミド	○	○			○	定植3日前～定植時	灌注	1回	
チーフメイト乳剤	ヒレスロイト系 有機リン系	フルトリネート PAP	○					収穫14日前まで	散布	2回以内	
チューレックス顆粒水和剤	B.T	バチルス チュリンゲンシス菌の生芽胞及	○					発生初期 但し、収穫前日まで	散布	-	
ディナSC	その他	スピネトラム	○				○	収穫前日まで	散布	2回以内	
デナボン5%バイト	カーバメート系	NAC	○					収穫14日前まで	株元散布	3回以内	
トクチン乳剤	有機リン系	プロチオホス	○					収穫21日前まで	散布	2回以内	
トルネートエスDF	その他	イントキサカルブ	○				○	収穫7日前まで	散布	2回以内	
トルネートフロアブル	その他	イントキサカルブMP	○				○	収穫7日前まで	散布	2回以内	
ノーモルト乳剤	IGR	テフルベンズロン	○				○	収穫7日前まで	散布	2回以内	
ハクシップ水和剤	ヒレスロイト系 有機リン系	フェンハレレート マラソン			○			収穫35日前まで	散布	3回以内	
ハスモン天敵	微生物	ハスモンヨトウ核多角体病ウイルス	○				○	発生初期	散布	-	
ファルコンエースフロアブル	その他 IGR	スピノサト トキシフェニジト	○					○	収穫7日前まで	散布	2回以内
ファルコンフロアブル	IGR	トキシフェニジト					○	○	収穫3日前まで	散布	2回以内
フェニックス顆粒水和剤	ジアミド系	フルベンジジアミド	○	○			○	○	収穫前日まで	散布	2回以内
フレオフロアブル	その他	ヒリダリル	○				○	○	収穫7日前まで	散布	2回以内
ブレバソソフロアブル5	ジアミド系	クワランテニリアロール	○	○			○	○	育苗期後半～定植当日	灌注	1回
ベネビオOD	ジアミド系	シアントラニリアロール	○	○			○	○	収穫3日前まで	散布	3回以内
ベリマークSC	ジアミド系	シアントラニリアロール		○					育苗期後半～定植当日	灌注	1回
ボリアムカシタム顆粒水和剤	その他 ジアミド系	エマクチン安息香酸塩 クワランテニリアロール	○						収穫7日前まで	散布	3回以内
マッチ乳剤	IGR	ルフェスロン	○				○	○	収穫7日前まで	散布	3回以内
マトリックフロアブル	IGR	クマフェニジト					○		収穫7日前まで	散布	3回以内
マブリック水和剤20	ヒレスロイト系	フルバトリネート	○				○	○	収穫14日前まで	散布	2回以内
ミクロデナボン水和剤85	カーバメート系	NAC	○	○					収穫14日前まで	散布	3回以内
モスビラン粒剤	ネオニコチノイド系	アセタミプリド	○						定植前日～定植当日	株元散布	1回

ラービソフロアブル	カーバメート系	チオン・カルブ [®]				○	収穫14日前まで	散布	2回以内
			○	○			収穫7日前まで	散布	2回以内
					○		収穫21日前まで	散布	2回以内
ラービソ水和剤75	カーバメート系	チオン・カルブ [®]	○				収穫7日前まで	散布	4回以内
				○			収穫7日前まで	散布	2回以内
ランネット45DF	カーバメート系	メソニル	○				収穫3日前まで	散布	3回以内
ランネット微粒剤F	カーバメート系	メソニル	○	○			収穫7日前まで	散布	3回以内
レルガン乳剤25	有機リン系	クロルピリホスメチル	○				収穫7日前まで	散布	4回以内
ロムガンフロアブル	IGR	テブフェノジド [®]	○				収穫前日まで	散布	2回以内

※登録内容の概要を示したので、実際の使用に当たっては農薬ラベルを十分に確認した上で、正しくご使用願いたい。