

ナモグリバエ防除薬剤一覧

薬剤	成分系	毒性	レタス	リーフレタス	非結球レタス	かぶ	だいこん	はくさい	使用時期（使用方法）	本剤 使用回数
アケルキンク [®] フロアブル	トルフェンピ [®] ラト [®] メタフルゾン水和剤	劇						○	収穫14日前まで（散布）	2回以内
アクトラ [®] 粒剤5	ネオニコチノイド [®] 系	普	○		○				播種前（床土混和），育苗期後半（株元散布）	1回
アフォームエケテ [®] 顆粒水和剤	その他 IGR	普	○						収穫3日前まで	3回以内
アフォーム [®] 乳剤	その他	普	○		○				収穫3日前まで（散布）	3回以内
アルバ [®] リン粒剤	ネオニコチノイド [®] 系	普	○		○				定植時（植穴土壌混和），播種前（培土混和），育苗期後半（株元散布）	1回
アルバ [®] リン顆粒水溶剤	ネオニコチノイド [®] 系	普	○		○				定植前日～定植時（育苗トレイ等へ灌注）	1回
オシコルマイクロカブ [®] セル	カーバ [®] メート系	劇	○		○				定植時（育苗トレイ等へ灌注）	1回
オシコル [®] 粒剤5	カーバ [®] メート系	普	○						定植当日（株元散布）	1回
カーテンホスピタル [®] 粒剤	カーバ [®] メート系	普	○						定植当日（株元散布）	1回
カートナー [®] フロアブル	ネオニコチノイド [®] 系 その他	劇	○						定植当日（育苗トレイ等へ灌注）	1回
キックオフ [®] 顆粒水和剤	ジ [®] アミド [®] 系 ネオニコチノイド [®] 系	普	○		○				定植前日～定植時（育苗トレイ等へ灌注）	1回
コテツフロアブル [®]	その他	劇	○		○	○			収穫前日まで（散布）	2回以内
ジュリボ [®] フロアブル	ジ [®] アミド [®] 系 ネオニコチノイド [®] 系	普	○		○				育苗期後半～定植当日（育苗トレイ等へ灌注）	1回
スタークル [®] 粒剤	ネオニコチノイド [®] 系	普	○		○				定植時（植穴土壌混和），播種前（培土混和），育苗期後半（株元散布）	1回
スタークル [®] 顆粒水溶剤	ネオニコチノイド [®] 系	普	○		○				定植前日～定植時（育苗トレイ等へ灌注）	1回
タソツク [®] 水溶剤	ネオニコチノイド [®] 系	普	○		○				収穫3日前まで（散布）	2回以内
バタソ [®] SG水溶剤	ネオニコチノイド [®] 系	劇	○		○				収穫14日前まで（非結球レタス散布）	3回以内
ハチハチフロアブル [®]	その他	劇	○		○				収穫3日前まで（レタス散布），収穫14日前まで（非結球レタス散布）	2回以内
ハチハチ [®] 乳剤	その他	劇	○		○	○	○		収穫3日前まで（レタス散布），収穫7日前まで（リーフレタス散布）， 収穫14日前まで（非結球レタス・かぶ散布）	2回以内
ブリロツ [®] 粒剤	ジ [®] アミド [®] 系	普	○						育苗期後半～定植当日（株元散布）	1回
ブレオフロアブル [®]	その他	普	○	○					収穫7日前まで（散布）	2回以内
ブレバ [®] ソソフロアブル5	ジ [®] アミド [®] 系	普	○		○				育苗期後半～定植当日（育苗トレイ等へ灌注）	1回
ブレバ [®] ソソ [®] 粒剤	ジ [®] アミド [®] 系	普	○						収穫前日まで（散布）	3回以内
ブレバ [®] ソソ [®] 顆粒水和剤	ジ [®] アミド [®] 系	普	○						育苗期後半～定植時（株元散布）， 育苗期後半～定植当日（育苗トレイ等へ散布）	1回
バスター [®] 粒剤	ネオニコチノイド [®] 系	普	○						播種時（育苗培土混和），育苗期後半（株元処理）	1回
ベニカ [®] 水溶剤	ネオニコチノイド [®] 系	普	○		○				収穫3日前まで（散布）	2回以内
ベネ [®] アOD	ジ [®] アミド [®] 系	普	○						収穫前日まで（散布）	3回以内
ベリマ [®] クSC	ジ [®] アミド [®] 系	普	○		○				育苗期後半～定植当日（育苗トレイ等へ灌注）	1回
ボリア [®] カ [®] ソ [®] タ [®] M顆粒水和剤	その他 ジ [®] アミド [®] 系	普	○		○				収穫3日前まで（散布）	3回以内
マラソ [®] 乳剤	有機 [®] リン系	普				○	○		収穫14日前まで（散布）	4回以内
モスビ [®] ラン水溶剤	ネオニコチノイド [®] 系	劇	○						収穫7日前まで（散布）	3回以内
モスビ [®] ラン [®] 粒剤	ネオニコチノイド [®] 系	普	○		○				定植前日～定植当日（株元散布）	1回
モスビ [®] ラン [®] 顆粒水溶剤	ネオニコチノイド [®] 系	劇	○		○				収穫7日前まで（散布）	3回以内
リーフガード [®] 顆粒水和剤	ネオニコチノイド [®] 系	劇	○		○				収穫7日前まで（レタス散布），収穫14日前まで（非結球レタス散布）	2回以内

※登録内容の概要を示したもので、実際の使用に当たっては農薬ラベルを十分に確認した上で、正しくご使用願いたい。