

# 主なコナガ防除剤一覧

薬剤	成分系	毒性	かぶ	キャベツ	だいこん	はくさい	ブロッコリー	あぶらな科野菜	非結球あぶらな科野菜	使用時期(使用方法)	本剤 使用回数
アクセルキングフロアブル	トルフェンピラト・メタフルミゾン水和剤	劇		○	○					収穫14日前まで(散布)	2回以内
アクセルフロアブル	メタフルミゾン	普		○	○	○				収穫前日まで(散布)	3回以内
アクタラ粒剤5	ネオニコチノイド系	普		○	○	○				育苗期後半(株元散布)	1回
				○	○				播種前(培土混和)	1回	
アクテリック乳剤	有機リン系	普		○						収穫7日前まで(散布)	4回以内
アグロスリン水和剤	ピレスロイド系	劇		○	○					収穫7日前まで(散布)	5回以内
						○			収穫前日まで(散布)	5回以内	
アタフロン乳剤	IGR	普		○	○					収穫7日前まで(散布)	4回以内
					○				収穫14日前まで(散布)	3回以内	
							○			収穫21日前まで(散布)	2回以内
アディオン乳剤	ピレスロイド系	普		○		○				収穫3日前まで(散布)	5回以内
						○			収穫7日前まで(散布)	5回以内	
					○				収穫30日前まで(散布)	4回以内	
アニキ乳剤	レピメクチン	普		○	○	○	○		収穫3日前まで(散布)	3回以内	
アフームエクセラ顆粒水和剤	エマメクチン安息香酸塩 IGR	普		○	○	○			収穫7日前まで(散布)	3回以内	
アフームエクセラ顆粒水和剤	エマメクチン安息香酸塩 IGR	普			○				収穫14日前まで(散布)	3回以内	
アフーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩乳剤	普	○				○			収穫3日前まで	2回以内
		普		○						収穫前日まで	3回以内
		普			○	○		○		収穫7日前まで	3回以内
アベイル粒剤	ネオニコチノイド系 ジアミド系	普		○						育苗期後半～定植当日(株元散布)	1回
アルハリン粒剤	ネオニコチノイド系	普		○	○	○				定植時(植穴土壌混和)	1回
アルハリン顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	普		○		○				定植前日～定植時(育苗トレイ等へ灌注)	1回
エチモン粒剤6	有機リン系 有機リン系	劇			○					播種時(土壌混和)	1回
エビセク水和剤	ネライストキン	劇		○	○					収穫7日前まで(散布)	3回以内
		劇			○					収穫14日前まで(散布)	2回以内
エルサン水和剤40	有機リン系	劇		○						収穫14日前まで(散布)	2回以内
						○			収穫21日前まで(散布)	3回以内	
			○	○	○			収穫30日前まで(散布)	2回以内		
エルサン乳剤	有機リン系	劇		○						収穫14日前まで(散布)	2回以内
						○			収穫21日前まで(散布)	3回以内	
			○	○	○			収穫30日前まで(散布)	2回以内		
エルサン粉剤2	有機リン系	普		○						収穫14日前まで(散布)	2回以内
						○			収穫21日前まで(散布)	3回以内	
			○	○	○			収穫30日前まで(散布)	2回以内		

薬剤	成分系	毒性	かぶ	キャベツ	だいこん	はくさい	ブロッコリー	あぶらな科野菜	非結球あぶらな科野菜	使用時期(使用方法)	本剤 使用回数	
オルTRAN水和剤	有機リン系	普	○							収穫21日前まで(散布)	1回	
				○							収穫7日前まで(散布)	3回以内
					○	○						収穫14日前まで(散布)
オルTRAN粒剤	有機リン系	普		○	○					定植時(土壌混和)及び収穫21日前まで(株元散布)	3回以内	
オルTRAN粒剤	有機リン系	普		○						播種前(作条散布)	1回	
オンコルマイクロカプセル	カーバメート系	劇		○	○	○				定植時(育苗トレイ等へ灌注)	1回	
オンコル粒剤1	カーバメート系	普		○	○					定植時(植穴土壌混和)	1回	
オンコル粒剤5	カーバメート系	普		○	○					播種時(全面土壌混和), 定植時(植穴土壌混和又は株元散布), 育苗期後半(株元散布)	1回	
オンダイアエース粒剤	有機リン系 カーバメート系	普		○	○	○				定植時(植穴土壌混和又は株元散布), 育苗期後半(株元散布ただし収穫30日前まで)	1回	
ガーテンホスピタル粒剤	カーバメート系	普		○	○					育苗期後半(株元散布), 定植時(植穴土壌混和又は株元散布)	1回	
ガードナーフロアブル	ネオニコチノイド系 スピノサド	劇		○	○	○				定植当日(育苗トレイ等へ灌注)	1回	
カウンターフロアブル	IGR	普			○					収穫7日前まで(散布)	3回以内	
カウンター乳剤	IGR	普		○						収穫7日前まで(散布)	3回以内	
カスケード乳剤	IGR	普		○	○					収穫7日前まで(散布)	2回以内	
					○					収穫14日前まで(散布)	3回以内	
カセット粒剤	カーバメート系	劇		○						生育初期 但し収穫45日前まで(株元散布)	2回以内	
				○	○	○				定植時(株元散布又は土壌混和), 育苗期後半(株元散布)	2回以内	
					○						播種覆土後(作条土壌散布)	1回
ガリソンエース粉剤DL	イントキサカルブ	普		○	○					収穫7日前まで(散布)	2回以内	
					○						収穫21日前まで(散布)	2回以内
カルホス乳剤	有機リン系	劇		○						収穫21日前まで(散布)	1回	
ガンパ水和剤	IGR	劇		○						収穫21日前まで(散布)	2回以内	
キックオフ顆粒水和剤	ジアミド系 ネオニコチノイド系	普		○	○	○				定植前日~定植時(育苗トレイ等へ灌注)	1回	
グラントオンコル粒剤	カーバメート系	劇		○						定植時	1回	
コテツフロアブル	クロルフェナピル	劇	○	○		○	○			収穫前日まで(散布)	2回以内	
					○						収穫14日前まで(散布)	2回以内
									○		収穫3日前まで(散布)	1回
サイアノックス乳剤	有機リン系	普		○						収穫21日前まで(散布)	2回以内	
					○	○					収穫14日前まで(散布)	2回以内
サイアノックス粉剤	有機リン系	普	○	○						収穫21日前まで(散布)	2回以内	
					○	○					収穫14日前まで	2回以内
サイハロン水和剤	ピレスロイド系	劇		○						収穫7日前まで	3回以内	
					○						収穫21日前まで	3回以内
						○					収穫14日前まで	3回以内

薬剤	成分系	毒性	かぶ	キャベツ	だいこん	はくさい	ブロッコリー	あぶらな科野菜	非結球あぶらな科野菜	使用時期(使用方法)	本剤 使用回数	
サイハロン乳剤	ピレスロイド系	劇		○						収穫7日前まで	3回以内	
					○						収穫21日前まで	3回以内
						○						収穫14日前まで
サブリナフロアブル	B.T	普				○				発生初期収穫前日まで	-	
ジェイエース水溶剤	有機リン系	普	○							収穫21日前まで	1回	
				○							収穫7日前まで	3回以内
					○	○						収穫14日前まで
ジェイエース粒剤	有機リン系	普		○	○					定植時(植穴散布)及び生育期(株元散布) 但し、収穫21日前まで	3回以内	
					○						播種前(作条散布)	1回
ジュリホフロアブル	ジアミド系 ネオニコチノイド系	普		○						播種時(土壌灌注)	1回	
				○	○	○					育苗期後半～定植当日(育苗トレイ等へ灌注)	1回
スカウトフロアブル	ピレスロイド系	劇		○	○					収穫前日まで(散布)	5回以内	
スカウト乳剤	ピレスロイド系	劇		○	○					収穫前日まで(散布)	5回以内	
スターガード粒剤	ネオニコチノイド系	普		○	○	○				定植時(植穴土壌混和)	1回	
スタークル粒剤	ネオニコチノイド系	普		○	○	○				定植時(植穴土壌混和)	1回	
スタークル顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	普		○		○				定植前日～定植時(育苗トレイ等へ灌注)	1回	
スピノエース顆粒水和剤	スピノサト	普		○	○	○				収穫3日前まで(散布)	3回以内	
					○						収穫7日前まで	3回以内
									○		収穫14日前まで	2回以内
スミフェート水溶剤	有機リン系	普	○							収穫21日前まで	1回	
				○							収穫7日前まで	3回以内
					○	○						収穫14日前まで
スミフェート粒剤	有機リン系	普		○	○					定植時(植穴散布)及び生育期(株元散布) 但し、収穫21日前まで	3回以内	
					○						播種前(作条散布)	1回
セルオーフロアブル	ネオニコチノイド系 ジアミド系	普		○	○	○				定植3日前～定植時(育苗トレイ等へ灌注)	1回	
ゼンターリ顆粒水和剤	B.T	普				○				発生初期(散布)但し、収穫前日まで	-	
ダイアジノン水和剤34	有機リン系	劇		○		○				収穫30日前まで(散布)	2回以内	
ダイアジノン乳剤40	有機リン系	劇		○		○				収穫30日前まで(散布)	2回以内	
ダントツ水溶剤	ネオニコチノイド系	普		○		○				収穫3日前まで(散布)	2回以内	
ダントツ粒剤	ネオニコチノイド系	普		○		○				定植時(植穴土壌混和), 育苗期後半(株元散布)	1回	
チュールサイト水和剤	B.T	普						○		発生初期ただし、収穫7日前まで(散布)	-	
ディアナSC	スピネラム	普		○	○	○	○			収穫前日まで(散布)	2回以内	
テルスター水和剤	ピレスロイド系	普		○		○				収穫21日前まで(散布)	4回以内	
トクチオン乳剤	有機リン系	普		○						収穫21日前まで(散布)	2回以内	

薬剤	成分系	毒性	かぶ	キャベツ	だいこん	はくさい	ブロッコリー	あぶらな科野菜	非結球あぶらな科野菜	使用時期(使用方法)	本剤 使用回数	
トルネード <sup>®</sup> エースDF	インドキサカルブ <sup>®</sup>	普		○		○				収穫7日前まで(散布)	2回以内	
					○					収穫21日前まで(散布)	2回以内	
								○			収穫14日前まで(散布)	2回以内
トルネード <sup>®</sup> フロアブル	インドキサカルブ <sup>®</sup>	普		○		○				収穫7日前まで(散布)	2回以内	
					○					収穫21日前まで(散布)	2回以内	
								○			収穫14日前まで(散布)	2回以内
トレホン <sup>®</sup> 乳剤	ピレスロイド <sup>®</sup> 系	普		○						収穫3日前まで(散布)	3回以内	
					○					収穫21日前まで(散布)	3回以内	
						○					収穫7日前まで(散布)	3回以内
ノームルト <sup>®</sup> 乳剤	IGR	普		○		○	○			収穫7日前まで(散布)	2回以内	
				○						収穫7日前まで(無人ヘリ散布)	2回以内	
					○						収穫21日前まで(散布)	2回以内
					○						収穫21日前まで(無人ヘリ散布)	2回以内
ハイスロイド <sup>®</sup> 乳剤	ピレスロイド <sup>®</sup> 系	劇		○		○				収穫7日前まで(散布)	4回以内	
					○					収穫3日前まで(散布)	4回以内	
ハイベニカ	ピレスロイド <sup>®</sup> 系	普		○					収穫7日前まで(散布)	5回以内		
ハイベニカ乳剤	ピレスロイド <sup>®</sup> 系	普		○					収穫7日前まで(散布)	5回以内		
ハクサップ <sup>®</sup> 水和剤	ピレスロイド <sup>®</sup> 系 有機リン系	劇		○		○				収穫前日まで(散布)	5回以内	
					○					収穫35日前まで(散布)	3回以内	
ハクサップ <sup>®</sup> 乳剤	ピレスロイド <sup>®</sup> 系 有機リン系	劇		○		○			収穫前日まで(散布)	5回以内		
ハ <sup>®</sup> ダンSG水溶剤	ネライストキン	劇		○						収穫14日前まで(散布)	4回以内	
					○	○	○			収穫7日前まで(散布)	3回以内	
ハ <sup>®</sup> ダントレホン <sup>®</sup> 粉剤DL	ピレスロイド <sup>®</sup> 系 ネライストキン	普		○					収穫14日前まで(散布)	3回以内		
ハ <sup>®</sup> ダン水溶剤	ネライストキン	劇		○						収穫14日前まで(散布)	4回以内	
						○	○			収穫7日前まで(散布)	3回以内	
ハ <sup>®</sup> ダン粉剤	ネライストキン	普		○					収穫14日前まで(散布)	4回以内		
ハチハチ <sup>®</sup> フロアブル	トルフェンピラト <sup>®</sup>	劇		○		○			収穫14日前まで(散布)	2回以内		
ハチハチ <sup>®</sup> 乳剤	トルフェンピラト <sup>®</sup>	劇	○							収穫7日前まで(散布)	2回以内	
				○	○	○				収穫14日前まで(散布)	2回以内	
							○			収穫3日前まで	2回以内	
ファルコン <sup>®</sup> エースフロアブル	スピノサト <sup>®</sup> IGR	普		○	○					収穫7日前まで	2回以内	
						○	○			収穫3日前まで	2回以内	
ファルコン <sup>®</sup> フロアブル	IGR	普		○					収穫7日前まで	2回以内		
フェニックス <sup>®</sup> 顆粒水和剤	ジアミト <sup>®</sup> 系	普	○	○		○	○			収穫前日まで	2回以内	
					○					収穫7日前まで	2回以内	
プリロッソ <sup>®</sup> 粒剤	ジアミト <sup>®</sup> 系	普		○	○	○	○		育苗期後半～定植当日(株元散布)	1回		

薬剤	成分系	毒性	かぶ	キャベツ	だいこん	はくさい	ブロッコリー	あぶらな科野菜	非結球あぶらな科野菜	使用時期(使用方法)	本剤 使用回数	
プリンスフロアブル	フィプロニル	劇		○						定植前まで(育苗トレイ等へ灌注), 収穫14日前まで(散布)	1回	
						○					定植前まで(育苗トレイ等へ灌注), 収穫21日前まで(散布)	2回以内
								○				収穫30日前まで(散布)
プリンス粒剤	フィプロニル	普		○						播種時～定植前(育苗トレイ等へ散布)	1回	
プレオフロアブル	ピリダリル	普		○		○	○		○	収穫7日前まで(散布)	2回以内	
プレオフロアブル	ピリダリル	普			○					収穫14日前まで(散布)	2回以内	
プレバソフロアブル5	ジアミド系	普	○	○	○	○	○			収穫前日まで(散布)	3回以内	
プレバソフロアブル5	ジアミド系	普		○		○	○			育苗期後半～定植当日(育苗トレイ等へ灌注)	1回	
プレバソ粒剤	ジアミド系	普		○		○	○			育苗期後半～定植当日(育苗トレイ等へ灌注), 育苗期後半～定植時(株元散布)	1回	
ペイオフME液剤	ピレスロイド系	劇		○						収穫7日前まで(散布)	4回以内	
ベジホン乳剤	有機リン系 ピレスロイド系	劇		○						収穫7日前まで(散布)	3回以内	
ベジホン乳剤	有機リン系 ピレスロイド系	劇			○					収穫35日前まで(散布)	3回以内	
ベジホン乳剤	有機リン系 ピレスロイド系	劇				○				収穫14日前まで(散布)	3回以内	
ベニカS乳剤	ピレスロイド系	普		○			○			収穫3日前まで(散布)	5回以内	
ベニカS乳剤	ピレスロイド系	普			○					収穫30日前まで(散布)	4回以内	
ベニカS乳剤	ピレスロイド系	普				○				収穫7日前まで(散布)	5回以内	
ベニカ液剤	ネオニコチノイド系	普		○						収穫3日前まで(散布)	2回以内	
ベニカ水溶剤	ネオニコチノイド系	普		○			○			収穫3日前まで(散布)	2回以内	
ベニカ粒剤	ネオニコチノイド系	普		○			○			定植時(植穴土壌混和), 育苗期後半(株元散布)	1回	
ベネビアOD	ジアミド系	普		○		○	○			収穫前日まで(散布)	3回以内	
ベリマークSC	ジアミド系	普		○		○	○			育苗期後半～定植当日(株元散布)	1回	
ホームガーデン粒剤	カーバメート系	普		○		○				定植時(植穴土壌混和)	1回	
ホリアムガンダム顆粒水和剤	エマクチン安息香酸 ジアミド系	普		○		○	○			収穫7日前まで(散布)	3回以内	
マイトクリーン	ピリミジフェン	普		○		○				収穫7日前まで(散布)	4回以内	
マッチ乳剤	IGR	普		○		○				収穫7日前まで(散布)	3回以内	
					○					収穫14日前まで(散布)	3回以内	
マブリック水和剤20	ピレスロイド系	劇		○	○					収穫14日前まで(散布)	3回以内	
						○				収穫21日前まで(散布)	2回以内	
モスピランSL液剤	ネオニコチノイド系	劇		○						収穫7日前まで(散布)	5回以内	
					○	○	○			収穫14日前まで(散布)	1回	
モスピラン水溶剤	ネオニコチノイド系	劇		○						収穫7日前まで(散布)	5回以内	
					○	○	○			収穫14日前まで(散布)	1回	
モスピラン粒剤	ネオニコチノイド系	普		○		○	○			定植前日～定植当日(株元散布), 定植時(植穴土壌混和)	1回	
					○			○		播種時(播種溝土壌混和)	1回	
						○	○				定植時(植穴土壌混和)	1回

薬剤	成分系	毒性	かぶ	キャベツ	だいこん	はくさい	ブロッコリー	あぶらな科野菜	非結球あぶらな科野菜	使用時期(使用方法)	本剤 使用回数	
モスピラン顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	劇		○						収穫7日前まで(散布)	5回以内	
					○	○	○				収穫14日前まで(散布)	1回
ランネート45DF	カーバメート系	劇		○						収穫3日前まで(散布)	3回以内	
					○						収穫14日前まで(散布)	2回以内
						○					収穫前日まで(散布)	2回以内
ランネート微粒剤F	カーバメート系	劇		○						収穫7日前まで(散布)	3回以内	
					○						収穫14日前まで(散布)	2回以内
リーフガード顆粒水和剤	ネライストキン	劇		○		○	○			収穫7日前まで(散布)	3回以内	
					○						収穫14日前まで(散布)	2回以内
ルーバン水和剤	ネライストキン	普		○		○				収穫7日前まで(散布)	3回以内	
					○						収穫14日前まで(散布)	3回以内
レルタン乳剤25	有機リン系	普		○						収穫7日前まで(散布)	4回以内	

※登録内容の概要を示したので、実際の使用に当たっては農薬ラベルを十分に確認した上で、正しくご使用願いたい。