

主なオオタバコガ防除薬剤一覧

薬剤	成分系	成分	キャベツ	はくさい	レタス	ブロッコリー	使用時期	使用方法	本剤使用回数
アクセルキングフロアブル	その他	トルフェンピラト	○				収穫14日前まで	散布	2回以内
アクセルフロアブル	その他	メタフルミゾン	○				収穫前日まで	散布	3回以内
アニキ乳剤	その他	レピメクチン	○	○	○		収穫3日前まで	散布	3回以内
アフームエクスラ顆粒水和剤	その他 IGR	エマメクチン安息香酸塩 ルフェスロン		○	○		収穫7日前まで	散布	3回以内
アフーム乳剤	その他	エマメクチン安息香酸塩			○	○	収穫3日前まで	散布	3回以内
オルラン水和剤	有機リン系	アセフェート			○		収穫14日前まで	散布	3回以内
ガードナーフロアブル	ネオニコチノイド系 その他	イミダクロプリト スピノサト			○		定植当日	灌注	1回
カスケード乳剤	IGR	フルフェノクスロン			○		収穫3日前まで	散布	3回以内
キックオフ顆粒水和剤	ジアミド系 ネオニコチノイド系	クロラントリニプロール ジノテフラン			○		定植前日～定植時	灌注	1回
コテツフロアブル	その他	クロルフェナピル	○		○		収穫前日まで	散布	2回以内
ジェイエース水溶剤	有機リン系	アセフェート			○		収穫14日前まで	散布	3回以内
ジュリホフロアブル	ジアミド系 ネオニコチノイド系	クロラントリニプロール チアメキサム			○		育苗期後半～定植当日	灌注	1回
スピノエース顆粒水和剤	その他	スピノサト			○		収穫3日前まで	散布	3回以内
スミフェート水溶剤	有機リン系	アセフェート			○		収穫14日前まで	散布	3回以内
セルーフフロアブル	ネオニコチノイド系 ジアミド系	イミダクロプリト フルベンジアミド			○		定植3日前～定植時	灌注	1回
ディアナSC	その他	スピノラム	○		○		収穫前日まで	散布	2回以内
トルネットエースDF	その他	インドキサカルブ			○		収穫7日前まで	散布	2回以内
トルネットフロアブル	その他	インドキサカルブMP			○		収穫7日前まで	散布	2回以内
ハクサップ水和剤	ヒスロイド系 有機リン系	フェンバレート マラソン			○		収穫3日前まで	散布	2回以内
ハクサップ水和剤	ヒスロイド系 有機リン系	フェンバレート マラソン	○	○			収穫前日まで	散布	5回以内
ファルコンエースフロアブル	その他 IGR	スピノサト トキシフェンジト			○		収穫3日前まで	散布	2回以内
ファルコンフロアブル	IGR	トキシフェンジト	○		○		収穫3日前まで	散布	2回以内
フェニックス顆粒水和剤	ジアミド系	フルベンジアミド	○	○	○		収穫前日まで	散布	2回以内
ブリロッソ粒剤	ジアミド系	シアントリニプロール			○		育苗期後半～定植時	株元散布	1回
ブリンスフロアブル	その他	フィプロニル	○	○			収穫14日前まで	散布	2回以内
ブリンスフロアブル	その他	フィプロニル	○	○			収穫21日前まで	散布	2回以内
ブレオフロアブル	その他	ピリタリル	○	○	○		収穫7日前まで	散布	2回以内
フレバソフロアブル5	ジアミド系	クロラントリニプロール	○		○		収穫前日まで	散布	3回以内
フレバソ粒剤	ジアミド系	クロラントリニプロール			○		育苗期後半～定植時	株元散布	1回
ベネビアOD	ジアミド系	シアントリニプロール	○		○		収穫前日まで	散布	3回以内
ベリマークSC	ジアミド系	シアントリニプロール			○		育苗期後半～定植時	灌注	1回
ボタニガードES	天敵微生物	ボヘリアバシアーナ			○		発生初期	散布	-
ボリアムガンダム顆粒水和剤	その他 ジアミド系	エマメクチン安息香酸塩 クロラントリニプロール			○		収穫3日前まで	散布	3回以内
マッチ乳剤	IGR	ルフェスロン			○		収穫3日前まで	散布	3回以内
マトリックフロアブル	IGR	クロマフェノジト			○		収穫7日前まで	散布	3回以内
モスピラン粒剤	ネオニコチノイド系	アセタミプリト			○		定植前日～定植当日	株元散布	1回
ラービフロアブル	カーハメート系	チオジカルブ			○		収穫14日前まで	散布	2回以内
ランネット45DF	カーハメート系	メソミル			○		収穫7日前まで	散布	2回以内

※登録内容の概要を示したので、実際の使用に当たっては農薬ラベルを十分に確認した上で、正しくご使用願いたい。