

主なハスモンヨトウ防除薬剤一覧

薬剤	成分系	成分	キャベツ	はくさい	だいこん	レタス	ブロッコリー	使用時期	使用方法	本剤使用回数
アクセルキングフロアブル	その他	トルフェンピラト	○					収穫14日前まで	散布	2回以内
アクセルフロアブル	その他	メタフルミゾン	○	○				収穫前日まで	散布	3回以内
アクセルハイ	その他	メタフルミゾン	○	○				収穫7日前まで	株元散布	3回以内
アグロリン水和剤	ピレスロイド系	シハルトリン		○				収穫前日まで	散布	5回以内
アタロン乳剤	IGR	クロルフルアズロン	○	○	○	○		収穫14日前まで	散布	3回以内
アネキ乳剤	その他	レビメクチン	○	○	○	○		収穫3日前まで	散布	3回以内
アファームエクセラ顆粒水和剤	その他	エマメクチン安息香酸塩	○	○			○	収穫7日前まで	散布	3回以内
アファーム乳剤	その他	エマメクチン安息香酸塩	○				○	収穫3日前まで	散布	3回以内
アベイル	ネオニコチノイド系	イミダクロプリト	○					育苗期後半～定植当日	株元散布	1回
アルハリン顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	クロラントラニリプロール					○	定植前日～定植時	灌注	1回
エルサン乳剤	有機リン系	PAP	○	○	○	○		収穫21日前まで	散布	2回以内
オルトラン水和剤	有機リン系	アセフェート	○					収穫7日前まで	散布	3回以内
ガードナーフロアブル	ネオニコチノイド系	イミダクロプリト	○					収穫14日前まで	散布	3回以内
カウンター乳剤	IGR	スピノサト	○					定植当日	灌注	1回
カスケード乳剤	IGR	フルフェノクスロン	○				○	収穫7日前まで	散布	3回以内
ガンバ水和剤	その他	ジアフェンチウロン	○					収穫7日前まで	散布	2回以内
キックオフ顆粒水和剤	ネオニコチノイド系	クロラントラニリプロール	○				○	収穫14日前まで	散布	2回以内
コテツフロアブル	その他	シノテフラン	○				○	収穫3日前まで	散布	3回以内
コテツフロアブル	その他	クロルフェニピル	○				○	収穫7日前まで	散布	2回以内
ジェイエース水溶剤	有機リン系	アセフェート	○	○				収穫前日まで	散布	2回以内
ジャックホット顆粒水和剤	B.T	バチルス チューリンゲンシス菌の生芽	○					発生初期 但し、収穫前日まで	散布	3回以内
ジュリホフロアブル	ネオニコチノイド系	クロラントラニリプロール	○	○			○	発生初期 但し、収穫前日まで	散布	-
スタークル顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	チアトキサム	○				○	育苗期後半～定植当日	灌注	1回
スタークル顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	シノテフラン					○	定植前日～定植時	灌注	1回
スミフェート水溶剤	有機リン系	アセフェート	○	○				定植前日～定植時	灌注	1回
セルオーフロアブル	ネオニコチノイド系	フルベンジアミド	○	○			○	収穫14日前まで	散布	2回以内
チーフメイト乳剤	ピレスロイド系	フルトリネート	○					収穫7日前まで	散布	3回以内
チーフメイト乳剤	有機リン系	PAP	○					収穫14日前まで	散布	2回以内
チュレックス顆粒水和剤	B.T	バチルス チューリンゲンシス菌の生芽	○					発生初期 但し、収穫前日まで	散布	-
デアナSC	その他	スピネトラム	○				○	収穫前日まで	散布	2回以内
デナホン5%ハイ	カーバメート系	NAC	○					収穫14日前まで	株元散布	3回以内
ドクチョン乳剤	有機リン系	プロチオホス	○	○				収穫21日前まで	株元散布	3回以内
トルネードエースDF	その他	インドキサカルブ	○				○	収穫7日前まで	散布	2回以内
トルネードフロアブル	その他	インドキサカルブMP	○				○	収穫7日前まで	散布	2回以内
ノーマルト乳剤	IGR	テフルベンズロン	○				○	収穫7日前まで	散布	2回以内
ノーマルト乳剤	IGR	テフルベンズロン					○	収穫3日前まで	散布	2回以内
ハクサップ水和剤	ピレスロイド系	フェンバレート					○	収穫35日前まで	散布	3回以内
ハクサップ水和剤	有機リン系	マラソン	○	○				収穫前日まで	散布	5回以内
ハスモン天敵	微生物	ハスモンヨトウ核多角体病ウイルス	○					発生初期	散布	-
ファルコンエースフロアブル	その他	スピノサト	○					収穫7日前まで	散布	2回以内
ファルコンエースフロアブル	IGR	ホスピノジド					○	収穫3日前まで	散布	2回以内
ファルコンフロアブル	IGR	ホスピノジド	○				○	収穫3日前まで	散布	2回以内
ファルコンフロアブル	IGR	ホスピノジド					○	収穫7日前まで	散布	2回以内
フェニックス顆粒水和剤	ジアミド系	フルベンジアミド	○	○			○	収穫前日まで	散布	2回以内
フレオフロアブル	その他	ヒリダリル	○				○	収穫前日まで	散布	3回以内
フレオフロアブル	その他	ヒリダリル	○				○	収穫7日前まで	散布	2回以内
プレバソフロアブル5	ジアミド系	クロラントラニリプロール	○	○			○	育苗期後半～定植当日	灌注	1回
プレバソフロアブル5	ジアミド系	クロラントラニリプロール	○	○			○	収穫前日まで	散布	3回以内
プレバソフロアブル5	ジアミド系	クロラントラニリプロール					○	収穫3日前まで	散布	3回以内
ベネビアOD	ジアミド系	シアントラニリプロール	○	○			○	収穫前日まで	散布	3回以内
ベリマークSC	ジアミド系	シアントラニリプロール		○				育苗期後半～定植当日	灌注	1回
ホリアムガンダム顆粒水和剤	その他	エマメクチン安息香酸塩	○					収穫7日前まで	散布	3回以内
マツチ乳剤	IGR	ルフェスロン	○				○	収穫7日前まで	散布	3回以内
マツチ乳剤	IGR	ルフェスロン					○	収穫7日前まで	散布	3回以内

登録内容	登録内容	登録内容	登録内容	登録内容	登録内容	登録内容	登録内容	登録内容	登録内容	
マブリック水和剤20	ヒレスロイド系	フルバリネット	○					収穫7日前まで	散布	4回以内
マイクロナホン水和剤85	カーバメート系	NAC	○	○				収穫14日前まで	散布	2回以内
モスピラン粒剤	ネオニコチノイド系	アセタミプリト	○					収穫14日前まで	散布	2回以内
ラービンフロアブル	カーバメート系	チオンカルブ	○	○			○	定植前日～定植当日	株元散布	1回
ラービン水和剤75	カーバメート系	チオンカルブ	○					収穫7日前まで	散布	2回以内
ランネット45DF	カーバメート系	メソミル	○					収穫7日前まで	散布	2回以内
ランネット微粒剤F	カーバメート系	メソミル	○	○				収穫7日前まで	散布	2回以内
レルタン乳剤25	有機リン系	クロルピリホスメチル	○					収穫7日前まで	散布	4回以内
ロムタンフロアブル	IGR	テブフェンジド	○					収穫前日まで	散布	2回以内

※登録内容の概要を示したので、実際の使用に当たっては農業ラベルを十分に確認した上で、正しくご使用願いたい。