

## 主なナモグリバエ防除薬剤一覧

薬剤	成分系	毒性	レタス	リーフレタス	非結球レタス	かぶ	だいこん	はくさい	使用時期（使用方法）	本剤使用回数
アクセルキングフロアブル	トルフェンピラド メタフルミゾン水和剤	劇						○	収穫14日前まで（散布）	2回以内
アクタラ粒剤 5	ネオニコチノイド系	普	○		○				播種前（床土混和）， 育苗期後半（株元散布）	1回
アフームエクセラ顆粒水和剤	その他 IGR	普	○						収穫3日前まで	3回以内
アフーム乳剤	その他	普	○		○				収穫3日前まで（散布）	3回以内
アルバリン粒剤	ネオニコチノイド系	普	○		○				定植時（植穴土壌混和）， 播種前（培土混和）， 育苗期後半（株元散布）	1回
アルバリン顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	普	○		○				定植前日～定植時（育苗トレイ等へ灌注）	1回
オンコルマイクロカプセル	カーバメート系	劇	○		○				定植時（育苗トレイ等へ灌注）	1回
オンコル粒剤 5	カーバメート系	普	○						定植当日（株元散布）	1回
ガーデンホスピタル粒剤	カーバメート系	普	○						定植当日（株元散布）	1回
ガードナーフロアブル	ネオニコチノイド系 その他	劇	○						定植当日（育苗トレイ等へ灌注）	1回
キックオフ顆粒水和剤	ジアミド系 ネオニコチノイド系	普	○		○				定植前日～定植時（育苗トレイ等へ灌注）	1回
コテツフロアブル	その他	劇	○		○	○			収穫前日まで（散布）	2回以内
ジュリポフロアブル	ジアミド系 ネオニコチノイド系	普	○		○				育苗期後半～定植当日（育苗トレイ等へ灌注）	1回
スタークル粒剤	ネオニコチノイド系	普	○		○				定植時（植穴土壌混和）， 播種前（培土混和）， 育苗期後半（株元散布）	1回
スタークル顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	普	○		○				定植前日～定植時（育苗トレイ等へ灌注）	1回
ダントツ水溶剤	ネオニコチノイド系	普	○		○				収穫3日前まで（散布）	2回以内
パダンSG水溶剤	ネライストキシン	劇	○		○				収穫14日前まで（非結球レタス散布）	3回以内
ハチハチフロアブル	その他	劇	○		○				収穫3日前まで（レタス散布）， 収穫14日前まで（非結球レタス散布）	2回以内
ハチハチ乳剤	その他	劇	○		○	○	○		収穫3日前まで（レタス散布）， 収穫7日前まで（リーフレタス散布）， 収穫14日前まで（非結球レタス・かぶ散布）	2回以内
アリロソソ粒剤	ジアミド系	普	○						育苗期後半～定植当日（株元散布）	1回
プレオフロアブル	その他	普	○	○					収穫7日前まで（散布）	2回以内
プレバソソフロアブル 5	ジアミド系	普	○		○				育苗期後半～定植当日（育苗トレイ等へ灌注） 収穫前日まで（散布）	1回 3回以内
プレバソソ粒剤	ジアミド系	普	○						育苗期後半～定植時（株元散布）， 育苗期後半～定植当日（育苗トレイ等へ灌注）	1回
ベストガード粒剤	ネオニコチノイド系	普	○						播種時（育苗培土混和）， 育苗期後半（株元処理）	1回
ベニカ水溶剤	ネオニコチノイド系	普	○		○				収穫3日前まで（散布）	2回以内
ベネビアOD	ジアミド系	普	○						収穫前日まで（散布）	3回以内
バリマークSC	ジアミド系	普	○		○				育苗期後半～定植当日（育苗トレイ等へ灌注）	1回
ポリアムガンダム顆粒水和剤	その他 ジアミド系	普	○		○				収穫3日前まで（散布）	3回以内
マラソソ乳剤	有機リン系	普				○	○		収穫14日前まで（散布）	4回以内
モスピラン水溶剤	ネオニコチノイド系	劇	○						収穫7日前まで（散布）	3回以内
モスピラン粒剤	ネオニコチノイド系	普	○		○				定植前日～定植当日（株元散布）	1回
モスピラン顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	劇	○		○				収穫7日前まで（散布）	3回以内
リーフガード顆粒水和剤	ネライストキシン	劇	○		○				収穫7日前まで（レタス散布）， 収穫14日前まで（非結球レタス散布）	2回以内

※登録内容の概要を示したので、実際の使用に当たっては農薬ラベルを十分に確認した上で、正しくご使用願いたい。