

主な黒腐病防除薬剤一覧

| 薬剤 | 成分系 | 成分 | キャベツ | はくさい | ブロッコリー | 使用時期 | 使用方法 | 本剤使用回数 |
|-------------|------------------|--------------------------|------|------|--------|----------|----------------|--------|
| アグリマイシン-100 | 抗生物質 抗生物質 | オキシテトラサイクリン ストレプトマイシン | ○ | | | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 |
| アグレプト液剤 | 抗生物質 | ストレプトマイシン | ○ | | | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 |
| アグレプト水和剤 | 抗生物質 | ストレプトマイシン | ○ | | | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 |
| オキシンド-水和剤 8 | 有機銅 | 有機銅 | ○ | | | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 |
| オリゼメート粒剤 | 抵抗性誘導 | プロベナゾール | | | ○ | 定植時 | 全面土壌混和 | 1回 |
| | | | ○ | | | 定植時 | 作条土壌混和又は全面土壌混和 | 1回 |
| カスミンボルドー | 抗生物質 無機銅 | カスガマイシン 銅 | | | ○ | 収穫21日前まで | 散布 | 4回以内 |
| | | | ○ | | | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 |
| カセット水和剤 | オキシリニック酸 抗生物質 | オキシリニック酸 カスガマイシン | | | ○ | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 |
| | | | ○ | | | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 |
| カッパーシン水和剤 | 抗生物質 無機銅 | カスガマイシン 銅 | | | ○ | 収穫21日前まで | 散布 | 4回以内 |
| | | | ○ | | | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 |
| キノド-顆粒水和剤 | 有機銅 | 有機銅 | ○ | | | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 |
| キノド-フロアブル | 有機銅 | 有機銅 | ○ | | | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 |
| キノド-水和剤 40 | 有機銅 | 有機銅 | ○ | | ○ | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 |
| シトラ-フロアブル | 有機銅 有機塩素系 | 有機銅 T P N | ○ | | | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 |
| | | | | | | | | |
| テレオ水和剤 | オキシリニック酸 無機銅 | オキシリニック酸 銅 | ○ | | | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 |
| ドイツボルドー A | 無機銅 | 銅 | ○ | | | - | 散布 | - |
| ド-マイシン水和剤 | 抗生物質 有機銅 | ストレプトマイシン 有機銅 | ○ | | | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 |
| ドキリンフロアブル | 有機銅 | 有機銅 | ○ | | | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 |
| ナレート水和剤 | オキシリニック酸 有機銅 | オキシリニック酸 有機銅 | ○ | | | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 |
| バリダシン液剤 5 | 抗生物質 | バリダマイシン | ○ | | | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 |
| ベジキ-パー水和剤 | 微生物 | シュードモナス フルオレッセンス | ○ | ○ | ○ | 発病前～発病初期 | 散布 | - |
| ベニド-DF | 無機銅 | 銅 | ○ | | | - | 散布 | - |
| ベニド-水和剤 | 無機銅 | 銅 | ○ | | | - | 散布 | - |
| ベフド-水和剤 | 保護剤 (イミノクタジン) | イミノクタジン酢酸塩 銅 | ○ | | | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 |
| ボテガードDF | 無機銅 | 銅 | ○ | | | - | 散布 | - |
| ボルドー | 無機銅 | 銅 | ○ | | | - | 散布 | - |
| マイシン20水和剤 | 抗生物質 | ストレプトマイシン | ○ | | | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 |
| マイシン水和剤 | 抗生物質 | ストレプトマイシン | ○ | | | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 |
| ヨネボン水和剤 | 有機銅 | ノルフェノールスルホン酸銅 | ○ | | | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 |
| | 有機銅 | ノルフェノールスルホン酸銅 | | | ○ | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 |

※登録内容の概要を示したので、実際の使用に当たっては農薬ラベルを十分に確認した上で、正しくご使用願いたい。