

水稲 中・後期除草剤の主な有効成分と効果のある主要雑草一覧

有効成分名	分類	処理時期	効果のある主な雑草(◎高い効果、○効果あり、△多少効果あり)											残効性	作用性	主な商品名	
			ノビエ	カヤツリグサ	コナギ	その他広葉雑草	マツハイ	ホタルイ	ウリカワ	ミスガヤツリ	ヘラオモダカ	クログワイ	オモダカ				藻類
ピリミノバクメチル	ヒエ剤	ルイ4葉	◎												長	アミノ酸合成阻害	ヒエクリーン
シメトリン	広葉剤	ルイ2葉	◎	○	◎	◎	○	△	○	△	○			◎	中～長	光合成阻害	マメットSM、ザーベックスSM
ペンタゾン	広葉剤	広葉発生盛期	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			光合成阻害	クリンチャーバス、バサグラン
シハロホップブチル	ヒエ剤	ルイ4葉	◎												短	脂肪酸合成阻害	クリンチャー、クリンチャーバス、サンパンチ
ペンフレセート	カヤツリ剤	カヤツリ発生始期	○				◎	○	△	◎		○			極長	脂肪酸合成阻害	ザーベックスSM
メタミホップ	ヒエ剤	ルイ4葉	◎												短	脂肪酸合成阻害	トドメMF
MCPB	広葉剤	ルイ5葉	○	○	○	△	◎	○	○	○		○			長	植物ホルモン作用攪乱	マメットSM、ザーベックスSM
モリネット	ヒエ剤	ルイ3葉	◎	◎			◎	◎		◎					長	タンパク質合成阻害	マメットSM