

表1 BT剤と適用病害虫一覧

農薬名	成分	含量	毒性	適用害虫																										希釈倍数	使用時期 (食用作物)	使用回数										
				アオムシ	アゲハ類	アメリカシロヒトリ	アワノメイガ	イネヨトウムシ	イラガ類	ウリノメイガ	オオタバコガ	カキノヘタムシガ	キアゲハ	ケムシ類	コナガ	コブノメイガ	シバツトガ	シヤクトリムシ類	シロイチモジマダラメイガ	シロイチモジヨトウ	スジキリヨトウ	タバコアオムシ	タバコガ	タマナギンウワバ	タマナギヤガ	チャドクガ	チャノコカクモンハマキ	チャノホソガ	チャハマキ				トドモンオオエダシヤク	ネギコガ	ハイマダラノメイガ	ハマキムシ類	ハスモンヨトウ	ヒメシロモンドクガ	フタオビコヤガ	ベニフキノメイガ	ベニモンアオリンガ	マイマイガ
エコマスターBT	BT	10.00%	普通物	○		○				○									○										○	○	○								○	1000~2000倍	発生初期 但し、収穫前日まで	—
エスマルクDF	BT	10.00%	普通物	○		○				○		○	○			○										○	○	○										○	2000倍	発生初期但し、収穫前日まで	—	
クオークフロアブル	BT	10.00%	-	○		○				○	○																										○	400倍	発生初期 但し、収穫前日まで	—		
サブリーナフロアブル	BT	10.00%	-	○		○	○			○		○	○																						○	○	1000倍	発生初期、収穫前日まで	—			
ジャックポット顆粒水和剤	BT	10.00%	-	○						○		○																								○	1000倍	発生初期 但し、収穫前日まで	—			
ゼンターリ顆粒水和剤	BT	10.00%	普通物	○		○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1000倍	発生初期 但し、収穫前日まで	—		
チューリサイド水和剤	BT	10.00%	-	○	○					○		○																								○	○	1000~2000倍	発生初期 但し、収穫前日まで	—		
チューレックス顆粒水和剤	BT	10.00%	-	○						○																										○	1000倍	発生初期 但し、収穫前日まで	—			
チューンアップ顆粒水和剤	BT	10.00%	-	○	○					○	○		○	○	○																					○	2000~3000倍	発生初期但し、収穫前日まで	—			
デルフィン顆粒水和剤	BT	10.00%	普通物	○	○					○	○		○																							○	○	1000~2000倍	発生初期但し、収穫前日まで	—		
トアローフロアブルCT	BT	7.00%	普通物	○	○					○		○																								○	1000倍	発生初期 但し、収穫前日まで	—			
トアロー水和剤CT	BT	7.00%	普通物	○	○	○	○	○		○		○																								○	○	1000倍	発生初期 但し、収穫前日まで	—		
バイオマックスDF	BT	10.00%	-			○						○																									2000~4000倍	発生初期但し、収穫前日まで	—			
バシレックス水和剤	BT	10.00%	普通物	○	○					○		○																								○	○	1000倍	発生初期ただし、収穫前日まで	—		
ファイブスター顆粒水和剤	BT	10.00%	普通物	○								○																									2000倍	発生初期但し、収穫前日まで	—			
フローバックDF	BT	10.00%	-	○		○				○		○																								○	1000~2000倍	発生初期 但し、収穫前日まで	—			
レビクリーンDF	BT	10.00%	-																																		500~1000倍	発生初期但し、摘採前日まで	—			

※タバコ適用あるBT剤は、タバコに使用する場合のみ使用回数制限あり