

表2 天敵微生物農薬の適用内容一覧

農薬名	成分名	分類	含量	作物	希釈倍数	希釈倍数または使用量	散布量	使用時期	使用方法								
ゴッツA	ベキロマイセス テヌイベス	糸状菌	T1株の分生子5×1億個/ml	野菜類(施設栽培)	アブラムシ類	500倍	100～300L/10a	発生初期	散布								
					コナジラミ類	500～1000倍		発病前～発病初期									
					うどんこ病	500倍											
バイオリサ・カミキリ	ボーベリア ブロンニアティ	糸状菌	1×1千万cfu/cm ²	桑	キボシカミキリ	1樹当り1本	—	成虫発生初期	地際に近い主幹の分岐部等に架ける								
				かえで	ゴマダラカミキリ	1樹当り1本			樹上部の葉柄基部又は茎等に架ける								
				うど	センノカミキリ	2樹当り1本			主幹又は主幹の分枝部分に巻き付ける								
				さくら	クビアカツヤカミキリ	1樹当り1本											
				食用さくら(葉)	クビアカツヤカミキリ	1樹当り1本											
				しいたけ	ハラアコブカミキリ	ほだ木10本当り1本		成虫発生初期	ほだ木上に架ける								
				果樹類	カミキリムシ類	1樹当り1本			地際に近い主幹の分岐部等に架ける								
				たらのき	センノカミキリ	2樹当り1本			樹上部の葉柄基部又は茎等に架ける								
バイオリサ・マダラ	ボーベリア バシアーナ	糸状菌	F-263株の分生子1×1千万CFU/cm ²	まつ(枯槁木)	マツノマダラカミキリ	不織布製剤 2500cm ² ／ ～10000cm ² ／枯槁木1m ²	—	成虫羽化脱出前	伐倒、集材した枯槁木に所定量の不織布製剤を設置し、ビニールシート等で被覆する。								
バイレーツ粒剤	メタリジウム アニソブリエ	糸状菌	SMZ-2000株 1×1000万CFU/g	マンゴー	チャノキイロアザミウマ	10g/樹	—	発生前～発生初期	対象害虫が落下する範囲内の株周辺に散布								
バストリア水和剤	バストーリア ペネトランス	糸状菌	孢子1.0×10億個/g	野菜類(施設栽培)	いも類	ネコブセンチュウ	1～5kg/10a	150～200L/10a	定植前	土壌表面に散布し混和							
					いちじく	ネコブセンチュウ		300L/10a	生育期	土壌表面に散布							
					いちじく	ネコブセンチュウ											
					いも類	ネコブセンチュウ	0.5g/穴	1L/穴	定植時	植穴土壌灌注							
					野菜類	ネコブセンチュウ											
					ブリファード水和剤	ベキロマイセス フモソロセウス	糸状菌	1×10億cfu/g	いちご(施設栽培)	ハダニ類	1000倍	100～300L/10a	発生初期	散布			
コナジラミ類																	
ワタアブラムシ																	
コナジラミ類																	
野菜類(施設栽培、ただし、いちごを除く)	ワタアブラムシ																
ボーベリアン		糸状菌	F-263株の分生子1×1千万CFU/cm ²	まつ(枯槁木)	マツノマダラカミキリ	不織布製剤 2500cm ² ／ ～10000cm ² ／枯槁木1m ²		成虫羽化脱出前	伐倒、集材した枯槁木に所定量の不織布製剤を設置し、ビニールシート等で被覆する。								
ポタニガードES	ボーベリア バシアーナ			茶	クワシロカイガラムシ	500倍	1000L/10a	発生初期		散布							
				レタス	オオタバコガ		100～300L/10a										
				トマト	コナジラミ類	500～2000倍	100～300L/10a										
				マンゴー	チャノキイロアザミウマ	1000倍	200～700L/10a										
				キャベツ	アオムシ	500倍	100～300L/10a										
				しそ	チャノホコリダニ	1000倍											
					マデイラコナカイガラムシ												
				ミニトマト	コナジラミ類	500～2000倍											
				野菜類	アブラムシ類	1000倍											
					ハダニ類												
					コナジラミ類	500倍											
					コナガ												
					アザミウマ類	500～1000倍											
ポタニガード水和剤			GHA株 分生子4.4×100億個/g	野菜類(施設栽培)	アザミウマ類	1000倍	100～300L/10a	発生初期	タケ内投入								
					アブラムシ類												
					コナジラミ類												
				ミニトマト	コナジラミ類	10g/10a/日		発生前～発生初期									
マイコタール	パーティシリウム レカニ	糸状菌	孢子3.0×10億spore/g	きく(施設栽培)	ミカンキイロアザミウマ	1000倍	150～300L/10a	発生初期	散布								
				トホギキョウ(施設栽培)	ミカンキイロアザミウマ		200～700L/10a										
				野菜類(施設栽培)	コナジラミ類												
				マンゴー(施設栽培)	チャノキイロアザミウマ												