天敵農薬の適用作物・適用害虫・使用量一覧

天敵農薬名	成分（天敵）	場所		適用作物																								適用害虫									成分含量	使用量	使用時期	使用方法	
		施設栽培	露地	野菜類	野菜類（トマト、ミニトマトを除く）	野菜類（なす、トマト、ミニトマト、キュウリを除く）	いちご	きゅうり	なす	とうがらし類	ピーマン	シクラメン	ほうれんそう	いも類	豆類（種実）	茶	果樹類	おうとう	りんご	日本なし	びわ	マンゴー	かんきつ	花き類・観葉植物	ばら	ポインセチア	むくげ	れんげ	アザミウマ類	チャノキイロアザミウマ	アブラムシ類	ワタアブラムシ	コナジラミ類	オンシツコナジラミ	ハモグリバエ類	ハダニ類	ミカンハダニ	チャノホコリダニ	アルファルファタコゾウムシ				
アカメ	アカメガシワクダアザミウマ	●		○																								○										5000頭/L	10000～15000頭/10a	発生初期	放飼	
アフィパール	コレマンアブラバチ	●		○																										○									羽化成虫500頭/ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ瓶	1～2瓶(約500～1000頭)/10a	発生初期	放飼	
アリガタ	アリガタシマアザミウマ	●		○																								○										成虫50頭/50ml	500～2000ml/10a(約500～2000頭)	発生初期	放飼	
イサパラリ	イサエアヒメコバチ	●		○																														○				成虫250頭/ﾎﾞﾄﾙ	250頭/10a	発生初期	放飼	
エルカード	サバクツヤコバチ	●		○																												○						成虫3000頭/箱	1箱/10a(約3000頭)	発生初期	放飼	
エンストリップ	オンシツツヤコバチ	●		○																						○						○						羽化雌成虫50頭/ｶｰﾄﾞ	25～30株当り1ｶｰﾄﾞ	発生初期	放飼	
オリスターA	タイリクヒメハナカメムシ	●		○																								○										成虫250頭/250ml	0.5～2L/10a(約500～2000頭)	発生初期	放飼	
カゲタロウ	ヤマトクサカゲロウ	●		○																						○					○							幼虫300頭/ｼｰﾄ	10～40頭/平方m	発生初期	放飼	
カメノコS	ヒメカメノコテントウ	●		○																										○								100頭/300ml	0.5～2頭/株	発生初期	放飼	
キイトップ	キイカブリダニ	●							○																			○										1000頭/250ml	6～12頭/平方m	発生初期	放飼	
ギフパール	ギフアブラバチ	●							○	○	○																			○								羽化成虫 250頭/瓶	1～2瓶/10a(約250～500頭)	発生初期	放飼	
ククメリス	ククメリスカブリダニ	●		○								○	○															○										500頭/10ml	50～100頭/株	発生初期	放飼	
コレトップ	コレマンアブラバチ	●		○																										○								羽化成虫250頭/ﾎﾞﾄﾙ	4～8ﾎﾞﾄﾙ/10a(1000～2000頭)	発生初期	放飼	
コレパラリ	コレマンアブラバチ	●		○																										○								羽化成虫500頭/瓶	1000頭/10a	発生初期	放飼	
サバクトップ	サバクツヤコバチ	●		○																												○						羽化成虫60頭/ｶｰﾄﾞ	50～75ｶｰﾄﾞ/10a	発生初期	放飼	
システムスワルくん	スワルスキーカブリダニ	●			○																○	○	○	○					○	○			○			○			250頭/ﾊﾟｯｸ	各使用単位（樹、100株、10a）あたりの指定パック数	発生直前～発生初期	放飼	
システムミヤコくん	ミヤコカブリダニ	●	●	○			○										○	○	○					○											○				100頭/ﾊﾟｯｸ	各使用単位（樹、100株、10a）あたりの指定パック数	発生直前～発生初期	放飼	
スパイカルEX	ミヤコカブリダニ	●	●	○										○		○	○							○											○				200頭/10ml	2.4～12ml/樹(約48～240頭)	発生初期	放飼	
スパイカルプラス	ミヤコカブリダニ	●	●	○										○	○									○											○				50頭/ﾊﾟｯｸ	各使用単位（樹、100株、10a）あたりの指定パック数	発生初期	放飼	
スパイデックス	チリカブリダニ	●		○										○	○		○							○	○										○				2000頭/100ml	20～3000頭/100株	発生初期	放飼	
スワマイト	スワルスキーカブリダニ	●				○		○	○																			○				○							50頭/ml	50000頭/10a	発生直前～発生初期	放飼	
スワルスキー	スワルスキーカブリダニ	●	●	○					○					○	○		○					○		○				○				○				○	○		1000頭/10ml	250ml/10a(約25000頭)	発生直前～発生初期	放飼	放飼後の厳冬期の月平均気温が10℃を下回る地域
スワルスキープラス	スワルスキーカブリダニ	●	●	○										○			○					○		○				○				○				○	○		250頭/ﾊﾟｯｸ	1～4ﾊﾟｯｸ/樹(約250～1000頭)	発生直前～発生初期	放飼	
タイリク	タイリクヒメハナカメムシ	●		○																								○										成虫50頭/50ml	500～2000ml/10a(約500～2000頭)	発生初期	放飼	
チャバラ	チャバラアブラコバチ	●		○																										○								成虫100頭/10ml	2000頭/10a	発生初期	放飼	
チリカ・ワーカー	チリカブリダニ	●		○																															○			2000頭/100ml	100～300ml/10a(約2000～6000頭/10a)	発生初期	放飼	
チリガブリ	チリカブリダニ	●		○																					○										○			2000頭/30ml	4000～6000頭/10a	発生初期	放飼	
チリトップ	チリカブリダニ	●		○																															○			1000頭/250ml	6000頭/10a	発生初期	放飼	
ツヤコバチEF30	オンシツツヤコバチ	●		○																												○						羽化雌成虫30頭/ｶｰﾄﾞ	10a当り80枚	発生初期	放飼	
ツヤトップ	オンシツツヤコバチ	●		○																													○					羽化雌成虫50頭/ｶｰﾄﾞ	25～30株当たり1ｶｰﾄﾞ	発生初期	放飼	
ツヤトップ25	オンシツツヤコバチ	●		○																													○					羽化雌成虫25頭/ｶｰﾄﾞ	25～30株当り2ｶｰﾄﾞ	発生初期	放飼	
ツヤパラリ	オンシツツヤコバチ	●		○																												○						羽化雌成虫100頭/ｶｰﾄﾞ	25～50株当たり1ｶｰﾄﾞ	発生初期	放飼	
テントップ	ナミテントウ	●		○																										○								2および3齢幼虫 200頭/600ml	10～13頭/m^2	発生初期	放飼	
トスパック	タイリクヒメハナカメムシ	●		○																								○										成虫250頭/250ml	0.5～2L/10a(約500～2000頭)	発生初期	放飼	
ナミトップ	ナミテントウ	●		○																										○								成虫100頭/ｶｯﾌﾟ	0.5～4頭/株	発生初期	放飼	
ナミトップ20	ナミテントウ	●		○																										○								成虫20頭/ｶｯﾌﾟ	0.5～4頭/株	発生初期	放飼	
ヒメトップ	イサエアヒメコバチ	●		○																														○				羽化成虫100頭/ﾎﾞﾄﾙ	2～8ﾎﾞﾄﾙ/10a(200～800頭)	発生初期	放飼	
ベミパール	チチュウカイツヤコバチ	●		○																																		羽化成虫50頭/ｶｰﾄﾞ	25～30株当たり1ｶｰﾄﾞ	発生初期	放飼	
ミドリヒメ	ハモグリミドリヒメコバチ	●		○																														○				成虫25頭/15ml容量	100頭/10a	発生初期	放飼	
ミヤコスター	ミヤコカブリダニ	●		○			○																												○			2000頭/300ml	2000～6000頭/10a	発生初期	放飼	
ミヤコトップ	ミヤコカブリダニ	●		○																															○			2000頭/250ml	約2000～6000頭/10a	発生初期	放飼	
メリトップ	ククメリスカブリダニ	●		○																								○										50000頭/缶	100頭/10a	発生初期	放飼	
ヨーロッパトビチビアメバチ	ヨーロッパトビチビアメバチ		●																								○										○	羽化成虫 80頭/袋	放飼地点1ヵ所当り400～2000頭	れんげ着蕾期	放飼	
リクトップ	タイリクヒメハナカメムシ	●		○																								○										成虫100頭/100ml	1000～3000頭/10a	発生初期	放飼	
リモニカ	リモニカスカブリダニ	●		○																								○				○						125頭/10ml	2～4L/10a(約25000～50000頭)	発生直前～発生初期	放飼	

※利用の検討をやりやすくするため、使用場所、適用作物、適用害虫が分かりやすいように簡略して表記した。実際の使用にあたっては、ラベルを必ず確認し、用法・用量を守ること。
※使用場所については、いずれかの作物で適用がある場合に●を付している。このため、露地に●がついていても、作物によっては露地の適用が無い場合もあるので、事前に必ずラベルを確認すること。