

カンキツの主要病害と防除薬剤一覧

薬剤	成分系	使用時期	本剤 使用回数	かい よう病	そう か病	そば かす病	黄斑 症	黄斑 病	灰色 かび病	褐色 腐敗病	幹腐 病	黒点 病	黒腐 病	小黒 点病	炭疽 病(さび果)	苗疫 病
ICホルト-412	無機銅	-	-	○								○				
ICホルト-66D	無機銅	-	-	○	○						○	○				
アグロケア水和剤	微生物	収穫前日まで	-						○							
アリエッティ水和剤	有機リン系	収穫前日まで	3回以内							○						○
イデグリーン水和剤	無機硫黄系	-	-	○	○							○				
エコショット	微生物	開花期～落弁期	-						○							
エコメイト	微生物	発病前～発病初期	-	○												
エムダイファー水和剤	エチレンビスカーハメート系	収穫60日前まで	2回以内									○		○		
カンタストライフロアブル	アニライド系	収穫14日前まで	3回以内						○							
キュープロフィックス40	無機銅	-	-	○												
クブラビットホルテ	無機銅	-	-	○												
コサイト3000	無機銅	-	-							○		○				
コサイト3000	無機銅	発芽前, 生育期	-	○												
コサイトDF	無機銅	-	-	○						○		○				
コサイトDF	無機銅	発芽前～発芽期	-	○												
コサイトホルト-	無機銅	-	-	○			○	○				○				
コサイトホルト-	無機銅	発芽前	-	○												
サンホルト-	無機銅	-	-	○	○											
ジーファイン水和剤	炭酸水素塩	収穫前日まで	-	○												
ストロビートライフロアブル	ストロビルリン系	収穫14日前まで	3回以内		○	○		○	○	○		○				
Zホルト-	無機銅	-	-	○	○			○								
テランフロアブル	保護剤(ジチアノン)	収穫30日前まで	3回以内		○							○			○	
トイツホルト-A	無機銅	-	-	○	○							○				
トップジンMペースト	ベンゾイミダゾール系	剪定整枝時	3回以内								○					
ハイオキパー水和剤	微生物	発病前～発病初期	-	○												
ハスワート顆粒水和剤	トロキシアニリド系	収穫14日前まで	2回以内						○							
ハリタシン液剤5	抗生物質	収穫14日前まで	4回以内	○												
ファンタジスタ顆粒水和剤	その他	収穫14日前まで	3回以内		○				○			○				
フジト-Lフロアブル	無機銅	-	-	○												
フジト-Fフロアブル	無機銅	-	-	○												
フルビカフロアブル	アミノピリミジン系	開花期～幼果期 但し, 収穫90日前ま	2回以内						○							
フロンサイトSC	保護剤(フルアジナム)	収穫30日前まで	1回		○				○			○				
フロンサイト水和剤	保護剤(フルアジナム)	収穫30日前まで	1回		○				○			○				○
ヘニト-DF	無機銅	-	-	○												
ヘニト-水和剤	無機銅	-	-	○	○							○				
ホテカートDF	無機銅	-	-	○												
ホトキラー水和剤	微生物	開花期～幼果期	-						○							
ホトキラー水和剤	微生物	発病前～発病初期	-						○							
ホルト-	無機銅	-	-	○	○							○				
マスタピース水和剤	微生物	発病前～発病初期	-	○												
マネーシDF	EBI	収穫30日前まで	3回以内		○											
マネーシ水和剤	EBI	収穫30日前まで	3回以内		○											
ムッシュホルト-DF	無機銅	-	-	○												
ライメイフロアブル	シアノイミダゾール系	収穫前日まで	3回以内							○						
ランマンフロアブル	シアノイミダゾール系	収穫前日まで	3回以内							○						
ロアラール水和剤	ジカルホキシミド系	収穫7日前まで	3回以内					○	○				○			
園芸ホルト-	無機硫黄	-	-	○	○							○				

※本表は薬剤選びの参考とし、実際の使用前には必ず使用方法を農薬ラベルで十分に確認の上、正しく使用してください。