

# 大豆害虫防除剤一覧

薬剤名	成分系	適用害虫																使用方法				使用時期	使用回数										
		ダイズシストセンチュウ	ネグサレセンチュウ	ネコブセンチュウ	アザミウマ類	アブラムシ類	ウラナシジミ	カメムシ類	コガネムシ類	シロイチモジマダラメイガ	ダイズクキタマバエ	ダイズサヤタマバエ	タネバエ	ナモグリバエ	ネキリムシ	ツメクサガ	ハスモンヨトウ	ハダニ類	ハモグリバエ	フタスジヒメハムシ	キノメイガ			マメシクイイガ	マメハンミョウ	マメヒメサヤムシガ	種子処理	土壌消毒	土壌散布	散布	無人ヘリ		
D-D	D-D	○	○	○																						○				作付の10～15日前ま	1回		
DC油剤	D-D	○	○	○																						○				作付の10～15日前ま	1回		
MR. ジョーカーEW	シラフルオフェン						○									○													○	収穫14日前まで	2回以内		
MR. ジョーカー粉剤DL	シラフルオフェン						○																							収穫7日前まで	2回以内		
TD粒剤	エチルチオメトン				○												○		○											収穫60日前まで	1回		
アクセルフロアブル	メタフルミジン															○														収穫前日まで	3回以内		
アクセルベイト	メタフルミジン														○															収穫前日まで	3回以内		
アクタラAL	チアメトキサム				○																								○	収穫7日前まで	2回以内		
アクタラ顆粒水溶剤	チアメトキサム				○		○																						○	収穫7日前まで	2回以内		
アグロスリン乳剤	シベルメトリン				○		○													○	○									収穫7日前まで	3回以内		
アタプロン乳剤	クロルフルアズロン															○												○	○	収穫14日前まで	2回以内		
アディオン乳剤	ベルメトリン				○																○	○						○	○	収穫7日前まで	3回以内		
アントム顆粒水溶剤	ジノテフラン						○		○																				○	収穫7日前まで	2回以内		
エコマスターBT	BT剤																○												○	収穫前日まで	-		
エルサン乳剤	PAP				○		○								○	○						○								収穫7日前まで	2回以内		
エルサン粉剤2	PAP							○								○						○								収穫7日前まで	2回以内		
エルサン粉剤2DL	PAP						○										○					○								収穫7日前まで	2回以内		
エルサン粉剤3DL	PAP						○		○								○													収穫7日前まで	2回以内		
オルトラン水和剤	アセフェート				○																								○	○	収穫60日前まで	3回以内	
カスケード乳剤	フルフェノクスロン				○												○												○	○	収穫7日前まで	2回以内	
カルホスベイトK	イソキサチオン														○													○		播種時～本葉2葉期	2回以内		
カルホス微粒剤F	イソキサチオン														○	○												○		播種時	2回以内		
カルホス粉剤	イソキサチオン														○	○												○		播種時	1回		
カルモック	イソキサチオン														○													○		播種時～本葉2葉期	2回以内		
ガードベイトA	ベルメトリン																											○		生育初期	3回以内		
キラップフロアブル	エチプロール						○																						○	収穫7日前まで	2回以内		
キラップ粉剤DL	エチプロール						○																						○	収穫7日前まで	2回以内		
クルーザーFS30	チアメトキサム																									○				播種前	1回		
クルーザーMAXX	フルジオキシニル:チアメトキ																													播種前	1回		
ゲットアウトWDG	シベルメトリン				○																								○	収穫7日前まで	3回以内		
コロマイト乳剤	ミルベメクテン																												○	収穫7日前まで	2回以内		
サイアノックス乳剤	CYAP				○																								○	○	収穫7日前まで	2回以内	
ジェイエース水溶剤	アセフェート				○												○												○	○	収穫60日前まで	3回以内	
ジメエート粒剤	ジメエート				○																								○	播種時	1回		
スターガード粒剤	ジノテフラン																													○	播種時	1回	
スタークルメイト液剤10	ジノテフラン																												○	○	収穫7日前まで	2回以内	
スタークル液剤10	ジノテフラン																												○	○	収穫7日前まで	2回以内	
スタークル粉剤DL	ジノテフラン																													○	○	収穫7日前まで	2回以内
スタークル粒剤	ジノテフラン																														播種時	1回	
スタークル顆粒水溶剤	ジノテフラン																												○	○	収穫7日前まで	2回以内	
スミチオントレボン乳剤	MEP:エトフェンブロックス																												○	○	収穫21日前まで	2回以内	
スミチオン乳剤	MEP																												○	○	○	収穫21日前まで	4回以内
スミチオン粉剤2	MEP																												○	○	○	収穫21日前まで	4回以内
スミチオン粉剤3DL	MEP																												○	○	○	収穫21日前まで	4回以内
ダーズバン乳剤40	クロルピリホス																												○	○	○	収穫7日前まで	2回以内
ダイアジノン粒剤10	ダイアジノン																												○	○	○	播種時	1回

