

オオタバコガ防除薬剤一覧

薬剤	成分系	成分	キャベツ	はくさい	レタス	ブロッコリー	使用時期	使用方法	本剤 使用回数
アクセルキングフロアブル	その他 その他	トルフェンピラト [®] メタフルミゾン	○				収穫14日前まで	散布	2回以内
アクセルフロアブル	その他	メタフルミゾン	○				収穫前日まで	散布	3回以内
アニキ乳剤	その他	レピメクチン	○	○	○		収穫3日前まで	散布	3回以内
アフームエクスラ顆粒水和剤	その他 IGR	エマメクチン安息香酸塩 ルフエヌロン		○	○		収穫7日前まで	散布	3回以内
アフーム乳剤	その他	エマメクチン安息香酸塩			○	○	収穫3日前まで	散布	3回以内
オルラン水和剤	有機リン系	アセフェート			○		収穫14日前まで	散布	3回以内
ガードナーフロアブル	ネオニコチノイド [®] 系	イミダクロプリト [®] スピノサト [®]			○		定植当日	灌注	1回
カスケード乳剤	IGR	フルフェノクスロン			○		収穫3日前まで	散布	3回以内
キックオフ顆粒水和剤	ジアミド [®] 系 ネオニコチノイド [®]	クロラントラニリプロール ジノテフラン			○		定植前日～定植時	灌注	1回
コテツフロアブル	その他	クロルフェナビル	○		○		収穫前日まで	散布	2回以内
ジェイエース水溶剤	有機リン系	アセフェート			○		収穫14日前まで	散布	3回以内
ジュリホフロアブル	ジアミド [®] 系 ネオニコチノイド [®]	クロラントラニリプロール チアメキサム			○		育苗期後半～定植当	灌注	1回
スピノエース顆粒水和剤	その他	スピノサト [®]			○		収穫3日前まで	散布	3回以内
スミフェート水溶剤	有機リン系	アセフェート			○		収穫14日前まで	散布	3回以内
セルオーフロアブル	ネオニコチノイド [®] 系	イミダクロプリト [®] フルベンジアミド [®]			○		定植3日前～定植時	灌注	1回
ディアナSC	その他	スピネトラム	○		○		収穫前日まで	散布	2回以内
トルネットエースDF	その他	インドキサカルブ [®]			○		収穫7日前まで	散布	2回以内
トルネットフロアブル	その他	インドキサカルブ [®] MP			○		収穫7日前まで	散布	2回以内
ハクサップ水和剤	ピレスロイド [®] 系 有機リン系	フェンバレーレート マラソン			○		収穫3日前まで	散布	2回以内
ハクサップ水和剤	ピレスロイド [®] 系 有機リン系	フェンバレーレート マラソン	○	○			収穫前日まで	散布	5回以内
ファルコンエースフロアブル	その他 IGR	スピノサト [®] メキシフェニジト [®]			○		収穫3日前まで	散布	2回以内
ファルコンフロアブル	IGR	メキシフェニジト [®]	○		○		収穫3日前まで	散布	2回以内
フェニックス顆粒水和剤	ジアミド [®] 系	フルベンジアミド [®]	○	○	○		収穫前日まで	散布	2回以内
プリンスフロアブル	その他	フィプロニル	○	○			収穫14日前まで	散布	2回以内
プリンスフロアブル	その他	フィプロニル		○			収穫21日前まで	散布	2回以内
ブレオフロアブル	その他	ヒリタリル	○	○	○		収穫7日前まで	散布	2回以内
ブレバソソフロアブル5	ジアミド [®] 系	クロラントラニリプロール	○		○		収穫前日まで	散布	3回以内
ブレバソソ粒剤	ジアミド [®] 系	クロラントラニリプロール			○		育苗期後半～定植時	株元散布	1回
ホタニガードES	天敵微生物	ホーベリア バシアーナ			○		発生初期	散布	-
ホリアムガンダム顆粒水和剤	その他 ジアミド [®] 系	エマメクチン安息香酸塩 クロラントラニリプロール			○		収穫3日前まで	散布	3回以内
マッチ乳剤	IGR	ルフエヌロン			○		収穫3日前まで	散布	3回以内
マトリックフロアブル	IGR	クロマフェニジト [®]			○		収穫7日前まで	散布	3回以内
モスピラン粒剤	ネオニコチノイド [®] 系	アセタミプリト [®]			○		定植前日～定植当日	株元散布	1回
ラービソフロアブル	カーバメート系	チオジカルブ [®]			○		収穫14日前まで	散布	2回以内
ランネット45DF	カーバメート系	メソミル			○		収穫7日前まで	散布	2回以内