

ハスモンヨトウ防除薬剤一覧

薬剤	成分系	成分	キャベツ	はくさい	だいこん	レタス	ブロッコリー	使用時期	使用方法	本剤使用回数
アクセルキングフロアブル	その他 その他	トルフェンピラト メタフルミゾン	○					収穫14日前まで	散布	2回以内
アクセルフロアブル	その他	メタフルミゾン	○	○				収穫前日まで	散布	3回以内
アクセルバイト	その他	メタフルミゾン	○	○				収穫7日前まで	株元散	3回以内
アグロスリン水和剤	ピレスロイド系	シハルメリン		○				収穫前日まで	散布	5回以内
アタプロン乳剤	IGR	クロルフルアスロン	○	○	○	○		収穫14日前まで	散布	3回以内
アニキ乳剤	その他	レピメクチン	○	○		○	○	収穫3日前まで	散布	3回以内
アフームエクセラ顆粒水和剤	その他 IGR	エマメクチン安息香酸塩 ルフェヌロン	○	○			○	収穫7日前まで	散布	3回以内
アフーム乳剤	その他	エマメクチン安息香酸塩	○			○		収穫3日前まで	散布	3回以内
アルハリン顆粒水溶剤	ネオニコチノイド	ジノテフラン					○	定植前日～定植時	灌注	1回
エルサン乳剤	有機リン系	PAP	○	○	○	○	○	収穫21日前まで	散布	2回以内
オルトラン水和剤	有機リン系	アセフェート	○					収穫7日前まで	散布	3回以内
				○				収穫14日前まで	散布	3回以内
ガードナーフロアブル	ネオニコチノイド系	イダクロプリド スピノサド	○					定植当日	灌注	1回
カウンター乳剤	IGR	ノバルロン	○					収穫7日前まで	散布	3回以内
カスケード乳剤	IGR	フルフェノクスロン					○	収穫7日前まで	散布	2回以内
			○					収穫14日前まで	散布	2回以内
						○		収穫3日前まで	散布	3回以内
ガンバ水和剤	その他	ジアフェンチウロン	○					収穫21日前まで	散布	2回以内
キックオフ顆粒水和剤	ジアミド系 ネオニコチノイド	クロラントラニプロール ジノテフラン	○			○	○	定植前日～定植時	灌注	1回
コテツフロアブル	その他	クロルフェナピル					○	収穫7日前まで	散布	2回以内
			○			○		収穫前日まで	散布	2回以内
ジェイエース水溶剤	有機リン系	アセフェート		○			○	収穫14日前まで	散布	3回以内
			○					収穫7日前まで	散布	3回以内
ジャックホット顆粒水和剤	B.T	パチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒	○					発生初期 但し、収穫前日まで	散布	-
ジュリホフロアブル	ジアミド系 ネオニコチノイド	クロラントラニプロール チアメキサム	○	○		○	○	育苗期後半～定植当日	灌注	1回
スタークル顆粒水溶剤	ネオニコチノイド	ジノテフラン					○	定植前日～定植時	灌注	1回
スミフェート水溶剤	有機リン系	アセフェート		○			○	収穫14日前まで	散布	3回以内
			○					収穫7日前まで	散布	3回以内
セルオーフロアブル	ネオニコチノイド系	イダクロプリド フルベンジアミド	○	○		○	○	定植3日前～定植時	灌注	1回
チーフメイト乳剤	ピレスロイド系 有機リン系	フルシトリネート PAP	○					収穫14日前まで	散布	2回以内
チューレックス顆粒水和剤	B.T	パチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒	○					発生初期 但し、収穫前日まで	散布	-
ディアナSC	その他	スピネトラム	○				○	収穫前日まで	散布	2回以内
テナホン5%バイト	カーバメート系	NAC	○					収穫14日前まで	株元散	3回以内
				○				収穫21日前まで	株元散	3回以内
トクチオン乳剤	有機リン系	プロチオホス	○					収穫21日前まで	散布	2回以内
トルネートエースDF	その他	インドキサカルブ	○				○	収穫7日前まで	散布	2回以内
トルネートフロアブル	その他	インドキサカルブMP	○				○	収穫7日前まで	散布	2回以内
ノキエイト乳剤	IGR	メタフルミゾン	○					収穫7日前まで	散布	2回以内

ハクサップ水和剤	ピレスロイド系 有機リン系	フェンバレート マラソン			○	収穫3日前まで	散布	2回以内
				○		収穫35日前まで	散布	3回以内
			○	○		収穫前日まで	散布	5回以内
ハスモン天敵	微生物	ハスモンヨトウ核多角体病ウイ	○		○	発生初期	散布	-
ファルコンエースフロアブル	その他 IGR	スピノサド メキシフェンゾト	○			収穫7日前まで	散布	2回以内
					○	収穫3日前まで	散布	2回以内
ファルコンフロアブル	IGR	メキシフェンゾト			○	収穫3日前まで	散布	2回以内
			○			収穫7日前まで	散布	2回以内
フェニックス顆粒水和剤	ジアミド系	フルベンジアミド			○	収穫前日まで	散布	2回以内
			○	○		収穫前日まで	散布	3回以内
プレオフロアブル	その他	ピリダリル	○		○	収穫7日前まで	散布	2回以内
プレバソソフロアブル5	ジアミド系	クロラントリニプロール	○		○	育苗期後半～定植当	灌注	1回
			○	○		収穫前日まで	散布	3回以内
					○	収穫3日前まで	散布	3回以内
ホリアムガンダム顆粒水和剤	その他 ジアミド系	エマメクチン安息香酸塩 クロラントリニプロール	○			収穫7日前まで	散布	3回以内
マッチ乳剤	IGR	ルフェヌロン	○		○	収穫7日前まで	散布	3回以内
マトリックフロアブル	IGR	クロマフェノゾト			○	収穫7日前まで	散布	3回以内
			○			収穫7日前まで	散布	4回以内
マブリック水和剤20	ピレスロイド系	フルバリネート	○	○		収穫14日前まで	散布	2回以内
マイクロテナボン水和剤85	カーバメート系	NAC	○	○		収穫14日前まで	散布	3回以内
モスピラン粒剤	ネオニコチノイド	アセタミプリト	○			定植前日～定植当日	株元散	1回
					○	収穫14日前まで	散布	2回以内
ラービンフロアブル	カーバメート系	チオジカルブ	○	○		収穫7日前まで	散布	2回以内
					○	収穫21日前まで	散布	2回以内
ラービン水和剤75	カーバメート系	チオジカルブ	○			収穫7日前まで	散布	4回以内
				○		収穫7日前まで	散布	2回以内
ランネット45DF	カーバメート系	メソミル	○			収穫3日前まで	散布	3回以内
ランネット微粒剤F	カーバメート系	メソミル	○	○		収穫7日前まで	散布	3回以内
レルタン乳剤25	有機リン系	クロルピリホスメチル	○			収穫7日前まで	散布	4回以内