

根こぶ病防除薬剤一覧

薬剤	成分系	成分	キベツ	ほくさい	だいこん	ブロッコリ	使用時期	使用方法	本剤使用回数		
カルメート55	-	石灰窒素	○	○			播種前又は植	散布後土壌混	1回		
石灰窒素50	-	石灰窒素	○	○			播種前又は植	散布後土壌混	1回		
石灰窒素55	-	石灰窒素	○	○			播種前又は植	散布後土壌混	1回		
粒状石灰窒素40	-	石灰窒素		○			播種前又は植	散布後土壌混	1回		
粒状石灰窒素55	-	石灰窒素	○	○			播種前又は植	散布後土壌混	1回		
オラクル粉剤	シアノイミダゾール系	アミスルブロム		○			播種前又は定植前	全面土壌混和	1回		
						○	定植前	全面土壌混和	1回		
			○				播種前(苗床)	全面土壌混和	2回以内(苗床では1回以内、本圃では1回)		
			○	○			定植前	作条土壌混和	1回		
オラクル顆粒水和剤	シアノイミダゾール系	アミスルブロム	○	○		○	定植前まで	灌注	1回		
ザ・つまごい	土壌殺菌(フルスルファミ)	フルスルファミド	○				定植前	全面散布後土	1回		
ダコソイル	有機塩素系	TPN		○			播種又は定植	全面土壌混和	2回以内		
					○		播種又は定植	作条及び全面	1回		
				○			播種又は定植	全面施用土壌	1回		
				○			播種又は定植	植穴処理土壌	1回		
ダコニール1000	有機塩素系	TPN				○	播種又は定植	作条施用土壌	1回		
ネビジンSC	土壌殺菌(フルスルファミド)	フルスルファミド	○				定植時	土壌灌注	1回		
ネビジン粉剤	土壌殺菌(フルスルファミド)	フルスルファミド		○				播種又は定植	全面散布後土	2回以内	
					○			播種又は定植	全面散布後土	1回	
				○		○		播種又は定植	全面土壌混和	1回	
				○				播種又は定植	全面土壌混和	2回以内	
				○		播種前	全面土壌混和	1回			
ネビジン顆粒水和	土壌殺菌(フルスルファミ)	フルスルファミド	○	○			播種又は定植	作条土壌混和	1回		
ネビモン粉剤	土壌殺菌(フルスルファミド)	フルスルファミド フルトラニル	○				播種又は定植	全面散布後土	2回以内		
ネビリュウ	土壌殺菌(フルスルファミ)	フルスルファミド	○	○		○	定植前	全面土壌混和	2回以内		
フィールドキーパー水和剤	天敵微生物	ハリオボラックス パラドクス		○	○			播種直後及び定植前日～当日	灌注	2回	
				○	○			播種直後	灌注	1回	
					○			播種直後及び定植前日～当日	灌注	2回	
フロンスイトSC	保護剤(フルアジナム)	フルアジナム					○	定植前	全面散布後土	1回	
			○					播種又は定植前	全面散布後土壌混和	2回以内(苗床では1回以内、本圃では1回)	
				○			○		播種又は定植	作条土壌混和	1回
				○			○		播種又は定植	全面土壌混和	1回
フロンスイト粉剤	保護剤(フルアジナム)	フルアジナム		○				播種又は定植前	全面土壌混和	2回以内	
								播種又は定植前	全面土壌混和	2回以内(苗床で)	
				○					播種又は定植前	作条土壌混和	2回以内
				○					播種又は定植前	作条土壌混和	2回以内(苗床で)
ランマンフロアブル	シアノイミダゾール系	シアゾファミド		○	○		○	定植前日～当	灌注	1回	
				○	○			定植時	灌注	1回	