

表3 主要カメムシ防除剤（殺虫成分散布剤のみ）

薬剤	成分系	成分名	適用害虫					使用時期	本剤使用回数	
			カメムシ類	トビイロウンカ	ニカメイチュウ	フタオビコヤガ	イナゴ類			
アクトラフロアブル	ネオニコチノイド系	チアメキサム	○					収穫21日前まで	2回以内	
アドマイヤ-粉剤DL	ネオニコチノイド系	イミダクロプリト	○	○				収穫7日前まで	2回以内	
アプロードスター-ケルゾル	ネオニコチノイド系 IGR	ジノテフラン プロフェジン	○	○				収穫7日前まで	3回以内	
アルバリン粉剤DL	ネオニコチノイド系	ジノテフラン	○	○	○	○	○	収穫7日前まで	3回以内	
アルバリン粒剤	ネオニコチノイド系	ジノテフラン	○	○	○	○	○	収穫7日前まで	3回以内	
アルバリン顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	ジノテフラン	○	○				収穫7日前まで	3回以内	
エビセクトレホン粉剤20DL	ヒスロイド系 ネライストキシ	エトフェンプロックス チオシクラム	○					収穫14日前まで	3回以内	
エルサンハッサ粉剤20DL	カーバメート系 有機リン系	BPMC PAP	○	○	○		○	収穫7日前まで	2回以内	
エルサン乳剤	有機リン系	PAP	○				○	収穫7日前まで	2回以内	
エルサン粉剤2DL	有機リン系	PAP	○		○			収穫7日前まで	2回以内	
エルサン粉剤3DL	有機リン系	PAP	○		○	○		収穫7日前まで	2回以内	
キラップAD粒剤	ネオニコチノイド系 その他	イミダクロプリト エチプロール	○	○				収穫14日前まで	2回以内	
キラップL粒剤	その他	エチプロール	○	○				収穫14日前まで	2回以内	
キラップジョーカ-フロアブル	その他 ヒスロイド系	エチプロール シラフルオフェン	○	○			○	○	収穫14日前まで	2回以内
キラップジョーカ-粉剤DL	その他 ヒスロイド系	エチプロール シラフルオフェン	○	○			○	○	収穫14日前まで	2回以内
キラップフロアブル	その他	エチプロール	○	○					収穫14日前まで	2回以内
キラップ微粒剤F	その他	エチプロール	○	○			○		収穫14日前まで	2回以内
キラップ粉剤DL	その他	エチプロール	○	○			○		収穫14日前まで	2回以内
キラップ粒剤	その他	エチプロール	○	○					収穫14日前まで	2回以内
スタークル1キロH粒剤	ネオニコチノイド系	ジノテフラン	○	○					収穫7日前まで	3回以内
スタークルL粉剤DL	ネオニコチノイド系	ジノテフラン	○	○					収穫7日前まで	3回以内
スタークルレホン粉剤DL	ヒスロイド系 ネオニコチノイド系	エトフェンプロックス ジノテフラン	○	○			○		収穫7日前まで	3回以内
スタークルメイト1キロH粒剤	ネオニコチノイド系	ジノテフラン	○	○					収穫7日前まで	3回以内
スタークルメイトL粉剤DL	ネオニコチノイド系	ジノテフラン	○	○					収穫7日前まで	3回以内
スタークルメイト液剤10	ネオニコチノイド系	ジノテフラン	○	○					収穫7日前まで	3回以内
スタークルメイト豆つぶ	ネオニコチノイド系	ジノテフラン	○	○					収穫7日前まで	3回以内
スタークル液剤10	ネオニコチノイド系	ジノテフラン	○	○					収穫7日前まで	3回以内
スタークル豆つぶ	ネオニコチノイド系	ジノテフラン	○	○					収穫7日前まで	3回以内
スタークル粉剤DL	ネオニコチノイド系	ジノテフラン	○	○			○	○	収穫7日前まで	3回以内
スタークル粒剤	ネオニコチノイド系	ジノテフラン	○	○	○				収穫7日前まで	3回以内
スタークル顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	ジノテフラン	○	○					収穫7日前まで	3回以内
スミチオンレホン乳剤	ヒスロイド系 有機リン系	エトフェンプロックス MEP	○	○					収穫21日前まで	2回以内
スミチオンレホン粉剤DL	ヒスロイド系 有機リン系	エトフェンプロックス MEP	○	○	○		○		収穫21日前まで	2回以内(但し、出穂前は1回)
スミチオン水和剤40	有機リン系	MEP	○						収穫21日前まで	2回以内
スミチオン乳剤	有機リン系	MEP	○		○	○			収穫21日前まで	2回以内
スミチオン微粒剤F	有機リン系	MEP	○		○				収穫21日前まで	2回以内(但し、出穂前は1回)
スミチオン粉剤2DL	有機リン系	MEP	○	○	○				収穫21日前まで	2回以内(但し、出穂前は1回)
スミチオン粉剤3DL	有機リン系	MEP	○	○	○				収穫21日前まで	2回以内(但し、出穂前は1回)
スミハッサ乳剤75	カーバメート系 有機リン系	BPMC MEP	○	○	○				収穫21日前まで	2回以内
スミハッサ粉剤20DL	カーバメート系 有機リン系	BPMC MEP	○	○	○				収穫21日前まで	2回以内(但し、出穂前は1回)
スミハッサ粉剤50DL	カーバメート系 有機リン系	BPMC MEP	○	○	○				収穫21日前まで	2回以内(但し、出穂前は1回)
ダントツEXフロアブル	ネオニコチノイド系	クロチアニジン	○	○			○		収穫7日前まで	3回以内
ダントツH粉剤DL	ネオニコチノイド系	クロチアニジン	○	○	○	○	○		収穫7日前まで	3回以内
ダントツフロアブル	ネオニコチノイド系	クロチアニジン	○	○			○		収穫7日前まで	3回以内
ダントツ水溶剤	ネオニコチノイド系	クロチアニジン	○	○					収穫7日前まで	3回以内
ダントツ粉剤DL	ネオニコチノイド系	クロチアニジン	○	○					収穫7日前まで	3回以内
ダントツ粒剤	ネオニコチノイド系	クロチアニジン	○	○					収穫7日前まで	3回以内
チェス水和剤	その他	ピメロジン	○	○					収穫14日前まで	2回以内
ディブテレックス乳剤	有機リン系	DEP	○	○					収穫14日前まで	4回以内
レホンEW	ヒスロイド系	エトフェンプロックス	○	○			○		収穫21日前まで	3回以内
レホンL粉剤DL	ヒスロイド系	エトフェンプロックス	○	○					収穫7日前まで	3回以内
レホンMC	ヒスロイド系	エトフェンプロックス	○	○					収穫21日前まで	3回以内
レホンスター-フロアブル	ヒスロイド系 ネオニコチノイド系	エトフェンプロックス ジノテフラン	○	○					収穫21日前まで	3回以内
レホンスター-粉剤DL	ヒスロイド系 ネオニコチノイド系	エトフェンプロックス ジノテフラン	○	○					収穫7日前まで	3回以内
レホン水和剤	ヒスロイド系	エトフェンプロックス	○	○					収穫21日前まで	3回以内
レホン乳剤	ヒスロイド系	エトフェンプロックス	○	○					収穫21日前まで	3回以内
レホン粉剤DL	ヒスロイド系	エトフェンプロックス	○	○	○		○		収穫7日前まで	3回以内
ハダントレホン粉剤DL	ヒスロイド系 ネライストキシ	エトフェンプロックス カルタップ	○	○					収穫21日前まで	3回以内
ベストガード粉剤DL	ネオニコチノイド系	ニテンピラム	○	○					収穫14日前まで	4回以内
ベストガード粒剤	ネオニコチノイド系	ニテンピラム	○	○					収穫14日前まで	4回以内
マトリックジョーカ-粉剤DL	IGR ヒスロイド系	クロマフェンジド シラフルオフェン	○	○					収穫14日前まで	2回以内
マラハッサ粉剤DL	有機リン系 カーバメート系	マラソン BPMC	○	○					収穫7日前まで	5回以内
MR.ジョーカ-EW	ヒスロイド系	シラフルオフェン	○	○			○	○	収穫14日前まで	2回以内
MR.ジョーカ-粉剤DL	ヒスロイド系	シラフルオフェン	○	○			○		収穫7日前まで	2回以内
ミミックジョーカ-粉剤DL	ヒスロイド系 IGR	シラフルオフェン テブフェジド	○	○	○				収穫14日前まで	2回以内