

小麦 赤かび病防除薬剤一覧

種類名	成分系	成分	赤かび	赤さび	うどんこ病	使用時期	使用方法	使用回数
ストロビーフロアブル	クレソキシムメチル水和剤	ストロビルリン系	○	○	○	収穫14日前まで	散布	3回以内
トップジンM水和剤	チオファネートメチル水和剤	ベンゾイミダゾール系	○	○	○	収穫14日前まで	散布	3回以内(出穂期以降は2回以内)
トリフミン水和剤	トリフルミゾール水和剤	EBI	○		○	収穫14日前まで	散布	3回以内
ペフラン液剤25	イミノクタジン酢酸塩液剤	保護剤(イミノクタジン)	○			収穫14日前まで	散布	3回以内(但し、出穂期以降は1回以内)
ペルクート水和剤	イミノクタジナルベシル酸塩水和剤	〃	○			収穫21日前まで	散布	3回以内(出穂期以降は1回以内)
ベンレート水和剤	ベニミル水和剤	ベンゾイミダゾール系	○			収穫7日前まで	散布	3回以内
イオウフロアブル	水和硫黄剤	無機硫黄系	○	○	○	-	散布	-
サルファーズル	〃	〃	○	○	○	-	散布	-
サンヨール	DBEDC乳剤	有機銅	○			収穫14日前まで	散布	3回以内
トップジンMゾル	チオファネートメチル水和剤	ベンゾイミダゾール系	○			収穫14日前まで	散布	3回以内(出穂期以降は2回以内)
トップジンM粉剤	チオファネートメチル粉剤	〃	○			収穫14日前まで	散布	3回以内(出穂期以降は2回以内)
トリフミン乳剤	トリフルミゾール乳剤	EBI	○		○	収穫3日前まで	散布	3回以内
撒粉ホルトール粉剤DL	銅粉剤	無機銅	○			-	散布	-
石灰硫黄合剤	石灰硫黄合剤	無機硫黄系	○			-	散布	-
アミスターコンビフロアブル	アゾキシストロビン・シプロコナゾール水和剤	ストロビルリン系・EBI	○	○	○	収穫30日前まで	散布	2回以内
クムラス	水和硫黄剤	無機硫黄系	○	○	○	-	散布	-
コロナフロアブル	水和硫黄剤	無機硫黄系	○			-	散布	-
シルバキュアフロアブル	テブコナゾール水和剤	EBI	○	○	○	収穫7日前まで	散布	2回以内
チルト乳剤25	プロピコナゾール乳剤	EBI	○			収穫7日前まで	散布	3回以内
トップジンM粉剤DL	チオファネートメチル粉剤	ベンゾイミダゾール系	○			収穫14日前まで	散布	3回以内(出穂期以降は2回以内)
ナティーホフロアブル	テブコナゾール・トリフロキシストロビン水和剤	EBI・ストロビルリン系	○			収穫21日前まで	散布	2回以内
ペフトップジンフロアブル	イミノクタジン酢酸塩・チオファネートメチル水和剤	イミノクタジン・ベンゾイミダゾール系	○			収穫14日前まで	散布	3回以内(出穂期以降は1回以内)
ペフラン液剤12.5	イミノクタジン酢酸塩液剤	保護剤(イミノクタジン)	○			収穫14日前まで	散布	3回以内(但し、出穂期以降は1回以内)
ワークアップS乳剤	メコナゾール乳剤	EBI	○	○	○	収穫14日前まで	散布	2回以内
ワークアップ乳剤	メコナゾール乳剤	EBI	○	○	○	収穫14日前まで	散布	2回以内
ワークアップ粉剤DL	メコナゾール粉剤	EBI	○	○	○	収穫14日前まで	散布	2回以内
スミトップM粉剤	MEP・チオファネートメチル粉剤	有機リン系・ベンゾイミダゾール系	○		○	収穫14日前まで	散布	1回

※適用内容については簡略化して示してあるので、実際の使用にあたっては、農薬ラベルを十分に確認の上、正しく使用すること。