

小麦除草剤一覧

除草剤名	有効成分	成分系列	使用方法(例)	雑草 茎葉 散布	土壌 表面 散布	使用回数
アクチノール乳剤	アイキシニル乳剤	その他有機	穂ばらみ期まで(雑草生育)	○		2回以内
エイトアップ液剤	グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	アミノ酸系	耕起7日前まで(雑草生育)	○		1回
MCPソーダ塩	MCPAナトリウム塩液剤	フェノキシ酸系	(秋播麦類)幼穂形成期 但	○		3回以内
カイトック細粒剤F	ペンデイメタリン・リニユロン粉粒剤	ジニトロアニリン系・尿素系	播種直後(雑草発生前)		○	1回
カイトック乳剤	ペンデイメタリン・リニユロン乳剤	ジニトロアニリン系・尿素系	播種直後(雑草発生前)		○	1回
カルナクス	グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	アミノ酸系	耕起7日前まで(雑草生育期)	○		1回
カレース乳剤	ジフルフェニカン・トリフルラリン乳剤	酸アミド系・ジニトロアニリン系	播種後出芽前(雑草発生前)		○	1回
草枯らし	グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	アミノ酸系	耕起7日前まで(雑草生育期)	○		1回
クサクリア	グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	アミノ酸系	耕起7日前まで(雑草生育期)	○		1回
クサグリーン液剤	グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	アミノ酸系	収穫7日前まで(雑草生育)	○		1回
クリアター細粒剤F	ベンチカーブ・ペンデイメタリン・リニユロン粉粒剤	カーバメート系・ジニトロアニリン系・尿素	播種直後(雑草発生前)		○	1回
クリアター乳剤	ベンチカーブ・ペンデイメタリン・リニユロン乳剤	カーバメート系・ジニトロアニリン系・尿素	播種直後(雑草発生前)		○	1回
グリホエキス液剤	グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	アミノ酸系	耕起7日前まで(雑草生育)	○		1回
グリホス	グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	アミノ酸系	耕起10日以前(雑草生育期)	○		1回
クロIPC	IPC乳剤	カーバメート系	播種直後または2～3葉期		○	1回
クロIPC乳剤	IPC乳剤	カーバメート系	播種直後または2～3葉期		○	1回
ケサカート50	プロメトリン水和剤	トリアジン系	播種直後		○	2回以内
コーコーサン細粒剤F	ペンデイメタリン粉粒剤	ジニトロアニリン系	播種後出芽前(雑草発生前)		○	1回
コーコーサン乳剤	ペンデイメタリン乳剤	ジニトロアニリン系	播種後(雑草発生前)～小麦	○	○	1回
コーコーサン乳剤30	ペンデイメタリン乳剤	ジニトロアニリン系	播種後(雑草発生前)～小麦	○	○	1回
コラク乳剤	トリフルラリン・プロメトリン乳剤	ジニトロアニリン系・尿素系トリアジン系	播種後発芽前(雑草発生前)		○	1回
コンパカレル液剤	グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	アミノ酸系	耕起7日前まで(雑草生育)	○		1回
コンボラル	トリフルラリン・ペンデイメタリン粉粒剤	ジニトロアニリン系・ジニトロアニリン系	播種直後		○	1回
サターハアロ乳剤	プロメトリン・ベンチカーブ乳剤	トリアジン系・カーバメート系	播種直後～麦出芽前		○	1回
サターハアロ粒剤	プロメトリン・ベンチカーブ粒剤	トリアジン系・カーバメート系	生育初期(小麦の4葉期ま		○	1回
サンダーホルト007	グリホサートイソプロピルアミン塩・ヒラフルフェニエチル水和剤	アミノ酸系・その他有機	耕起7日前まで(雑草生育)	○		1回
シナジオ乳剤	トリフルラリン・IPC乳剤	ジニトロアニリン系・カーバメート系	播種後出芽前(雑草発生前)		○	1回
シンノグリスター	グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	アミノ酸系	耕起7日前まで(雑草生育期)	○		1回
トレファノサイト乳剤	トリフルラリン乳剤	ジニトロアニリン系	播種後発芽前(雑草発生前)		○	2回以内
トレファノサイト粒剤2.5	トリフルラリン粒剤	ジニトロアニリン系	中耕除草後雑草発生前 但		○	2回以内
ハーモニー75DF水和剤	チフェンスルフロメチル水和剤	スルホニルウレア系	麦1葉期～節間伸長前(但	○		1回
ハーモニー細粒剤F	チフェンスルフロメチル粉粒剤	スルホニルウレア系	播種後～麦3葉期(雑草発生		○	1回
ハイフワン液剤	グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	アミノ酸系	耕起7日前まで(雑草生育)	○		1回
ハサグラン液剤(ナトリウム塩)	ベンタジン液剤	ダイアジン系	小麦の生育期(雑草の3～6	○		1回
ハスタ液剤	ゲルホシネット液剤	アミノ酸系	収穫7日前まで(雑草生育)	○		3回以内
プリグロックSL	ジクワット・ハラコート液剤	ヒピリジリウム系・ヒピリジリウム系	雑草生育期	○		4回以内

ホクハック水和剤	DBN・DCMU水和剤	その他有機・尿素系	麦2～3葉期(スズメノテッポウ1.5	○	1回
マイゼット	ジクワット・パラコート液剤	ヒピリジリウム系・ヒピリジリウム系	雑草生育期	○	4回以内
マルカリータ	グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	アミノ酸系	雑草生育期(草丈30cm以	○	1回
ムキレンジャー乳剤	フロスルホカルブ・リニユロン乳剤	カーバメート系	播種後出芽前(雑草発生前)	○	1回
ラウントアップマックスロート	グリホサートカリウム塩液剤	アミノ酸系	耕起又は播種前まで(雑草	○	3回以内
レグロック	ジクワット液剤	ヒピリジリウム系	雑草生育期(播種5～10日	○	1回

※本一覧表は、代表的な適用内容を示したものであるため、実際の使用にあたってはラベルを十分に確認して正しく使用すること。