

ウリ科春夏野菜の防除薬剤一覧

薬剤名	薬剤系列	毒性	かぼ ちや	き ゆう り	す い か	野 菜 類	ア ブ ラ ム シ 類	コ ナ ジ ラ ミ 類	う ど ん こ 病	ペ と 病	収穫前使用日数	使用方法
ズボルドー	無機銅	普				○				○	－	散布
アーデント水和剤	ピレスロイド系	普		○	○		○	○	○		収穫前日まで	散布
アカリタッチ乳剤	その他	普				○			○		収穫前日まで	散布
アクタラ粒剤5	ネオニコチノイド系	普		○	○		○	○			定植時	植穴処理
アクタラ顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	普		○	○		○	○			収穫前日まで	散布
アグロスリン水和剤	ピレスロイド系	劇		○	○		○	○			収穫前日まで	散布
アグロスリン乳剤	ピレスロイド系	劇	○	○	○		○	○			収穫前日まで	散布
アザミバスター水和剤	ピレスロイド系	普		○	○		○	○			収穫前日まで	散布
アディオン乳剤	ピレスロイド系	普	○	○	○		○	○			収穫前日まで	散布
アドマイヤー1粒剤	ネオニコチノイド系	普	○	○	○		○	○			定植時	植穴土壌混和
アドマイヤーフロアブル	ネオニコチノイド系	劇	○	○	○		○				収穫前日まで	散布
アドマイヤー水和剤	ネオニコチノイド系	劇		○	○		○	○			収穫前日まで	散布
アドマイヤー顆粒水和剤	ネオニコチノイド系	劇	○	○	○		○	○			収穫前日まで	散布
アフエットフロアブル	アニライド系	普		○					○		収穫前日まで	散布
アブロードエースフロアブル	IGR	普		○	○			○			収穫前日まで	散布
アミスター20フロアブル	ストロビルリン系	普		○					○	○	収穫前日まで	散布
アミスターオブティフロアブル	ストロビルリン系＋有機塩素系	普	○	○	○				○	○	収穫7日前ま	散布
あめんこ	その他	普				○	○	○	○		収穫前日まで	散布
アリエッティC水和剤	保護剤＋有機リン系	普		○						○	収穫前日まで	散布
アリエッティ水和剤	有機リン系	普	○	○						○	収穫前日まで	散布
アルバリン粒剤	ネオニコチノイド系	普	○	○			○	○			定植時，生育	定植時，株元散布
アルバリン顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	普	○	○			○	○			収穫前日まで	散布
アルバリン顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	普			○		○				収穫7日前ま	散布
アントム顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	普		○			○	○			収穫前日まで	散布
イオウフロアブル	無機硫黄系	普	○		○				○		－	散布
インプレッション水和剤	微生物	普	○			○			○		発病前から発 病初期まで	無人ヘリコプターによる 散布
ウララDF	その他	普		○	○		○	○			収穫前日まで	散布
エトフィンフロアブル	その他	普		○						○	収穫前日まで	散布
エルサン乳剤	有機リン系	劇	○		○		○				収穫3日前ま	散布
オーソサイド水和剤80	保護剤(キャブタン)	普	○		○					○	収穫14日前ま	散布
オーソサイド水和剤80	保護剤(キャブタン)	普		○						○	収穫前日まで	散布
オキシラン水和剤	保護剤＋有機銅	普		○						○	1番花の開花	散布
オリオン水和剤40	カーバメート系	劇			○		○				収穫前日まで	散布
オルトランDX粒剤	有機リン系＋ネオニコチノイド系	普		○				○			定植時	植穴処理土壌混和
オルトラン粒剤	有機リン系	普		○			○	○			定植時，収穫	定植時，株元散布
オルトラン粒剤	有機リン系	普		○							定植時及び収 穫前日まで	定植時散布，生育 期株元散布
オンコルスタークル粒剤	ネオニコチノイド系＋カーバメート系	普		○				○			定植時	株元散布
オンコル粒剤1	カーバメート系	普		○	○		○				定植時	植穴土壌混和
オンコル粒剤5	カーバメート系	普		○	○		○				定植時	植穴散布
オンダイアエース粒剤	有機リン系＋カーバメート系	普			○		○				定植時	作条土壌混和
カーゼートPZ水和剤	シアノアセトアミド系＋保護剤(EBDC)	普		○						○	収穫前日まで	散布
カスミンボルドー	抗生物質＋無機銅	普		○	○				○	○	収穫前日まで	散布
ガゼット粒剤	カーバメート系	劇		○			○				定植時	株元散布又は植穴 土壌混和
ガゼット粒剤	カーバメート系	劇			○		○				育苗期後半	株元散布
ガッテンフロアブル2	その他	普		○	○				○		収穫前日まで	散布
ガッテン乳剤	その他	普	○	○	○				○		収穫前日まで	散布
カッパースン水和剤	抗生物質＋無機銅	普		○	○				○	○	収穫前日まで	散布
カンパネラ水和剤	カーバメート系＋保護剤(EBDC)	普		○						○	収穫前日まで	散布

キノドーフロアブル	有機銅	普	○						○	収穫前日まで	散布	
キノドー水和剤40	有機銅	普	○						○	収穫21日前ま	散布	
キノドー水和剤40	有機銅	普		○					○	1番花の開花	散布	
キノドー水和剤40	有機銅	普			○				○	収穫10日前ま	散布	
クムラス	無機硫黄系	普				○			○	－	散布	
クリアオール水和剤	ピレスロイド系＋殺ダニ剤	普			○		○	○		収穫前日まで	散布	
クリーンカップ	無機銅＋微生物	普		○		○			○	○	収穫前日まで	散布
クリーンサポート	微生物＋抗生物質	普		○					○		収穫前日まで	散布
クリーンフルピカ	微生物＋アニリノピリミジン系	普		○					○		収穫前日まで	散布
クルーザー48	ネオニコチノイド系	普		○			○				播種前	塗沫処理
ケミヘル	無機銅＋微生物	普		○		○			○	○	収穫前日まで	散布
コサイドボルドー	無機銅	普		○						○	－	散布
コルト顆粒水和剤	その他	普		○			○	○			収穫前日まで	散布
コロナフロアブル	無機硫黄系	普	○						○			散布
コロマイト乳剤	その他	普		○				○			収穫前日まで	散布
サーガ水和剤	保護剤（イミノクタジン）＋保護剤（EBDC）	普		○					○	○	収穫前日まで	散布
サイアノックス乳剤	有機リン系	普		○			○				収穫開始3日	散布
サイハロン水和剤	ピレスロイド系	劇		○			○	○			収穫前日まで	散布
サイハロン乳剤	ピレスロイド系	劇		○	○		○	○			収穫前日まで	散布
サブロール乳剤	EBI	普		○					○		収穫前日まで	散布
サルファーゾル	無機硫黄系	普	○						○		－	散布
サルファグレン	無機硫黄系	普		○					○		－	くん煙
サンボルドー	無機銅	普		○						○	－	散布
サンマイトフロアブル	殺ダニ剤	劇	○		○		○	○	○		収穫3日前ま	散布
サンマイトフロアブル	殺ダニ剤	劇		○			○	○	○		収穫前日まで	散布
サンヨール	有機銅	普	○	○	○		○	○	○	○	収穫前日まで	散布
シーマージェット	殺ダニ剤＋カーバメート系	劇		○			○		○		収穫前日まで	くん煙
ジェイエース粒剤	有機リン系	普		○			○	○			収穫前日まで	定植時散布、生育期 株元散布
シグナムWDG	ストロビルリン系＋アニライド系	普	○		○				○		収穫前日まで	散布
シトラーフロアブル	有機銅＋有機塩素系	普		○						○	収穫前日まで	散布
ジマンダイセンフロアブル	保護剤（EBDC）	普		○						○	収穫前日まで	散布
ジマンダイセン水和剤	保護剤（EBDC）	普	○							○	収穫30日前ま	散布
ジマンダイセン水和剤	保護剤（EBDC）	普		○						○	収穫前日まで	散布
ジマンダイセン水和剤	保護剤（EBDC）	普			○					○	収穫7日前ま	散布
ジマンレックス水和剤	ジカルボキシイミド系＋保護剤（EBDC）	普		○						○	収穫前日まで	散布
ジメトエート乳剤	有機リン系	劇	○				○				収穫7日前ま	散布
ジャストフィットフロアブル	その他有機＋カーバメート系	普		○						○	収穫前日まで	散布
ジャッジ箱粒剤	カーバメート系＋抵抗性誘導	普		○			○				定植時	植穴土壌混和
ショウスター	無機銅＋有機塩素系	普		○						○	収穫前日まで	散布
スカウトフロアブル	ピレスロイド系	劇		○	○		○	○			収穫前日まで	散布
スカウト乳剤	ピレスロイド系	劇		○			○	○			収穫前日まで	散布
スクレタン水和剤	無機銅＋ジカルボキシイミド系	普		○					○	○	収穫前日まで	散布
スコア顆粒水和剤	EBI	普	○						○		収穫3日前ま	散布
スコア顆粒水和剤	EBI	普		○	○				○		収穫前日まで	散布
スターガード粒剤	ネオニコチノイド系	普	○	○			○	○			定植時	植穴土壌混和
スターガード粒剤	ネオニコチノイド系	普		○			○	○			収穫14日前ま	生育期株元散布
スタークル粒剤	ネオニコチノイド系	普	○	○	○		○	○			定植時	植穴土壌混和
スタークル粒剤	ネオニコチノイド系	普		○			○	○			収穫14日前ま	生育期株元散布
スタークル顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	普	○	○			○	○			収穫前日まで	散布
スタークル顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	普			○		○				収穫7日前ま	散布
ストロビーフロアブル	ストロビルリン系	普	○	○	○				○	○	収穫前日まで	散布
スプレーオイル	その他	普		○						○	－	散布
スミチオン乳剤	有機リン系	普	○				○				収穫14日前ま	散布
スミチオン乳剤	有機リン系	普		○			○				収穫前日まで	散布
スミチオン乳剤	有機リン系	普			○		○				収穫3日前ま	散布
スミフェート粒剤	有機リン系	普		○			○	○			収穫前日まで	定植時散布、生育期 株元散布
スミロディー乳剤	ピレスロイド系＋有機リン系	劇	○					○			収穫14日前ま	散布
スミロディー乳剤	ピレスロイド系＋有機リン系	劇		○			○	○			収穫前日まで	散布
スミロディー乳剤	ピレスロイド系＋有機リン系	劇			○		○				収穫3日前ま	散布

セレナーデ水和剤	微生物	－	○						○	発病前から発病初期まで	無人ヘリコプターによる散布	
セレナーデ水和剤	微生物	－				○			○	発病前から発	散布	
ダイアジノン水和剤34	有機リン系	劇	○				○			収穫21日前ま	散布	
ダイアジノン水和剤34	有機リン系	劇			○		○			収穫14日前ま	散布	
ダイアジノン乳剤40	有機リン系	劇		○			○			植付時	散布	
ダイアジノン乳剤40	有機リン系	劇			○		○			収穫14日前ま	散布	
ダイメリットDF	保護剤(イミノクタジン)＋抗生物質	普		○					○	収穫前日まで	散布	
ダイナモ顆粒水和剤	シアノイミダゾール系＋シアノアセトアミド系	普		○					○	収穫前日まで	散布	
ダイマジン	保護剤(イミノクタジン)＋ヒドロキシアニリド系	普		○					○	収穫前日まで	散布	
ダコニール1000	有機塩素系	普	○						○	○	収穫7日前ま	散布
ダコニール1000	有機塩素系	普		○					○	○	収穫前日まで	散布
ダコニールエース	有機塩素系	普	○						○		収穫7日前ま	散布
ダコニールエース	有機塩素系	普		○					○		収穫前日まで	散布
ダコニールくん煙剤	有機塩素系	普		○					○	○	収穫前日まで	くん煙
ダコニールジェット	有機塩素系	普		○					○	○	収穫前日まで	くん煙(通常10～15時間)
ダコニールジェット	有機塩素系	普		○							収穫前日まで	くん煙(通常10～15時間)
ダコニール粉剤	有機塩素系	普		○					○		収穫前日まで	散布
ダコニール顆粒水和剤	有機塩素系	普		○					○		収穫前日まで	散布
タフパール	微生物	普				○			○		発病前～発病	散布
ダブルアタック	ピレスロイド系＋EBI	普		○			○		○		収穫前日まで	散布
ダントツ水溶剤	ネオニコチノイド系	普	○				○				収穫3日前ま	散布
ダントツ水溶剤	ネオニコチノイド系	普		○	○		○	○			収穫前日まで	散布
ダントツ粒剤	ネオニコチノイド系	普	○	○	○		○				定植時	植穴処理土壌混和
ダントツ粒剤	ネオニコチノイド系	普	○	○			○				収穫前日まで	生育期株元散布
チェス水和剤	その他	普		○			○	○			収穫前日まで	散布
チェス水和剤	その他	普			○		○				収穫3日前ま	散布
チェス粒剤	その他	普		○			○				定植時	植穴処理
チェス粒剤	その他	普		○	○		○	○			育苗期後半	株元散布
チェス顆粒水和剤	その他	普		○			○	○			収穫前日まで	散布
チェス顆粒水和剤	その他	普			○		○				収穫3日前ま	散布
テーク水和剤	EBI＋保護剤(EBDC)	普	○						○	○	収穫30日前ま	散布
テーク水和剤	EBI＋保護剤(EBDC)	普		○					○	○	収穫前日まで	散布
テーク水和剤	EBI＋保護剤(EBDC)	普			○				○		収穫7日前ま	散布
デランK	保護剤(ジチアノン)＋無機銅	劇		○					○	○	収穫前日まで	散布
テルスターフロアブル	ピレスロイド系	劇		○			○				収穫前日まで	散布
テルスター水和剤	ピレスロイド系	普		○	○		○	○			収穫前日まで	散布
ドイツボルドーA	無機銅	普				○				○	－	散布
ドーシャスフロアブル	シアノイミダゾール系＋有機塩素系	普		○					○	○	収穫前日まで	散布
ドキリンフロアブル	有機銅	普		○						○	収穫前日まで	散布
トップジンM水和剤	ベンゾイミダゾール系	普		○					○		収穫前日まで	散布
トップジンM粉剤	ベンゾイミダゾール系	普	○						○		収穫前日まで	散布
トモノールS	その他	普		○					○		－	散布
トリフミンジェット	EBI	普		○	○				○		収穫前日まで	くん煙
トリフミン水和剤	EBI	普	○	○	○				○		収穫前日まで	散布
トリフミン乳剤	EBI	普		○					○		収穫前日まで	散布
トレボンEW	ピレスロイド系	普		○			○	○			収穫前日まで	散布
トレボンEW	ピレスロイド系	普			○		○				収穫3日前ま	散布
トレボンMC	ピレスロイド系	普		○			○				収穫前日まで	散布
トレボン乳剤	ピレスロイド系	普	○	○			○	○			収穫前日まで	散布
トレボン乳剤	ピレスロイド系	普			○		○	○			収穫3日前ま	散布
ハーベストオイル	その他	普		○					○		－	散布
ハーモイト水溶剤	炭酸水素塩	普				○			○		収穫前日まで	散布
バイデートL粒剤	カーバメート系	劇		○			○				定植前	全面土壌混和
バイデートL粒剤	カーバメート系	劇		○	○		○				育苗期	株元処理
ハチハチフロアブル	その他	劇			○		○		○		収穫前日まで	散布
ハチハチ乳剤	その他	劇		○	○		○	○	○	○	収穫前日まで	散布
ハツバ乳剤	－	普	○	○					○		－	散布
バリアード顆粒水和剤	ネオニコチノイド系	劇		○	○		○				収穫前日まで	散布

パンチョTFジェット	アミドキシム系+EBI	劇		○					○	収穫前日まで	くん煙	
パンチョTF顆粒水和剤	アミドキシム系+EBI	普	○	○	○				○	収穫前日まで	散布	
パンチョ顆粒水和剤	アミドキシム系	普		○	○				○	収穫前日まで	散布	
ビティグラン水和剤	無機銅	普		○					○	-	散布	
ピラニカEW	殺ダニ剤	劇		○			○			収穫前日まで	散布	
ビリーブ水和剤	ピレスロイド系+IGR	劇			○		○			収穫7日前ま	散布	
ビルク水和剤	殺ダニ剤+ピレスロイド系	劇			○		○			収穫前日まで	散布	
ファンベル顆粒水和剤	保護剤(イミノクタジン)+その他	普		○					○	収穫前日まで	散布	
フェスティバルC水和剤	桂皮酸系+無機銅	普	○						○	収穫3日前ま	散布	
フェスティバルC水和剤	桂皮酸系+無機銅	普		○					○	収穫前日まで	散布	
フェスティバルM水和剤	桂皮酸系+保護剤(EBDC)	普		○					○	収穫前日まで	散布	
フェスティバル水和剤	桂皮酸系	普		○					○	収穫前日まで	散布	
フォリオゴールド	フェニルアמיד系+有機塩素系	普	○						○	収穫7日前ま	散布	
フォリオゴールド	フェニルアמיד系+有機塩素系	普		○					○	○	収穫前日まで	散布
プラタンフロアブル	ジカルボキシイミド系+有機塩素系	普		○					○	○	収穫前日まで	散布
ブリザード水和剤	シアノアセトアミド系+有機塩素系	普		○					○	○	収穫前日まで	散布
フリントフロアブル25	ストロビルリン系	普		○					○	○	収穫前日まで	散布
フルピカくん煙剤	アニリノピリミジン系	劇		○					○	○	収穫前日まで	くん煙(通常10～15時間)
フルピカフロアブル	アニリノピリミジン系	普	○	○					○	○	収穫前日まで	散布
フルピカフロアブル	アニリノピリミジン系	普							○	○	収穫前日まで	散布
プロポーズ顆粒水和剤	カーバメート系+有機塩素系	普	○						○	○	収穫7日前ま	散布
プロポーズ顆粒水和剤	カーバメート系+有機塩素系	普		○					○	○	収穫前日まで	散布
ベジターボDF	抗生物質	普		○					○	○	収穫前日まで	散布
ベストガード水溶剤	ネオニコチノイド系	普		○			○	○		○	収穫前日まで	散布
ベストガード水溶剤	ネオニコチノイド系	普			○		○	○		○	収穫7日前ま	散布
ベストガード粒剤	ネオニコチノイド系	普		○	○		○	○		○	育苗期	株元処理
ベストガード粒剤	ネオニコチノイド系	普		○	○		○	○		○	定植時	植穴処理土壌混和
ベトファイター顆粒水和剤	シアノアセトアミド系	普		○					○	○	収穫前日まで	散布
ベニドー水和剤	無機銅	普		○					○	○	-	散布
ベネセット水和剤	カーバメート系+保護剤(EBDC)	普		○					○	○	収穫前日まで	散布
ベフドー水和剤	保護剤(イミノクタジン)+無機銅	普	○						○	○	収穫7日前ま	散布
ベフドー水和剤	保護剤(イミノクタジン)+無機銅	普		○					○	○	収穫前日まで	散布
ベルクートフロアブル	保護剤(イミノクタジン)	普		○	○				○	○	収穫前日まで	散布
ベルクート水和剤	保護剤(イミノクタジン)	普	○						○	○	収穫7日前ま	散布
ベルクート水和剤	保護剤(イミノクタジン)	普		○	○				○	○	収穫前日まで	散布
ベルクローブ水和剤	ジカルボキシイミド系+保護剤(イミノクタジン)	普		○					○	○	収穫前日まで	散布
ベンコゼブフロアブル	保護剤(EBDC)	普		○					○	○	収穫前日まで	散布
ベンコゼブ水和剤	保護剤(EBDC)	普	○						○	○	収穫30日前ま	散布
ボタニガードES	天敵微生物	普				○	○	○		○	発生初期	散布
ボトキラー水和剤	微生物	普				○			○	○	発病前～発病	ダク内投入
ボトキラー水和剤	微生物	普				○			○	○	発病前～発病	散布
ホライズンドライフロアブル	シアノアセトアミド系+イミダゾリン系	普		○					○	○	収穫前日まで	散布
ポリオキシシンAL水溶剤	抗生物質	普	○						○	○	収穫7日前ま	散布
ポリオキシシンAL水溶剤	抗生物質	普		○					○	○	収穫前日まで	散布
ポリオキシシンAL水溶剤	抗生物質	普			○				○	○	収穫3日前ま	散布
ポリオキシシンAL水和剤	抗生物質	普		○					○	○	収穫前日まで	散布
ポリオキシシンAL乳剤	抗生物質	普		○					○	○	収穫前日まで	散布
ポリキャプタン水和剤	保護剤(キャプタン)+抗生物質	普		○					○	○	収穫前日まで	散布
ポリベリン水和剤	保護剤(イミノクタジン)+抗生物質	普	○						○	○	収穫7日前ま	散布
ポリベリン水和剤	保護剤(イミノクタジン)+抗生物質	普		○	○				○	○	収穫前日まで	散布
ボルドー	無機銅	普				○			○	○	-	散布
ホホワイトブロック	有機塩素系	普	○						○	○	収穫7日前ま	散布
ホホワイトブロック	有機塩素系	普		○					○	○	収穫前日まで	散布
マイコタール	天敵微生物	普				○		○		○	発生初期	散布
マッチ乳剤	IGR	普		○				○		○	収穫前日まで	散布
マネージDF	EBI	普			○				○	○	収穫前日まで	散布
マネージM水和剤	EBI+保護剤(EBDC)	普			○				○	○	収穫7日前ま	散布
マネージ水和剤	EBI	普			○				○	○	収穫前日まで	散布
マブリックジェット	ピレスロイド系	劇		○			○			○	収穫前日まで	くん煙
マブリックジェット	ピレスロイド系	劇			○		○			○	収穫前日まで	くん煙

マブリック水和剤20	ピレスロイド系	劇	○				○			収穫21日前ま	散布	
マブリック水和剤20	ピレスロイド系	劇		○			○			収穫前日まで	散布	
マブリック水和剤20	ピレスロイド系	劇		○				○		収穫前日まで	散布	
マブリック水和剤20	ピレスロイド系	劇			○		○			収穫3日前ま	散布	
マモロット顆粒水和剤	カーバメート系	普		○					○	収穫前日まで	散布	
マラソン乳剤	有機リン系	普	○	○	○		○			収穫前日まで	散布	
マラソン粉剤1.5	有機リン系	普	○	○	○		○			収穫前日まで	散布	
マラソン粉剤3	有機リン系	普	○	○	○		○			収穫前日まで	散布	
マラバッサ乳剤	有機リン系＋カーバメート系	劇		○	○		○			収穫前日まで	散布	
モスピランワン粒剤	ネオニコチノイド系	普	○	○			○	○		定植後 但し、	株元散布	
モスピランワン粒剤	ネオニコチノイド系	普			○		○			定植後 但し、	株元散布	
モスピラン液剤	ネオニコチノイド系	普		○			○			収穫前日まで	散布	
モスピラン水溶剤	ネオニコチノイド系	劇	○	○			○	○		収穫前日まで	散布	
モスピラン水溶剤	ネオニコチノイド系	劇			○		○	○		収穫3日前ま	散布	
モスピラン粒剤	ネオニコチノイド系	普	○		○		○			播種時、定植時	播溝混和、植穴混和	
モスピラン粒剤	ネオニコチノイド系	普		○			○			定植時、収穫30日前まで	株元散布、定植後株元散布	
モスピラン顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	劇	○	○			○	○		収穫前日まで	散布	
モスピラン顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	劇			○		○	○		収穫3日前ま	散布	
モベントフロアブル	脂質生合成阻害剤	普		○	○		○	○		収穫前日まで	育苗期株元灌注、散布	
モレスタン水和剤	キノキサリン系	普	○		○			○		収穫3日前ま	散布	
モレスタン水和剤	キノキサリン系	普		○				○	○	収穫前日まで	散布、くん煙、常温煙霧	
ヨネボン	有機銅	普		○				○	○	収穫前日まで	散布	
ヨネボン水和剤	有機銅	普		○				○	○	収穫前日まで	散布	
ライメイフロアブル	シアノイミダゾール系	普		○					○	収穫前日まで	散布	
ラリー水和剤	EBI	普	○	○	○				○	収穫前日まで	散布	
ランマンフロアブル	シアノイミダゾール系	普	○	○					○	収穫前日まで	散布	
リドミルMZ水和剤	保護剤(EBDC)＋フェニルアמיד系	普		○					○	収穫前日まで	散布	
リドミルゴールドMZ	保護剤(EBDC)＋フェニルアמיד系	普	○	○					○	収穫30日前ま	散布	
リドミル銅水和剤	無機銅＋フェニルアמיד系	普		○					○	収穫前日まで	散布	
ルビゲン水和剤	EBI	普	○		○				○	収穫3日前ま	散布	
ルビゲン水和剤	EBI	普		○					○	収穫前日まで	散布	
ルビトックス乳剤	有機リン系	劇		○	○		○			収穫7日前ま	散布	
レイデン水和剤	その他＋有機リン系	普		○					○	収穫前日まで	散布	
ロディー乳剤	ピレスロイド系	劇	○				○			収穫3日前ま	散布	
ロディー乳剤	ピレスロイド系	劇		○	○		○	○		収穫前日まで	散布	
ワイドヒッター顆粒水和剤	カーバメート系＋有機塩素系	普	○						○	収穫7日前ま	散布	
ワイドヒッター顆粒水和剤	カーバメート系＋有機塩素系	普		○					○	○	収穫前日まで	散布
粘着くん液剤	天然物由来	普				○	○	○	○	収穫前日まで	散布	
硫黄粉剤50	無機硫黄系	普				○			○	－	散布	
硫黄粒剤	無機硫黄系	普	○	○	○				○	－	専用の電気加熱式くん煙器でくん煙す	

備考：選択の目安となるように適用作物と適用病害虫を中心に編集した。実際に使用にあたっては、農薬ラベルをよく読んで

※正しくご使用願います。