

表1 オオタバコガ防除薬剤一覧

薬剤	成分系	成分	キヤベツ	はくさい	レタス	ブロッコリ	使用時期	使用方法	本剤 使用回数
アクセルキングフロアブル	その他 その他	トルフェンピラド メタフルミゾン	○				収穫14日前まで	散布	2回以内
アクセルフロアブル	その他	メタフルミゾン	○				収穫前日まで	散布	3回以内
アニキ乳剤	その他	レピメクチン	○	○	○		収穫3日前まで	散布	3回以内
アフームエクセラ顆粒水和剤	その他 I G R	エマメクチン安息香酸塩 ルフェヌロン		○	○		収穫7日前まで	散布	3回以内
アフーム乳剤	その他	エマメクチン安息香酸塩			○	○	収穫3日前まで	散布	3回以内
オルトラン水和剤	有機リン系	アセフェート			○		収穫14日前まで	散布	3回以内
ガードナーフロアブル	ネオニコチノイド系 その他	イミダクロプリド スピノサド			○		定植当日	灌注	1回
カスケード乳剤	I G R	フルフェノクスロン			○		収穫3日前まで	散布	3回以内
キックオフ顆粒水和剤	ジアミド系 ネオニコチノイド系	クロラントラニリプロール ジノテフラン			○		定植前日～定植時	灌注	1回
コテツフロアブル	その他	クロルフェナピル	○		○		収穫前日まで	散布	2回以内
ジェイエース水溶剤	有機リン系	アセフェート			○		収穫14日前まで	散布	3回以内
ジュリボフロアブル	ジアミド系 ネオニコチノイド系	クロラントラニリプロール チアメトキサム			○		育苗期後半～定植当日	灌注	1回
スピノエース顆粒水和剤	その他	スピノサド			○		収穫3日前まで	散布	3回以内
スミフェート水溶剤	有機リン系	アセフェート			○		収穫14日前まで	散布	3回以内
セルオーフロアブル	ネオニコチノイド系 ジアミド系	イミダクロプリド フルベンジアミド			○		定植3日前～定植時	灌注	1回
ディアナSC	その他	スピネトラム	○		○		収穫前日まで	散布	2回以内
トルネードエースDF	その他	インドキサカルブ			○		収穫7日前まで	散布	2回以内
トルネードフロアブル	その他	インドキサカルブMP			○		収穫7日前まで	散布	2回以内
ハクサップ水和剤	ピレスロイド系 有機リン系	フェンバレレート マラソン			○		収穫3日前まで	散布	2回以内
ハクサップ水和剤	ピレスロイド系 有機リン系	フェンバレレート マラソン	○	○			収穫前日まで	散布	5回以内
ファルコンエースフロアブル	その他 I G R	スピノサド メトキシフェノジド			○		収穫3日前まで	散布	2回以内
ファルコンフロアブル	I G R	メトキシフェノジド	○		○		収穫3日前まで	散布	2回以内
フェニックス顆粒水和剤	ジアミド系	フルベンジアミド	○	○	○		収穫前日まで	散布	2回以内
プリンスフロアブル	その他	フィプロニル	○	○			収穫14日前まで	散布	2回以内
プリンスフロアブル	その他	フィプロニル		○			収穫21日前まで	散布	2回以内
プレオフロアブル	その他	ピリダリル	○	○	○		収穫7日前まで	散布	2回以内
プレバソンフロアブル5	ジアミド系	クロラントラニリプロール	○		○		収穫前日まで	散布	3回以内
プレバソン粒剤	ジアミド系	クロラントラニリプロール			○		育苗期後半～定植時	株元散布	1回
ボタニガードES	天敵微生物	ボーベリア バシアーナ			○		発生初期	散布	-
ボリアムガンダム顆粒水和剤	その他 ジアミド系	エマメクチン安息香酸塩 クロラントラニリプロール			○		収穫3日前まで	散布	3回以内
マッチ乳剤	I G R	ルフェヌロン			○		収穫3日前まで	散布	3回以内
マトリックフロアブル	I G R	クロマフェノジド			○		収穫7日前まで	散布	3回以内
モスピラン粒剤	ネオニコチノイド系	アセタミプリド			○		定植前日～定植当日	株元散布	1回
ラービフロアブル	カーバメート系	チオジカルブ			○		収穫14日前まで	散布	2回以内
ランネート45DF	カーバメート系	メソミル			○		収穫7日前まで	散布	2回以内

※登録内容の概要を示したので、実際の使用に当たっては農薬ラベルを十分に確認した上で、正しくご使用願いたい。