

表2 ハスモンヨトウ防除薬剤一覧

薬剤	成分系	成分	キヤベツ	はくさい	だいこん	レタス	ブロッコリー	使用時期	使用方法	本剤 使用回数	
アクセルキングフロアブル	その他 その他	トルフェンピラド メタフルミゾン	○					収穫14日前まで	散布	2回以内	
アクセルフロアブル	その他	メタフルミゾン	○	○				収穫前日まで	散布	3回以内	
アクセルベイト	その他	メタフルミゾン	○	○				収穫7日前まで	株元散布	3回以内	
アグロスリン水和剤	ピレスロイド系	シペルメトリン		○				収穫前日まで	散布	5回以内	
アタブロン乳剤	I GR	クロルフルアズロン	○	○	○	○		収穫14日前まで	散布	3回以内	
アニキ乳剤	その他	レピメクチン	○	○		○	○	収穫3日前まで	散布	3回以内	
アフームエクセラ顆粒水和剤	その他 I GR	エマメクチン安息香酸塩 ルフェヌロン	○	○			○	収穫7日前まで	散布	3回以内	
アフーム乳剤	その他	エマメクチン安息香酸塩	○			○		収穫3日前まで	散布	3回以内	
アルバリン顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	ジノテフラン				○		定植前日 ～定植時	灌注	1回	
エルサン乳剤	有機リン系	P A P	○	○	○	○	○	収穫21日前まで	散布	2回以内	
オルトラン水和剤	有機リン系	アセフェート	○					収穫7日前まで	散布	3回以内	
				○				収穫14日前まで	散布	3回以内	
ガードナーフロアブル	ネオニコチノイド系 その他	イミダクロプリド スピノサド	○					定植当日	灌注	1回	
カウンター乳剤	I GR	ノバルロン	○					収穫7日前まで	散布	3回以内	
カスケード乳剤	I GR	フルフェノクスロン					○	収穫7日前まで	散布	2回以内	
			○					収穫14日前まで	散布	2回以内	
						○		収穫3日前まで	散布	3回以内	
ガンバ水和剤	その他	ジアフェンチウロン	○				収穫21日前まで	散布	2回以内		
キックオフ顆粒水和剤	ジアミド系 ネオニコチノイド系	クロラントラニプロロール ジノテフラン	○			○	○	定植前日 ～定植時	灌注	1回	
コテツフロアブル	その他	クロルフェナピル					○	収穫7日前まで	散布	2回以内	
			○			○		収穫前日まで	散布	2回以内	
ジェイエース水溶剤	有機リン系	アセフェート		○		○		収穫14日前まで	散布	3回以内	
			○					収穫7日前まで	散布	3回以内	
ジャックポット顆粒水和剤	B. T	バチルス チューリンゲン シス菌の生芽胞 及び産生結晶毒素	○					発生初期 但し、 収穫前日まで	散布	-	
ジュリボフロアブル	ジアミド系 ネオニコチノイド系	クロラントラニプロロール チアメトキサム	○	○		○	○	育苗期後半 ～定植当日	灌注	1回	
スタークル顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	ジノテフラン				○		定植前日 ～定植時	灌注	1回	
スミフェート水溶剤	有機リン系	アセフェート		○		○		収穫14日前まで	散布	3回以内	
			○					収穫7日前まで	散布	3回以内	
セルオーフロアブル	ネオニコチノイド系 ジアミド系	イミダクロプリド フルベンジアミド	○	○		○	○	定植3日前 ～定植時	灌注	1回	
チーフメイト乳剤	ピレスロイド系 有機リン系	フルシトリネート P A P	○					収穫14日前まで	散布	2回以内	
チューレックス顆粒水和剤	B. T	バチルス チューリンゲン シス菌の生芽胞及び 産生結晶毒素	○					発生初期 但し、 収穫前日まで	散布	-	
ディアナSC	その他	スピネトラム	○			○		収穫前日まで	散布	2回以内	
デナボン5%ベイト	カーバメート系	N A C						収穫14日前まで	株元散布	3回以内	
			○	○				収穫21日前まで	株元散布	3回以内	
トクチオン乳剤	有機リン系	プロチオホス	○					収穫21日前まで	散布	2回以内	
トルネードエースDF	その他	インドキサカルブ	○			○		収穫7日前まで	散布	2回以内	
トルネードフロアブル	その他	インドキサカルブMP	○			○		収穫7日前まで	散布	2回以内	
ノーモルト乳剤	I GR	テフルベンズロン						収穫7日前まで	散布	2回以内	
						○		収穫3日前まで	散布	2回以内	
ハクサップ水和剤	ピレスロイド系 有機リン系	フェンバレレート マラソン			○			収穫35日前まで	散布	3回以内	
			○	○				収穫前日まで	散布	5回以内	
ハスモン天敵	微生物	ハスモンヨトウ核多角体病 ウイルス	○			○		発生初期	散布	-	
ファルコンエースフロアブル	その他 I GR	スピノサド メトキシフェノジド	○					収穫7日前まで	散布	2回以内	
						○		収穫3日前まで	散布	2回以内	
ファルコンフロアブル	I GR	メトキシフェノジド				○	○	収穫3日前まで	散布	2回以内	
			○					収穫7日前まで	散布	2回以内	
フェニックス顆粒水和剤	ジアミド系	フルベンジアミド				○	○	収穫前日まで	散布	2回以内	
			○	○				収穫前日まで	散布	3回以内	
プレオフロアブル	その他	ピリダリル	○			○	○	収穫7日前まで	散布	2回以内	
プレバソンフロアブル5	ジアミド系	クロラントラニプロロール	○				○	○	育苗期後半 ～定植当日	灌注	1回
			○	○			○		収穫前日まで	散布	3回以内
						○		収穫3日前まで	散布	3回以内	
ポリアムガンダム顆粒水和剤	その他 ジアミド系	エマメクチン安息香酸塩 クロラントラニプロロール	○					収穫7日前まで	散布	3回以内	
マッチ乳剤	I GR	ルフェヌロン	○				○	収穫7日前まで	散布	3回以内	
マトリックフロアブル	I GR	クロマフェノジド					○	収穫7日前まで	散布	3回以内	
			○					収穫7日前まで	散布	4回以内	
マブリック水和剤20	ピレスロイド系	フルバリネート	○		○			収穫14日前まで	散布	2回以内	
マイクロデナボン水和剤85	カーバメート系	N A C	○	○				収穫14日前まで	散布	3回以内	
モスピラン粒剤	ネオニコチノイド系	アセタミプリド	○					定植前日 ～定植当日	株元散布	1回	
ラービフロアブル	カーバメート系	チオジカルブ						収穫14日前まで	散布	2回以内	
			○	○				収穫7日前まで	散布	2回以内	
					○			収穫21日前まで	散布	2回以内	
ラービン水和剤75	カーバメート系	チオジカルブ						収穫7日前まで	散布	4回以内	
			○					収穫7日前まで	散布	2回以内	
ランネット45DF	カーバメート系	メソミル	○					収穫3日前まで	散布	3回以内	
ランネット微粒剤F	カーバメート系	メソミル	○	○				収穫7日前まで	散布	3回以内	
レルダン乳剤25	有機リン系	クロルピリホスメチル	○					収穫7日前まで	散布	4回以内	

※登録内容の概要を示したので、実際の使用に当たっては農薬ラベルを十分に確認した上で、正しくご使用願いたい。