

表4 根こぶ病防除薬剤一覧

薬剤	成分系	成分	キヤベツ	はくさい	だいこん	ブロッコリー	使用時期	使用方法	本剤 使用回数
カルメート55	—	石灰窒素	○	○			播種前又は植付前	散布後土壌混和	1回
石灰窒素50	—	石灰窒素	○	○			播種前又は植付前	散布後土壌混和	1回
石灰窒素55	—	石灰窒素	○	○			播種前又は植付前	散布後土壌混和	1回
粒状石灰窒素40	—	石灰窒素		○			播種前又は植付前	散布後土壌混和	1回
粒状石灰窒素55	—	石灰窒素	○	○			播種前又は植付前	散布後土壌混和	1回
オラクル粉剤	シアノイミダゾール系	アミスルブロム		○			播種前又は定植前	全面土壌混和	1回
						○	定植前	全面土壌混和	1回
			○				播種前(苗床)	全面土壌混和	2回以内 ※
			○	○			定植前	作条土壌混和	1回
オラクル顆粒水和剤	シアノイミダゾール系	アミスルブロム	○	○		○	定植前まで	灌注	1回
			○	○		○	定植前	全面散布後土壌混和	1回
ザ・つまごい	土壌殺菌(フルスルフアミド)	フルスルフアミド	○				播種又は定植前	全面土壌混和	2回以内
ダコソイル	有機塩素系	TPN	○				播種又は定植前	作条及び全面施用土壌混和	1回
				○			播種又は定植前	全面施用土壌混和	1回
			○	○			播種又は定植前	植穴処理土壌混和	1回
				○			播種又は定植前	作条施用土壌混和	1回
ダコニール1000	有機塩素系	TPN				○	定植時	土壌灌注	1回
ネビジンSC	土壌殺菌(フルスルフアミド)	フルスルフアミド	○				播種又は定植前	全面散布後土壌混和	2回以内
				○			播種又は定植前	全面散布後土壌混和	1回
ネビジン粉剤	土壌殺菌(フルスルフアミド)	フルスルフアミド		○		○	播種又は定植前	全面土壌混和	1回
			○				播種又は定植前	全面土壌混和	2回以内
			○				播種又は定植前	作条土壌混和	2回以内
					○		播種前	全面土壌混和	1回
				○		○	播種又は定植前	作条土壌混和	1回
ネビジン顆粒水和剤	土壌殺菌(フルスルフアミド)	フルスルフアミド	○	○			播種又は定植前	全面散布後土壌混和	2回以内
ネビモン粉剤	土壌殺菌(フルスルフアミド)	フルスルフアミド	○				定植前	全面土壌混和	2回以内
	ベンズアニリド系	フルトラニル							
ネビリュウ	土壌殺菌(フルスルフアミド)	フルスルフアミド	○	○		○	定植前	全面土壌混和	1回
フィールドキーパー水和剤	天敵微生物	バリオボラックス パラドクス	○	○			播種直後及び定植前日～当日	灌注	2回
			○	○			播種直後	灌注	1回
				○			播種直後及び定植前日～当日	灌注	2回
フロンサイドSC	保護剤(フルアジナム)	フルアジナム		○		○	定植前	全面散布後土壌混和	1回
			○				播種又は定植前	全面散布後土壌混和	2回以内 ※
フロンサイド粉剤	保護剤(フルアジナム)	フルアジナム		○		○	播種又は定植前	作条土壌混和	1回
				○		○	播種又は定植前	全面土壌混和	1回
			○				播種又は定植前	全面土壌混和	2回以内 ※
			○				播種又は定植前	作条土壌混和	2回以内 ※
ランマンフロアブル	シアノイミダゾール系	シアゾファミド	○	○		○	定植前日～当日	灌注	1回
				○			定植時	灌注	1回

※登録内容の概要を示したので、実際の使用に当たっては農薬ラベルを十分に確認した上で、正しくご使用願いたい。