

トマトに登録のある主要病害虫防除剤一覧

薬 剤	種類名 (有効成分名＋剤型)	成分系	適用病害虫*													使用時期	使用方法	本剤 使用回数
			うどんこ病	疫病	菌核病	すすかび病	灰色かび病	葉かび病	アザミウマ類	アブラムシ類	コナジラミ類	トマトサビダニ	ハダニ類	ハモグリバエ類	チョウ目害虫			
アーデント水和剤	アクリナリン水和剤	ビレスロイド系														収穫前日まで	散布	3回以内
アーリーセーフ	脂肪酸グリセリド乳剤	脂肪酸	○										○			収穫前日まで	散布	－
アカリタッチ乳剤	プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル乳剤	その他	○										○			収穫前日まで	散布	－
アクタラ粒剤5	チアトキシム粒剤	ネオニコチノイド系										○		○		定植時	植穴処理	1回
アクタラ顆粒水溶剤	チアトキシム水溶剤	ネオニコチノイド系										○				収穫前日まで	散布	3回以内
アグロケア水和剤	バチルス スプラチリス水和剤	微生物	○					○	○							収穫前日まで	散布	－
アグロスリン水和剤	シベルトリン水和剤	ビレスロイド系								○	○					収穫前日まで	散布	5回以内
アグロスリン乳剤	シベルトリン乳剤	ビレスロイド系								○	○					収穫前日まで	散布	5回以内
アザミバスター水和剤	アクリナリン水和剤	ビレスロイド系								○					○	収穫前日まで	散布	3回以内
アタブロン乳剤	クロルフルアズロン乳剤	IGR									○				○	収穫前日まで	散布	3回以内
アディオン乳剤	ベルトリン乳剤	ビレスロイド系									○	○				収穫前日まで	散布	3回以内
アドマイヤー1粒剤	イタダクロブリド粒剤	ネオニコチノイド系									○	○				定植時	植穴土壌混和	1回
アドマイヤーフロアブル	イタダクロブリド水和剤	ネオニコチノイド系									○	○				収穫前日まで	散布	2回以内
アドマイヤー水和剤	イタダクロブリド水和剤	ネオニコチノイド系									○	○				収穫前日まで	散布	2回以内
アドマイヤー顆粒水和剤	イタダクロブリド水和剤	ネオニコチノイド系									○	○				収穫前日まで	散布	2回以内
アニキ乳剤	レピメクチン乳剤	その他								○		○		○	○	収穫前日まで	散布	3回以内
アフームエクセラ顆粒水和剤	エマクチン安息香酸塩・ルフェスロン水和剤	その他 IGR												○	○	収穫前日まで	散布	2回以内
アフーム乳剤	エマクチン安息香酸塩乳剤	その他												○	○	収穫前日まで	散布	5回以内
アフエートフロアブル	ベンチオビラト水和剤	アニライト系	○		○	○	○	○								収穫前日まで	散布	3回以内
アブロードエースフロアブル	フェンピロキシメート・ブプロフェジン水和剤	殺ダニ剤 IGR										○	○			収穫前日まで	散布	3回以内
アブロード水和剤	ブプロフェジン水和剤	IGR										○				収穫前日まで	散布	3回以内
アミスター20フロアブル	アゾキシストロビン水和剤	ストロビルリン系						○	○							収穫前日まで	散布	4回以内
アミスターオブティフロアブル	アゾキシストロビン・TPN水和剤	ストロビルリン系 有機塩素系		○		○	○	○								収穫前日まで	散布	4回以内
あめんこ	還元澱粉糖化物液剤	その他	○								○	○		○		収穫前日まで	散布	－
あめんこ100	還元澱粉糖化物液剤	その他	○								○	○		○		収穫前日まで	散布	－
アルバリン粒剤	ジノテフラン粒剤	ネオニコチノイド系									○	○		○		育苗期	株元散布	1回
アルバリン顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	ネオニコチノイド系										○				収穫前日まで	散布	2回以内
アントム顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	ネオニコチノイド系										○				収穫前日まで	散布	2回以内
イオウフロアブル	水和硫黄剤	無機硫黄系	○										○			－	散布	－
イデクリーン水和剤	硫黄・銅水和剤	無機硫黄系 無機銅	○	○		○		○								－	散布	－
インプレッション水和剤	バチルス スプラチリス水和剤	微生物	○					○	○							発病前から発病初期まで	散布	－
ウイスベクト水和剤5	フルジオキソニル水和剤	フェニルピロール系						○	○							播種前	種子粉衣	1回
ウララDF	フロニカド水和剤	－							○	○	○					収穫前日まで	散布	3回以内
エコショット	バチルス スプラチリス水和剤	微生物														収穫前日まで	散布	－
エコビタ液剤	還元澱粉糖化物液剤	その他	○								○	○		○		収穫前日まで	散布	－
エコマスターBT	BT水和剤	B.T													○	発生初期 但し、収穫前日まで	散布	－
エスマルクDF	BT水和剤	B.T														発生初期 但し、収穫前日まで	散布	－
エトフィンフロアブル	エタボキシム水和剤	その他		○												収穫前日まで	散布	4回以内
園芸ボルドー	硫黄・銅水和剤	無機硫黄系 無機銅	○	○		○	○									－	散布	－
オーソサイド水和剤80	キャブタン水和剤	保護剤(キャブタン)		○				○	○							収穫前日まで	散布	5回以内
オキシラン水和剤	キャブタン・有機銅水和剤	保護剤(キャブタン) 有機銅		○					○							1番花の開花前まで	散布	5回以内
オサダンフロアブル	酸化フェンブタスズ水和剤	殺ダニ剤											○	○		収穫前日まで	散布	1回
オルトランDX粒剤	アセフェート・クロチアニジン粒剤	有機リン系 ネオニコチノイド系									○					定植時	植穴処理土壌混和	1回
オルトラン水和剤	アセフェート水和剤	有機リン系									○				○	収穫前日まで	散布	3回以内
オルトラン粒剤	アセフェート粒剤	有機リン系									○	○				定植時及び 収穫前日まで	植穴散布、 生育期株元散布	3回以内
カーゼートPZ水和剤	シモキシニル・マンゼブ水和剤	シアアセトアミド系 保護剤(EBDC)		○												収穫前日まで	散布	2回以内
カウンター乳剤	ノバルロン乳剤	IGR								○		○		○	○	1番花の開花まで	散布	4回以内
カスケード乳剤	フルフェノクスロン乳剤	IGR								○				○	○	収穫前日まで	散布	4回以内
カスミンボルドー	カスガマイシン・銅水和剤	抗生物質 無機銅		○					○							収穫前日まで	散布	5回以内
カッパーシン水和剤	カスガマイシン・銅水和剤	抗生物質 無機銅		○					○							収穫前日まで	散布	5回以内
カリグリーン	炭酸水素ナウム水溶剤	炭酸水素塩	○					○	○							収穫前日まで	散布	－
カンタスドライフロアブル	ボスカリド水和剤	アニライト系			○			○	○							収穫前日まで	散布	3回以内
カンパネラ水和剤	ベンチアハリカルブ・イソプロピル・マンゼブ水和剤	カーバメート系 保護剤(EBDC)		○												収穫前日まで	散布	2回以内
キャブレート水和剤	キャブタン・ベニル水和剤	保護剤(キャブタン) ベンゾイミダゾール系						○	○							収穫前日まで	散布	3回以内
キュープロフィックス40	銅水和剤	無機銅		○												－	散布	－
クオークフロアブル	BT水和剤	B.T													○	発生初期 但し、収穫前日まで	散布	－
クブラビットホルテ	銅水和剤	無機銅		○													散布	－
クムラス	水和硫黄剤	無機硫黄系	○										○			－	散布	－
クリアオール水和剤	アクリナリン・スピロメシフェン水和剤	ビレスロイド系 殺ダニ剤								○		○	○		○	収穫前日まで	散布	2回以内
クリアザールフロアブル	スピロメシフェン水和剤	殺ダニ剤										○				収穫前日まで	散布	2回以内
グリーンカップ	銅・バチルス スプラチリス水和剤	無機銅 微生物	○	○				○	○							収穫前日まで	散布	－
グリーンサポート	バチルス スプラチリス・ボリオキシン水和剤	微生物 抗生物質	○					○	○							収穫前日まで	散布	3回以内
ゲッター水和剤	ジエトフェンカルブ・チオファネートメチル水和剤	N-フェニルカーバメート系 ベンゾイミダゾール系			○			○	○							収穫前日まで	散布	5回以内
ケミヘル	銅・バチルス スプラチリス水和剤	無機銅 微生物	○	○				○	○							収穫前日まで	散布	－
コサイド3000	銅水和剤	無機銅		○												－	散布	－
コサイドDF	銅水和剤	無機銅		○												－	散布	－
コサイドボルドー	銅水和剤	無機銅		○												－	散布	－
コデツフロアブル	クロルフェニル水和剤	その他																

スミチオン乳剤	MEP乳剤	有機リン系									○						収穫開始14日前まで	散布	2回以内
スミフェート水溶剤	アセフェート水溶剤	有機リン系									○				○	○	収穫前日まで	散布	3回以内
スミフェート粒剤	アセフェート粒剤	有機リン系									○	○					定植時及び生育期 但し、収穫前日まで	植穴散布、 生育期株元散布	3回以内
スミブレンド水和剤	ジエトフェンカルブ・プロシミドン水和剤	N-フェニルカーバメート系 ジカルボキシイミド系						○									収穫前日まで	散布	3回以内
スミレックスくん煙顆粒	プロシミドンくん煙剤	ジカルボキシイミド系						○									収穫前日まで	くん煙	3回以内
スミレックス水和剤	プロシミドン水和剤	ジカルボキシイミド系						○									収穫前日まで	散布	3回以内
スミロディー乳剤	フェンプロパトリン・MEP乳剤	ピレスロイド系 有機リン系										○					収穫開始14日前まで	散布	2回以内
セイビアーフロアブル20	フルジオクソニル水和剤	フェニルピロール系						○									収穫前日まで	散布	3回以内
Zボルドー	銅水和剤	無機銅		○			○										-	散布	-
セレナーデ水和剤	バチルス スプラチリス水和剤	微生物	○					○	○								発病前から発病初期まで	散布	-
ダイアメリットDF	イミノタジナルヘシル酸塩・ホリオキシシン水和剤	保護剤(イミノタジン) 抗生物質	○		○		○	○	○								収穫前日まで	散布	3回以内
ダイナモ顆粒水和剤	アミスルフロム・シモキサニル水和剤	シアノイミダゾール系 シアノアセトアミド系		○				○	○								収穫前日まで	散布	3回以内
ダイマジン	イミノタジナルヘシル酸塩・フェンヘキサミド水和剤	保護剤(イミノタジン) ヒドロキシアニリド系							○	○							収穫前日まで	散布	3回以内
ダコニール1000	TPN水和剤	有機塩素系	○	○			○	○	○								収穫前日まで	散布	4回以内
ダコニールエース	TPN水和剤	有機塩素系		○					○								収穫前日まで	散布	4回以内
ダコニールくん煙剤	TPNくん煙剤	有機塩素系							○								収穫前日まで	くん煙	4回以内
ダコニールジェット	TPNくん煙剤	有機塩素系							○								収穫前日まで	くん煙	4回以内
ダコニール顆粒水和剤	TPN水和剤	有機塩素系		○													収穫前日まで	散布	4回以内
ダニ太郎	ピフェナゼート水和剤	殺ダニ剤											○	○			収穫前日まで	散布	1回
タフパール	タクロマイセス フラハス水和剤	微生物						○	○								発病前～発病初期	散布	-
ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	ネオニコチノイド系									○	○			○		収穫前日まで	散布	3回以内
ダントツ粒剤	クロチアニジン粒剤	ネオニコチノイド系									○	○			○		定植時	植穴処理土壌混和	1回
チェス粒剤	ピメトリン粒剤	その他										○	○				育苗期後半	株元散布	1回
チェス顆粒水和剤	ピメトリン水和剤	その他										○	○				収穫前日まで	散布	3回以内
チューレックス顆粒水和剤	BT水和剤	B.T														○	発生初期 但し、収穫前日まで	散布	-
チューンアップ顆粒水和剤	BT水和剤	B.T														○	発生初期 但し、収穫前日まで	散布	-
ディアナSC	スピネラム水和剤	その他								○		○			○	○	収穫前日まで	散布	2回以内
テーク水和剤	シメコナゾール・マンゼブ水和剤	EBI 保護剤(EBDC)	○	○					○								収穫前日まで	散布	2回以内
デュアルサイド水和剤	プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル・ホリオキシシン水和剤	その他 抗生物質												○			収穫前日まで	散布	3回以内
デランK	ジチアノン・銅水和剤	保護剤(ジチアノン) 無機銅		○					○								収穫前日まで	散布	4回以内
テルスターフロアブル	ピフェントリン水和剤	ピレスロイド系										○					収穫前日まで	散布	2回以内
デルフィン顆粒水和剤	BT水和剤	B.T														○	発生初期 但し、収穫前日まで	散布	-
トアローフロアブルCT	BT水和剤	B.T														○	発生初期 但し、収穫前日まで	散布	-
ドイトツボルドーA	銅水和剤	無機銅		○					○								-	散布	-
ドーシャスフロアブル	シアゾファミド・TPN水和剤	シアノイミダゾール系 有機塩素系		○					○								収穫前日まで	散布	4回以内
トップジンMゾル	チオファネートメチル水和剤	ベンゾイミダゾール系			○				○								収穫前日まで	散布	5回以内
トップジンM水和剤	チオファネートメチル水和剤	ベンゾイミダゾール系			○			○	○								収穫前日まで	散布	5回以内
トリガード液剤	シロマジン液剤	IGR														○	収穫前日まで	散布	3回以内
トリフミンジェット	トリフルミゾールくん煙剤	EBI							○								収穫前日まで	くん煙	5回以内
トリフミン水和剤	トリフルミゾール水和剤	EBI					○		○								収穫前日まで	散布	5回以内
トリフミン乳剤	トリフルミゾール乳剤	EBI							○								収穫前日まで	散布	5回以内
トルネードエースDF	イントキサカルブ水和剤	その他														○	収穫前日まで	散布	2回以内
トルネードフロアブル	イントキサカルブMP水和剤	その他														○	収穫前日まで	散布	2回以内
トレボンEW	エトフェンプロックス乳剤	ピレスロイド系										○					収穫前日まで	散布	2回以内
トレボン乳剤	エトフェンプロックス乳剤	ピレスロイド系										○					収穫前日まで	散布	2回以内
粘着くん液剤	デンブン液剤	天然物由来									○	○			○		収穫前日まで	散布	-
ノーモルト乳剤	テフルヘンズロン乳剤	IGR										○				○	収穫前日まで	散布	2回以内
ハーモメイト水溶剤	炭酸水素ナトリウム水溶剤	炭酸水素塩	○					○									収穫前日まで	散布	-
バイオセーフ	スタイナーネマ カーボカブサエ剤	天敵線虫														○	老令幼虫発生期	土壌灌注	-
バイオワーク水和剤	バチルス スプラチリス水和剤	微生物	○					○	○								発病前～発病初期	散布	-
バシレックス水和剤	BT水和剤	B.T														○	発生初期ただし、 収穫前日まで	散布	-
バチスター水和剤	バチルス スプラチリス水和剤	微生物	○					○	○								発病前～発病初期	散布	-
ハチハチフロアブル	トルフェンピラト水和剤	その他								○	○	○	○				収穫前日まで	散布	2回以内
ハチハチ乳剤	トルフェンピラト乳剤	その他	○							○	○	○			○		収穫前日まで	散布	2回以内
バリアード顆粒水和剤	チアクロプリド水和剤	ネオニコチノイド系									○	○					収穫前日まで	散布	3回以内
パンチョTFジェット	シフルフェナミド・トリフルミゾールくん煙剤	アミドキシム系 EBI	○														収穫前日まで	くん煙	2回以内

パンチョTF顆粒水和剤	シフルフェニド・トリフルミゾール水和剤	アミドキシム系 EBI	○														収穫前日まで	散布	2回以内
ピクシオDF	フェンピラザミン水和剤	ヒドロキシアニリド系			○		○										収穫前日まで	散布	4回以内
ピティグラン水和剤	銅水和剤	無機銅			○													散布	-
ファルコンフロアブル	ホキシフェノシド水和剤	IGR													○		収穫前日まで	散布	2回以内
ファンタジスタ顆粒水和剤	ピリヘンカルブ水和剤	その他				○		○	○								収穫前日まで	散布	3回以内
ファンベル顆粒水和剤	イミノクタジンアルベシル酸塩・ピリヘンカルブ水和剤	保護剤(イミノクタジン) その他	○				○	○	○								収穫前日まで	散布	3回以内
フェスティバルC水和剤	ジノモルフ・銅水和剤	桂皮酸系 無機銅			○												収穫前日まで	散布	3回以内
フェスティバルM水和剤	ジノモルフ・マンセブ水和剤	桂皮酸系 保護剤(EBDC)			○												収穫前日まで	散布	2回以内
フェニックスジェット	フルベンジアミドくん煙剤	ジアミド系													○		収穫前日まで	くん煙	2回以内
フェニックス顆粒水和剤	フルベンジアミド水和剤	ジアミド系													○		収穫前日まで	散布	2回以内
フェロディンSL	リルア剤	フェロモン フェロモン													○		成虫発生初期から 発生終期まで	トラップ1台当り1個 配置	
フォリオゴールド	メタラキシルM・TPN水和剤	フェニルアマト系 有機塩素系			○				○								収穫前日まで	散布	4回以内
フォリオブラボ顆粒水和剤	メタラキシル・TPN水和剤	フェニルアマト系 有機塩素系			○												収穫前日まで	散布	4回以内
プラタンフロアブル	イプロジオン・TPN水和剤	ジカルホキシイミド系 有機塩素系			○			○									収穫前日まで	散布	3回以内
ブリザード水和剤	シモキサニル・TPN水和剤	シアノアセトアミド系 有機塩素系			○			○									収穫前日まで	散布	3回以内
ブルースカイ粒剤	イタクロブリト粒剤	ネオニコチノイド系								○	○						定植時	植穴土壌混和	1回
フルピカフロアブル	メパニビリウム水和剤	アニリビリミジン系															収穫前日まで	散布	4回以内
ブレオフロアブル	ピリダリル水和剤	その他													○	○	収穫前日まで	散布	2回以内
ブレバゾンフロアブル5	クロラントラニプロール水和剤	ジアミド系													○	○	収穫前日まで	散布	3回以内
ブロードワン顆粒水和剤	チオファネートメチル・メパニビリウム水和剤	ベンゾイタゾール系 アニリビリミジン系				○		○									収穫前日まで	散布	4回以内
フローバックDF	BT水和剤	B.T														○	発生初期 但し、収穫前日まで	散布	-
プロボーズ顆粒水和剤	ベンチアハリカルブイソプロピル・TPN水和剤	カーバメート系 有機塩素系			○				○								収穫前日まで	散布	3回以内
ベストガード水溶剤	ニテンピラム水溶剤	ネオニコチノイド系								○	○	○					収穫前日まで	散布	3回以内
ベストガード粒剤	ニテンピラム粒剤	ネオニコチノイド系									○	○				○	定植時	植穴処理土壌混和	1回
ベストファイター顆粒水和剤	シモキサニル・ベンチアハリカルブイソプロピル水和剤	シアノアセトアミド系 カーバメート系			○												収穫前日まで	散布	3回以内
ベニカマイルド液剤	還元澱粉糖化物液剤	その他	○								○	○			○		収穫前日まで	散布	-
ベニカ液剤	クロチアニジン液剤	ネオニコチノイド系										○					収穫前日まで	散布	3回以内
ベニカ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	ネオニコチノイド系										○	○			○	収穫前日まで	散布	3回以内
ベニカ粒剤	クロチアニジン粒剤	ネオニコチノイド系										○	○			○	定植時	植穴処理土壌混和	1回
ベニードーDF	銅水和剤	無機銅			○												-	散布	-
ベニードー水和剤	銅水和剤	無機銅			○												-	散布	-
ベネセット水和剤	ベンチアハリカルブイソプロピル・マンセブ水和剤	カーバメート系 保護剤(EBDC)			○												収穫前日まで	散布	2回以内
ベルコートフロアブル	イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤	保護剤(イミノクタジン)	○				○	○	○								収穫前日まで	散布	3回以内
ベルコート水和剤	イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤	保護剤(イミノクタジン)							○	○							収穫前日まで	散布	3回以内
ベルクローブ水和剤	イプロジオン・イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤	ジカルホキシイミド系 保護剤(イミノクタジン)						○									収穫前日まで	散布	3回以内
ベンコゼブフロアブル	マンセブ水和剤	保護剤(EBDC)			○				○								収穫前日まで	散布	2回以内
ベンコゼブ水和剤	マンセブ水和剤	保護剤(EBDC)			○				○								収穫前日まで	散布	2回以内
ベンレート水和剤	ベノミル水和剤	ベンゾイタゾール系						○	○								収穫前日まで	散布	3回以内
ボタニガードES	ホーヘリア バシアナ乳剤	天敵微生物								○	○					○	発生初期	散布	-
ボテガードDF	銅水和剤	無機銅			○												-	散布	-
ボトキラー水和剤	バチルス スフチリス水和剤	微生物	○					○									発病前～発病初期	散布または タケ外投入	-
ボトピカ水和剤	バチルス スフチリス水和剤	微生物						○									発病前～発病初期まで	散布	-
ホライズンドライフロアブル	シモキサニル・ファモキシドン水和剤	シアノアセトアミド系 イタゾール系			○				○								収穫前日まで	散布	3回以内
ポリオキシシ AL 水溶剤	ポリオキシシ水溶剤	抗生物質						○	○	○							収穫前日まで	散布	3回以内
ポリオキシシ AL 水和剤	ポリオキシシ水和剤	抗生物質							○	○							収穫前日まで	散布	3回以内
ポリオキシシ AL 乳剤	ポリオキシシ乳剤	抗生物質								○							収穫前日まで	散布	3回以内
ポリキャブタン水和剤	キャブタン・ポリオキシシ水和剤	保護剤(キャブタン) 抗生物質						○									収穫前日まで	散布	3回以内
ポルドー	銅水和剤	無機銅			○				○								-	散布	-
マイコタール	パーテシリウム レカニ水和剤	天敵微生物									○						発生初期	散布	-
マイトコーネフロアブル	ピフェナゼート水和剤	殺ダニ剤										○	○				収穫前日まで	散布	1回
マッチ乳剤	ルフェスロン乳剤	IGR								○		○	○			○	収穫前日まで	散布	4回以内
マトリックフロアブル	クロマフェノシド水和剤	IGR														○	収穫前日まで	散布	3回以内
マブリックジェット	フルバリネートくん煙剤	ピレスロイド系									○						収穫前日まで	くん煙	2回以内
マブリック水和剤20	フルバリネート水和剤	ピレスロイド系									○	○					収穫前日まで	散布	2回以内
マモロット顆粒水和剤	ベンチアハリカルブイソプロピル水和剤	カーバメート系			○												収穫前日まで	散布	3回以内
マラソン乳剤	マラソン乳剤	有機リン系										○				○	収穫前日まで	散布	5回以内
ムシラップ	ソルビタン脂肪酸エステル乳剤	-	○									○	○		○		収穫前日まで	散布	-
ムッシュポルドーDF	銅水和剤	無機銅			○												-	散布	-
モスビランジェット	アセタミプリドくん煙剤	ネオニコチノイド系								○			○				収穫前日まで	くん煙	3回以内
モスビランワン粒剤	アセタミプリト粒剤	ネオニコチノイド系									○	○					定植後 但し、収穫前日まで	株元散布	3回以内
モスビラン液剤	アセタミプリト液剤	ネオニコチノイド系										○					収穫前日まで	散布	3回以内
モスビラン水溶剤	アセタミプリト水溶剤	ネオニコチノイド系									○	○	○				収穫前日まで	散布	3回以内
モスビラン粒剤	アセタミプリト粒剤	ネオニコチノイド系										○	○			○	定植時	植穴土壌混和	1回
モスビラン顆粒水溶剤	アセタミプリト水溶剤	ネオニコチノイド系									○	○	○				収穫前日まで	散布	3回以内
モベントフロアブル	スピロテトラマト水和剤	-										○					収穫前日まで	散布	3回以内
モレスタン水和剤	キノキサリン系水和剤	キノキサリン系											○	○			収穫前日まで	散布	5回以内
ライメイフロアブル	アミスプロム水和剤	シアノイミダゾール系			○												収穫前日まで	散布	4回以内
ラリー乳剤	シロブタニル乳剤	EBI						○									収穫前日まで	散布	3回以内
ランマンフロアブル	シアゾファミド水和剤	シアノイミダゾール系			○												収穫前日まで	散布	4回以内
リドミルゴールドMZ	マンセブ・メタラキシルM水和剤	保護剤(EBDC) フェニルアマト系			○												収穫前日まで	散布	2回以内
リドミル銅水和剤	銅・メタラキシル水和剤	無機銅 フェニルアマト系			○												収穫前日まで	散布	4回以内
ルビゲン水和剤	フェナリメル水和剤	EBI							○								収穫前日まで	散布	3回以内
ルミライト水和剤	チオファネートメチル・トリフルミゾール水和剤	ベンゾイタゾール系 EBI							○								収穫前日まで	散布	5回以内
レーバスフロアブル	マンシプロバシド水和剤	酸アミド系			○												収穫前日まで	散布	3回以内
ロディー乳剤	フェンプロバトリン乳剤	ピレスロイド系										○	○				収穫前日まで	散布	3回以内
ロブラール500アクア	イプロジオン水和剤	ジカルホキシイミド系							○								収穫前日まで	散布	3回以内
ロブラールくん煙剤	イプロジオンくん煙剤	ジカルホキシイミド系						○		○							収穫前日まで	くん煙	3回以内
ロブラール水和剤	イプロジオン水和剤	ジカルホキシイミド系							○								収穫前日まで	常温煙霧	3回以内
ワイドヒットー顆粒水和剤	ベンチアハリカルブイソプロピル・TPN水和剤	カーバメート系 有機塩素系							○								収穫前日まで	散布	3回以内
ワイドヒットー顆粒水和剤	ベンチアハリカルブイソプロピル・TPN水和剤	カーバメート系 有機塩素系			○												収穫前日まで	散布	3回以内

※: 適用病害虫は薬剤選択の目安とするため、網羅的な名称を採用している。このため、実際の適用害虫名とは異なる場合があるので、使用前には必ず農薬のラベルを確認すること。

例) ミカンキイロアザミウマとに登録のある農薬はアザミウマ類の部分に○印を付与した。